

ИАЛ  
ОДОБРЕНО!  
ДАТА 18.07.05г.

Information for patients

13.4.2004

Прочетете тази листовка внимателно, преди да започнете да вземате това лекарство.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате още въпроси, моля попитайте лекуващия си лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас и не трябва да го давате на други. То може да им навреди, дори и ако техните симптоми са същите като Вашите.

**ENAP®-HL 20 tablets**  
**ЕНАП® HL 20 таблетки**

Лекарствено вещество: *enalapril maleate и hydrochlorothiazide*.

Помощни вещества: лактозаmonoхидрат, царевично нишесте, натриев хидрогенкарбонат,презелатиново нишесте, талк, магнезиев стеарат.

Име и адрес на производителя и притежателя на разрешението за употреба:

Krka, d.d., Novo mesto, Slovenia

**1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ENAP-HL 20 И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?**

**Състав**

1 таблетка Enap-HL 20 съдържа 20 mg enalapril maleate и 12.5 mg hydrochlorothiazide.

**Опаковка**

20 таблетки Enap-HL 20

30 таблетки Enap-HL 20

60 таблетки Enap-HL 20

**Какво представляват таблетките Enap-HL 20?**

Enap-HL 20 се използват за понижаване на артериалното налягане.

Enalapril принадлежи към групата на инхибиторите на ангиотензин конвертирация ензим (АКЕ). Тези лекарствени продукти подтискат активността на АКЕ. По време на лечението с еналаприл, кръвоносните съдове се разширяват в резултат на което кръвното налягане се понижава, а се повишава насищането с кислород на сърдечния мускул и другите органи. Hydrochlorothiazide принадлежи към групата на лекарствените продукти, които засилват отделянето на урина (диуретици). По този начин понижават кръвното налягане. Антихипертензивното действие (понижаващо кръвното налягане) на комбинацията от enalapril и hydrochlorothiazide е по-силна отколкото активността на отделните съставки.



Максималният ефект на enalapril се наблюдава след 6 до 8 часа. Ефекта на hydrochlorothiazide, за засилване на отделянето на урината, обикновено се наблюдава 2 часа след приемането му; в най-лошия случай след 3 до 4 часа. Ефекта върху кръвното налягане се наблюдава след около 3 до 4 дневна терапия. Ефекта на комбинацията обикновено продължава 24 часа. Траен терапевтичен ефект се достига след няколко седмично лечение.

### **За какво се използват таблетките Enap-HL 20?**

Този лекарствен продукт се препоръчва за лечение на повищено кръвно налягане (arterialna хипертония), когато се налага комбинирано лечение.

### **2. ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ENAP-HL 20**

*Уведомете лекуващия си лекар, ако имате някакво хронично заболяване, обменно нарушение, ако сте свръхчувствителни (алергични) или ако вземате други лекарства.*

### **Кой не трябва да използва таблетки Enap-HL 20?**


Вие не трябва да използвате този лекарствен продукт:

- ако сте свръхчувствителен (алергичен) към enalapril, hydrochlorothiazide или сулфонамиди или към някои от помощните вещества на лекарството или към други АКЕ инхибитори;
- ако при употребата на други АКЕ инхибитори се е проявила реакция на свръхчувствителност с внезапен оток на устните и лицето, шията, по ръцете или по краката или задушаване и прегракване (ангиоедем);
- ако имате фамилна обремененост с ангиоедем или ангиоедем при някои други, неизвестни случаи,
- тежко увреждане на бъбрената или чернодробната функция,
- първичен хипералдостеронизъм,
- ако имате бъбречна трансплантация,
- по време на бременност и кърмене.

### **Специални мерки и предупреждения**

По време на лечение с Enap-HL 20, проверявайте вашето кръвно налягане редовно. Консултирайте се с вашия лекар относно най-благоприятното ниво на вашето кръвно налягане и когато идвate за повторно измерване следващия път.

Преди да започнете да приемате Enap-HL 20, кажете на вашия лекар ако се лекувате за диабет, подагра, астма, заболявания на черния дроб, бъбреците, сърдечно-съдовата система (сърдечни атаки или инсулт), панкреаса, костния мозък, имунната система или алергии. Трябва да предупредите вашия лекар и в случаите ако сте имали сърдечни атаки или инсулт, заболявания, операция на нервите (симпатектомия) и ако сте



сулфонамидни лекарствени средства. Информирайте и лекаря ако сте на диета и по-специално ако сте на ниско солева диета.

В началото на лечението се изисква по-чест лекарски контрол. Вие не трябва да пропускате изследванията дори и да се чувствате добре. Лекарят ще определи честотата на контролните прегледи.

След първата доза от лекарствения продукт или дори няколко часа по-късно може да се наблюдана прекомерно спадане на кръвното налягане (хипотония). Това обикновено се проявява с гадене, учестена сърдечна дейност, виене на свят и прилошаване. Ако изпаднете в хипотония, легнете и поставете главата на ниска възглавница и потърсете лекарска помощ. Хипотонията и нейните тежки последици са редки и преходни. Преходната хипотония не е пречка за продължаване на лечението с това лекарство. След прекомерното спадане на кръвното налягане обикновено вие ще понесете следващите дози добре. При повтаряща се хипотония съпроводена със симптоми на заболяване т.е. гадене, учестена сърдечна дейност и прилошаване се консултирайте с вашия лекар.

Ако по време на лечението ви се завие свят или прилошее или изпаднете в безсъзнание легнете или останете в седнала позиция и се консултирайте с вашия лекар. Препоръчва се да се изправяте винаги бавно, особено ако сте в напреднала възраст.

Преди възможна хирургическа операция, информирайте вашия лекар, че приемате Enap-HL 20 тъй като съществува повишен риск от хипотония по време на обща анестезия.

Ако лечението с Enap-HL 20 се съпровожда с продължителна и тежка диария, повръщане или обилно изпотяване се консултирайте с вашия лекар защото загубата на течности може да доведе до хипотония (спадане на кръвното налягане).

Преди възможно лечение на хемодиализа или някои други процедури за пречистване на кръвта (афреза) и лечение на свръхчувствителност към отрова на оси или пчели (десенсибилизация), информирайте вашия лекар, че приемате Enap-HL 20 защото съществува повишен риск от нежелани реакции на свръхчувствителност.

Преди провеждането на тестове за паратироидната функция предупредете вашия лекар, че приемате Enap-HL 20.

Ефикасността и безопасността на Enap-HL 20 при деца не са установени и поради това лекарствения продукт не трябва да бъде даван на деца.

#### **Приемане на Enap-HL 20 с храна и течности**

Вие можете да приемате лекарството по време или след хранене с малко течност.

Не приемайте алкохол по време на лечението с Enap-HL 20 поради възможното засилване на действието за понижаване на кръвното налягане.

**Бременност**



*Консултирайте се с вашия лекар или фармацевт преди приемането на какъвто и да било лекарствен продукт.*

Enap-HL 20 преминава през плацентарната бариера и може да причини увреждане на плода затова не трябва да го приемате по време на бременност и по-специално през втория и третия триместър от бременността.

Enap-HL 20 не се препоръчва за жени, които планират да забременеят. Жените, които забременеят по време на лечението трябва да се консултират с лекар незабавно с оглед тяхното бъдещо лечение защото хипертонията (повишеното кръвно налягане) през бременността е опасна за тях и плода.

### **Кърмене**

*Консултирайте се с вашия лекар или фармацевт преди приемането на какъвто и да било лекарствен продукт.*

Enap-HL 20 се отделя с майчината кърма затова майките, които кърмят се съветват да прекратят кърменето.

### **Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини**

При индивидуални пациенти Enap-HL 20 може да причини хипотония и виене на свят в началото на лечението и това по индиректен начин и преходно може да понижи способността за управление на моторни превозни средства или работата с машини. Докато не установите как реагирате на лечението не шофирайте и не работете с машини.

### **Как другите лекарствени средства взаимодействат с Enap-HL 20?**

*Информирайте вашия лекар или фармацевт ако приемате каквото и да било лекарствени средства, включително и такива, които са без рецепт.*

Преди да спрете да приемате лекарства, които са за вашето основно лечение или да започнете да приемате други, трябва да се консултирате с вашия лекар. Това се отнася най-вече до лекарствените продукти, които се използват за лечение на хипертония, сърдечна недостатъчност, диабет, за отделяне на урина, таблетки, съдържащи калий, лекарства срещу болки в костите, аспирин, успокояващи, сънотворни, лекарствени продукти за лечение на ревматизъм, подагра, психични заболявания, stomашно-чревни язви, за понижаване на холестерола в кръвта или при хронични бронхити и/или астма. Едновременното приложение на Enap-HL 20 и някои лекарствени средства за лечение на гореизброените заболявания могат да отслабят действието на тези лекарства или да засилят техните нежелани ефекти, да повлият върху ефекта на Enap-HL 20 или да повишат риска от влошаване на бъбренчата функция. То може и да причини също алергични реакции.

Не използвайте лекарства без рецепт без да се консултирате с лекар. Това основно се отнася до лекарствените продукти за симптоматично лечение на простудни заболявания, за облекчаване на болка, заместители на солта или калий-съдържащи лекарствени средства.



### 3. КАК ДА СЕ ПРИЛАГА ЕНАР-НЛ 20?

#### **Дозировка и начин на приложение**

*Стриктно спазвайте лекарското предписание. Вие не трябва да променяте вашата дозировка или да прекратявате лечението без консултация с Вашия лекар.*

Обичайната дозировка е 1 таблетка еднократно дневно. Само по изключение може да се препоръчат 2 таблетки дневно. Трябва да приемате таблетките цели, по време на хранене или след това, с малко течност. Вие трябва да приемате таблетките редовно, най-добре сутрин и винаги по едно и също време.

Лечението с Енар-НЛ 20 е продължително, освен ако обстоятелствата не изискват прекратяване на лечението. Тъй като имате нужда да приемате лекарствения продукт редовно погрижете се винаги да имате достатъчно таблетки за да продължите лечението си.

*Ако имате чувството, че ефектът на лекарството е твърде силен или твърде слаб, говорете с лекуващия си лекар или фармацевт.*

#### **Ако сте приели повече Енар-НЛ 20 отколкото би трябвало**

*Ако сте взели свръхдоза, легнете на ниска възглавница и се обадете на лекар.*

Най-честите признания на предозиране са гадене, участена сърдечна дейност, виене на свят и прилошаване поради понижаване на кръвното налягане (хипотония).

След прием на голям брой таблетки може да се наблюдава: повишаване обема на отделената урина и честотата на уринирането, тежка хипотония (спадане на кръвното налягане) със сърдечни ритъмни нарушения, гърчове, частична парализа и изпадане в безсъзнание. Ако пациента е в съзнание след предозиране, опитайте се да предизвикате повръщане и потърсете незабавно лекарска помощ.

#### **Ако забравите да вземете Енар-НЛ 20**

*Не взимайте двойна доза за да компенсирате пропуснатата!*

Ако сте забравили да вземете лекарството, направете това веднага когато се сетите, освен ако остават само няколко часа до определеното за новата доза време. В този случай вземете следващата доза без да я дублирате.

**Ефекти в случай, че лечението с Енар-НЛ 20 се прекрати**

Вие трябва да съзнавате, че лечението с каквито и да било лекарствени продукти, които понижават кръвното налягане няма да излекуват това заболяване, но те ще понижат кръвното налягане и ще го поддържат в



желаното ниво. Така последиците или усложненията от хипертонията ще бъдат предотвратени или намалени.

#### **4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ**

Както всички останали лекарствени продукти, Енап-HL 20 също може да прояви нежелани реакции.

Спрете приемането на лекарствения продукт и веднага се свържете с Вашия лекар в случаите на:

- беспокойство, виене на свят, замайване, прималяване или изпадане в безсъзнание;
- участваване или неправилна сърдейна дейност или болка в гърдите;
- намаляване на отделянето на урина;
- внезапна треска, втискане, затруднено поглъщане;
- необичайна умора и слабост;
- мескулни крампи (схващане);
- стомашни болки, повръщане;
- влошаване на подагра;
- жълтеница;
- внезапно подуване на устните и лицето, шията, възможно по ръцете и краката, затруднения на дишането или пребледняване;
- кожни обриви, сърбеж по кожата, посиняване, червени петна по цялата кожа.

При суха и дразнеща кашлица, главоболие, гадене, диария, повищена чувствителност към светлина, преумора или изтощение, които са неприятни или влошават качеството ви на живот се консултирайте с Вашия лекар.

*Ако забележите някои нежелани лекарствени реакции, дори и ако те не са споменати в тази листовка, моля информирайте лекуващия си лекар или фармацевт.*

#### **5. СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНАР-ХЛ 20**

##### **Срок на годност**

*Да не се използва след срока на годност, указан на картонената кутия.*

##### **Условия за съхранение**

*Да се съхранява на недостъпни за деца места.*

Да се пази от влага. Да се съхранява под 25°C.

##### **Информация за предписване**

Само по лекарско предписание.

##### **Дата на последна корекция**

27 юни 2003

