

Reparil® - Gel N

Репарил - гел N

Състав:

100 g гел съдържат:

Лекарствени вещества:

Есцин 1 g,

Диетиламин салицилат 5 g

Помощни вещества:

Полиакрилна киселина, макрогол-6 каприлокапрат, динатриев едетат, трометамол, изопропил алкохол, ароматизатори, пречистена вода.

Лекарствена форма и количество в една опаковка:

Гел 40 g и 100 g

Име и адрес на притежателя на разрешението и производителя:

MADAUS GmbH, 51101 Cologne (Köln), Германия

Начин на действие:

Репарил - гел N е специално разработен продукт на алкохолна основа, който въздейства в три направления: намалява отоците, възпрепятства възпаленията и намалява болката. Есцинът прониква в кожата, където възпрепятства събирането на течности в тъканите и появата на отоци. Локалните отоци, предизвикващи чувството за тежест и напрежение, бързо се отстраняват. Възпалителните процеси бързо и ефективно се овладяват.

Диетиламиносалицилатът усилва противовъзпалителния ефект и има изразено болкоуспокояващо действие.

Репарил - гел N притежава освен това и следните преимущества:

- той е прозрачен и прониква бързо и напълно в болните участъци;
- той не омазнява бельото и дрехите, не зацапва и поради това е много приятен за употреба;
- той охлажда засегнатите участъци и се понася добре дори и от чувствителна кожа.

Показания:

Контузии, навяхвания, натъртвания, хематоми (кръвонасядания), възпаления на сухожилията, заболявания на гръбначния стълб (болки в прешлените, врата, радикулит, ишиас), повърхностни възпаления при разширени вени, след венозни инжекции респ. инфузии.

Противопоказания:

Репарил - гел N не се прилага върху открити рани, лигавици и по време на облъчвания.

Reparil®-Gel N не трябва да се прилага при свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта и свръхчувствителност към салицилати.

Специални противопоказания и специални предупреждения за употреба:

Продуктът не трябва да влиза в контакт с очите.

Бременност и кърмене:

По време на бременност и кърмене продължителна употреба върху обширни участъци от кожата трябва да се избягва. При кърмене продуктът не трябва да се прилага в областта на гърдите.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини:

Няма

Дозировка, начин и продължителност на приложение:

Ако лекарят не е предписал друго, един или няколко пъти на ден се намазва тънък слой от гела върху болния участък. Не е нужно да се втрива, но при желание се допуска Репарил - гел N не трябва да се прилага без прекъсване повече от 3 седмици.

| |
|-----------------------------------|
| ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВА |
| Листовка - Приложение 2 |
| Към РУ №: II-1016, 15.11.2007 |
| Одобрено: № 3/22.10.2007 |



Нежелани лекарствени реакции:

В много редки случаи могат да настъпят алергични реакции. Възможни са прояви на дерматит, поради дразнещото действие на диетиламин салицилат.

При поява на нежелани реакции пациентът трябва да уведоми лекуващия лекар.

Да се съхранява на места, недостъпни за деца!

Срок на годност:

5 години.

Да не се употребява след изтичане на срока на годност!

Опаковка: Туби по 40 и 100 g

Официален представител:

Фирма "Натурпродукт" ООД

бул." Искърско шосе " №12

1592 - София

тел./факс: (02) 979 12 19 / (02)97 11 217

Последна редакция на информацията: октомври 2007 год.

Регистрационен No 970 024 9

