

Кратка характеристика

1. Име на лекарствения продукт
Rytmonorm® / Ритмонорм
Rytmonorm®150 mg / Ритмонорм 150 мг
Rytmonorm®300 mg / Ритмонорм 300 мг
2. Качествен и количествен състав
Rytmonorm®: Инжекционен разтвор
 20 мл съдържат 70 mg propafenone hydrochloride.

Rytmonorm®150 mg.

1 филмирана таблетка съдържа 150 mg propafenone hydrochloride.

Rytmonorm®300 mg.

1 филмирана таблетка съдържа 300 mg propafenone hydrochloride.

3. Фармацевтична форма
Rytmonorm®: Инжекционен разтвор
Rytmonorm®150 mg: Филмирани таблетки
Rytmonorm®300 mg: Филмирани таблетки

4. Клинични особености

4. 1. Терапевтични индикации

За симптоматични и нуждаещи се от лечение високофrekвентни надкамерни сърдечни аритмии, като напр. AV-нодални тахикардии, надкамерни тахикардии при WPW-синдром или пароксизмално предсърдно мъждане.
 Тежкостепенни симптоматични камерни над III клас по Lown ритъмни нарушения на сърцето, ако по преценка на лекаря са животозастрашаващи.

4. 2. Дозировка и начин на приложение

Започването на терапия с антиаритмични средства при камерни ритъмни нарушения изисква внимателно кардиологично наблюдение и трябва да става само при наличие на апаратура за спешна терапия и възможност за мониторен контрол. По време на терапията, в равномерни интервали от време, трябва да се провеждат контролни прегледи (напр. през 1 месец - стандартно ЕКГ, resp. през 3 месеца - холтер ЕКГ и в даден случай ЕКГ при натоварване). При влошаването на отделни параметри, напр. удължаване на QRS-интервала, resp. QT- интервала с повече от 25 % или на PQ- интервала с повече от 50 %, resp. удължаване на QT до повече от 500 милисекунди или нарастване на броя или тежестта на ритъмните нарушения, терапията трябва да се преоцензи наново.

a) орално

Определянето на индивидуалната поддържаща доза трябва да се извърши при кардиологично наблюдение с периодичен ЕКГ-контрол и измерване на артериалното налягане (фаза на титриране). При удължаване на QRS-интервала спрямо изходния resp. коригирания QT-интервал с повече от 20%, дозата трябва да се редуцира или преустанови приема до нормализиране на ЕКГ стойностите.

При увредена чернодробна- и/или бъбречна функция може да се стигне до кумулиране при терапевтичната доза. Ето защо и такива пациенти могат да бъдат включени на пропафенон под ЕГК-контрол и следене на плазмената концентрация

Ако няма друго предписание:

Като начално и поддържащо лечение се препоръчва дневна доза от 450-600 mg, взети на 2-3 приема дневно.

Понякога може да се наложи увеличаване на дневната доза на 900 mg, разпределена на 3 приема.

В изключителни случаи дневната доза може да се увеличи при строг кардиологичен контрол. Данните са валидни за пациенти с тегло около 70 кг. Дневните дози трябва съответно да се намалят при пациенти с по-ниско телесно тегло.

При деца, за начална и поддържаща терапия се препоръчва средна дневна доза от 20 mg/kg, разпределена в 3-4 единични приема.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Кратка характеристика на продукта - Приложение 1	
Към РУ №-0941-3, 24.10.04	
Одобрено: 5/25.09.07	



При възрастни или пациенти със значимо увреждане на миокарда, дозата на Rytmomonorm трябва да се увеличава постепенно и при специално внимание по време на началната фаза от лечението.

Увеличаването на дозата се извършва 3-4 дни след началото на терапията.

б) венозно

Определенето на индивидуалната поддържаща доза трябва да се извърши под кардиологичен контрол с многократно ЕКГ-мониториране и контрол на артериалното налягане (начална фаза).

При увредена чернодробна- и/или бъбречна функция може да се стигне до кумулиране при терапевтичната доза. Ето защо и такива пациенти могат да бъдат включени на пропафенон под ЕГК-контрол и следене на плазмената концентрация.

Ако няма друго предписание:

Единичната доза е 1 mg/kg/т.т. (отговаря на 20 мл при средно телесно тегло от 70 кг). При необходимост, единичната доза може да се увеличи на 2 mg/kg т.т. (отговарящо на 40 мл при средно телесно тегло от 70 кг). За краткотрайна инфузия (от 1-3 часа) дозата от 0,5 - 1 mg/мин. се назначава в 5% разтвор на глюкоза или левулоза.

При дълготрайна инфузия е напълно достатъчна дневна доза от 560 mg (отговарящо на 160 мл)

Начин и продължителност на приложение

Внимание:

При употребата на това лекарство пациентът трябва да има предвид, че за нито един представител на клас I антиаритмици не е доказано, че терапията на ритъмните нарушения на сърцето, не води до увеличаване продължителността на живота.

а) орално

Поради горчивия си вкус и повърхностно анестетично действие филмтаблетките трябва да не се смучат или дъвчат, а да се погълнат цели, с течност след храна.
Продължителността на употреба се определя от лекаря.

б) венозно

Венозната апликация трябва да се извърши бавно, в рамките на 3-5 мин
Терапията трябва да започне с възможно най-ниски дози, при строг медицински контрол, както и контрол на ЕКГ и артериално налягане. Ако QRS-интервала, resp. коригирания QT-интервал се увеличат с повече от 20% от изходното, апликацията трябва да се преустанови незабавно.

При продължителна капкова инфузия ЕКГ, артериалното налягане и нивото на плазмената концентрация трябва да се наблюдават внимателно ако е необходимо
Интервала между 2 апликации не трябва да е по-малък от 90-120 мин.

Да се избегва смесването с физиологичен разтвор, поради образуването на температурно- и концентрационно зависими утайвания.

Продължителността на употреба се определя от лекуващия лекар. Пациентите от мъжки пол не трябва да се лекуват венозно повече от 1 седмица.

4.3. Противопоказания

Пропафенон не трябва да се използва в случаите на:

- манифестна сърдечна недостатъчност
- сърдечно-съдов шок (освен ако е предизвикан от ритъмно нарушение на сърцето)
- тежка симптоматична брадикардия (болестно забавяне на сърдечния ритъм)
- през първите 3 месеца след прекаран инфаркт на миокарда или при ограничена сърдечна функция (левокамерен обем на изтласкане <35%) освен при пациенти с животозастрашаващи камерни аритмии
- налични високостепенни синуатриални, атриовентрикуларни и вътрекамерни нарушения в провеждането на възбудния импулс
- синдром на болния синусов възел (бради-такси синдром)
- изразена хипотония (болестно значимо ниско артериално налягане)
- манифестни нарушения в електролитното равновесие (напр. нарушения в метаболизма на калия)
- тежка обструктивна белодробна болест



- миастения гравис
- известна свръхчувствителност към активното вещество пропафенон.

4.4. Специални предупреждения и мерки при употреба

При пациенти с намалена левокамерна функция (левокамерен обем на изтласкване <35%) или структурно заболяване на миокарда дозите трябва да се назначават много внимателно и постепенно. В тези случаи препоръчваме терапевтично необходимото покачване на дозата да се предприема само тогава, когато са вече установени фармакокинетичните "steady-state" отношения. По този начин се намалява рисъкът от евентуални проаритмични ефекти в началната фаза от терапията.

4.5. Лекарствени и други взаимодействия

При едновременна употреба на лекарствени средства с локално-анестетично действие (напр. при поставяне на пейсмейкър, хирургична или стоматологична намеса), както и на други лекарства, които предизвикват забавяне на сърдечната честота и/или контрактилитета (бетаблокери, трициклични антидепресанти) трябва да се има предвид възможността от усилване на лекарственото действие.

По-нататък са описани повишения в плазмените концентрации на пропанолол, метопролол, дезипрамин, циклоспорин и дигоксин. В един случай при допълнително даване на пропафенон е наблюдавано удвояване на теофилиновата плазмена концентрация. При появя на съответните симптоми на предозиране трябва да се определят плазмените концентрации и при необходимост да се редуцира дозата на определения медикамент. Повишения на плазмената концентрация на пропафенон са описани при едновременната употреба на циметидин resp. хинидин. При едновременна употреба на пропафенон с фенобарбитал resp. рифампицин може да се стигне до понижаване на пропафеноновата плазмена концентрация, дори до субтерапевтични нива.

Възможно е взаимодействие на пропафенон с оралните коагуланти (усилване на действието на антикоагулантите). При тези пациенти се препоръчва внимателен контрол на коагулационния статус.

4.6. Бременност и лактация

По време на бременността (особено през първите три месеца) и по време на кърмене, възможните ползи при всяко лечение трябва да се преценят спрямо възможните последствия върху детето.

4.7. Ефекти върху способността за шофиране и управление на машини

Дори при употреба според предписанието, тази субстанция може да намали способността на пациента за шофиране и работа с машини. Това е валидно в най-голяма степен при съвместната му употреба с алкохол.



4. 8. Нежелани лекарствени реакции

За определяне честотата на нежеланите лекарствени реакции, в резултат от употреба на Пропафенон са използвани данни от обширни клинични проучвания (вътрешни и публикувани).

Стомашно-чревни нарушения

Нечести ($\geq 1/1\,000$ до $1/100$)	<i>При по-високи начални дози се наблюдават гастроинтестинални нарушения т.е. безапетитие, гадене, повръщане, подуване, запек, съхнене, горчив вкус и променена чувствителност в устата.</i>
--	--

Нарушения на очите и ухото и лабиринта

Нечести ($\geq 1/1\,000$ до $<1/100$)	<i>При по-високи начални дози се наблюдават нарушения в зрението и световъртеж.</i>
---	---

Сърдечни нарушения

Редки ($\geq 1/10\,000$ до $<1/1\,000$)	<i>При по-възрастни пациенти с ограничена миокардна функция, може да се стигне до нарушената регулация на кръвообращението със склонност към хипотония, която се предизвиква при изправено положение на тялото или продължително стоеене (ортостатичен синдром). Може да се стигне до проаритмичен ефект под формата на промяна или засилване на ритъмните нарушения на сърцето, които могат да доведат до тежко засягане на сърдечната дейност и като възможно последствие до спиране на сърцето. Тези проаритмични ефекти се проявяват като силно забавяне на сърдечния ритъм (брадикардия) или като нарушение в провеждането на възбуджението (напр. синуатриален-, атриовентрикуларен или вътрекамерен блок), или като ускоряване на сърдечния ритъм (напр. нова поява на надкамерни тахикардии).</i>
Много редки ($<1/10\,000$)	<i>Поява на камерно мъждене или трептене т.е. влошаване на сърдечната недостатъчност.</i>

Внимание: при терапия с пропафенон може да се промени пейсинг и сензинг на пейсмейкърите. Функцията на пейсмейкъра трябва да бъде проверена и необходимост наново програмирана.



Нарушения на нервната система

Нечести ($\geq 1/1\ 000$ до $1/100$)	Парестезии.
Редки ($\geq 1/10\ 000$ до $< 1/1\ 000$)	Уморяемост, главоболие, психични нарушения като страх и обърканост, беспокойство, кошмари и нарушения в съня, екстрапирамидни симптоми.
Много редки ($< 1/10\ 000$)	<i>При предозиране - до гърчови явления.</i>

Нарушения на имунната система

Редки ($\geq 1/10\ 000$ до $< 1/1\ 000$)	Алергични реакции: алергични кожни реакции, като зачервяване, сърбеж, екзантема или уртикария: бронхоспазъм при пациенти, които имат склонност към бронхоспазъм
--	--

Хепато-билиарни нарушения

Редки ($\geq 1/10\ 000$ до $< 1/1\ 000$)	Холестаза като израз на хиперергична или алергична реакция и/или нарушение в чернодробната функция.
--	---

Нарушения на възпроизводителната система

Редки ($\geq 1/10\ 000$ до $< 1/1\ 000$)	<i>при високи дози на пропафенон е наблюдавано намаляване на потентността и броя на семенните клетки. Тези явления отшумяват след прекратяване на терапията.</i>
--	--

Внимание: терапията с Rytmonorm може да е жизнено важна, тя не трябва да се прекъсва поради тези нежелани ефекти без лекарски съвет.

Нарушения на кръвта и лимфната система

Много редки ($< 1/10\ 000$)	Наблюдавано покачване в антинуклеарните антитела (насочени срещу клетъчното ядро), лупус еритематодес подобен синдром, левкопения или гранулоцитопения или тромбоцитопения (намаляване на гранулоцитите или тромбоцитите в кръвта). Тези явления са напълно обратими след преустановяване на лечението с този медикament. Известни са и изолирани случаи на агранулоцитоза.
-------------------------------	---



4. 9. Предозиране

Симптоми на предозира не

Сърдечни симптоми

Токсичните ефекти на пропафенон се изразяват в генериране и провеждане на импулси като PQ-удължаване; QRS-разширяване; супресия на синусовия възел; AV-блок; камерна тахикардия; камерно трептене и камерно мъждене. Намаляването на контрактилитета (негативен инотропен ефект), което в тежки случаи води сърдечно-съдов шок.

Екстракардиални симптоми

Може да възникнат главоболие, замаяност, нарушения в зрението, парестезии, трепор, гадене, запек и сухота в устата. В тежки случаи може да се стигне до клонично-тонични гърчове, парестезии, сънливост, кома и апнея.

Лечение в случай на отравяне

Като допълнение към основните мероприятия, жизнените функции на пациента трябва да се мониторират и ако е необходимо да се овладеят в интензивно отделение.

Специфични мероприятия:

Брадикардия

Редуциране на дозата и преустановяване на приема на лекарството; при необходимост атропин.

SA-блок и AV-блок II. или III. степен

атропин
орципреналин
при нужда сърдечно пейсиране.

Вътрекамерен блок (бедрен блок)

Редукциране на дозата или преустановяване на лечението; елекроверзио при нужда, докато няма установен антидот за бедрения блок, индуциран от клас I антиаритмици. Ако електростимулацията не е възможна трябва да се направи опит да се скъси QRS-интервала чрез назначаване на високи дози орципреналин.

Сърдечна недостатъчност, придружена с понижение на артериалното налягане

преустановяване на медикацията
при белодробен оток, високи дози нитроглицерин, диуретици и при нужда катехоламини (адреналин и/или допамин и добутамин).

Мероприятия при свръхдозировка (напр. опит за самоубийство)

В случаите на тежка хипотония и брадикардия (ако пациентът е в безсъзнание): атропин 0,5-1 mg венозно, адреналин 0,5-1 mg венозно, при нужда адреналин на капкова инфузия.

Скоростта на вливане се определя от клиничния отговор.

При мозъчни гърчове: венозно диазепам.

Да се осигури постоянен достъп на дихателните пътища; ако е необходимо - интубация и назначаване на миорелаксанти (напр. панкурониум 2-6 mg).

Циркулаторен арест вследствие асистолия или камерно мъждене

Основни мероприятия за кардиопулмонарно съживяване ("A B C" правила):

A. Дихателни пътища (свободни дихателни пътища и/или интубация)

B. Дишане (увеличаване на кислородното подаване чрез механично обдишване)

B. Циркулация (т.е. външен сърдечен масаж, ако е необходим за няколко часа)

0,5-1 mg венозно адреналин или 1,5 mg разтворен в 10 ml физиологичен разтвор, назначен ендотрахиално.

В зависимост от клиничния отговор мероприятията се повтарят.

Na-бикарбонат 8.4%, като начало 1ml/kg т.т. венозно, повтаря се след 15 мин.

Дефибрилация в случаите на камерно мъждене.

След като е даден вече 5-15 mEq калиев хлорид венозно; повтаря се при резистентност към терапията. Инфузия с катехоламини (адреналин и/или допамин/добутамин).

При нужда се включва инфузия с концентриран солеви разтвор (80-100 mEq) докато се постигне серумно ниво на солите от 145-150 mEq/l



Стомашна промивка,
дексаметазон 25-50 mg венозно,
сорбитол 40% 1 ml/kg венозно,
терапия с пейсмейкър,
симптоматична реанимация.

Елиминирането чрез хемоперфузия не е много ефективно.

Поради високия си афинитет към плазмените протеини (>95%) и големия обем на разпределение хемодиализата е неефективна.

5. Фармакологични свойства

5.1. Фармакодинамични данни

Фармакотерапевтична група: антиаритмичен клас IC

ATC код: C01BC03

Пропафенон е антиаритмичен медикамент мембранно-стабилизиращи, блокиращи натриевите канали свойства (Vaughan Williams ClassI). Медикаментът притежава и бетаблокиращи свойства ((Vaughan Williams ClassII)). Пропафенон редуцира скоростта на покачване на акционния потенциал, посредством което постепенно намалява проводимостта на импулса (негативен дромотропизъм). Рефрактерните периоди в предсърдието, AV-възела и камерата се удължават. При пациенти с WPW-синдром, пропафенон пролонгира рефрактерните периоди на допълнителните проводни снопчета.

5.2. Фармакокинетика

Пропафенон се абсорбира добре след орален прием. Пиковите плазмени нива (t_{max}) са налице на 2-рия/3-тия час. Ниската системна наличност (около 50%) след еднократен прием съответства на активен метаболизъм при "first-pass effect" на медикамента през черния дроб. След повторен прием плазмената концентрация и бионаличността нарастват съответно на насищането от метаболизма в черния дроб. "Steady-state" отношения се достигат на 3-тия/4-тия ден и бионаличността нараства близо до 100%.

Скоростта на метаболизма е различна при бързометаболизиращите и при бавнометаболизиращите индивиди (определя се според способността на разграждане на debrisoquine), 90% от популацията се отнася към категорията с висока степен на метаболизъм. Главният метаболит, 5-OH-propafenone, е със сравнима антиаритмична ефикасност по отношение на непромененото лекарство. Свързването с плазмените протеини е 85-90%. Нивото на разпределение е 1,1-3,6 l/kg. Времето на полуживот е 2,8-11 часа за бързометаболизиращите и около 17 часа за бавнометаболизиращите.

Само 1% от дозата се екскретира непроменена през бъбреците.

Терапевтичните плазмени нива варираят от 100-1500 ng/ml

Пропафенон преминава през плацентарната бариера и се изльчва в кърмата.

Има докладван случай за концентрация на пропафенон в умбиликалната артерия до 30% от концентрацията му в майчината кръв.

Екскреция в кърмата: докладван е случай за концентрация на пропафенон в кърмата 4-9% от тази в майчината кръв.

5.3. Бионаличност


Резултатите от проучване на бионаличността от 1981 с Rytmonorm 150 mg, филмтаблетки, и Rytmonorm 300 mg, филмтаблетки спрямо разтвор на 300 mg propafenone hydrochloride при 8 случая са дадени по-долу (фиг. 1). Разликите в относителната бионаличност произтичат от особените физикохимични свойства и специфичното насищане с медикамента. Фиг. 2 показва висока плазмена концентрация при пациенти получавали дълго време лечение в доза, движеща се от 150 mg - 300 mg.

	Тестова нпродукт (150 mg, филмтаблетки)	Тестова нпродукт ³ (300 mg, филмтаблетки)	Референт нпродукт (300 mg, разтвор)
Максимална плазмена концентрация (C_{max})*	18.08 (ng/ml) (7.7-52.1)	87.1 (ng/ml) (14.4-425.7)	300.6 (ng/ml) (128.1-586.4)
Време на максимална плазмена концентрация (t_{max})**	3.0 (h) (1.5-3.0)	3.0 (h) (1.3-3.0)	1.0 (h) (0.8-1.5)
Площ под кривата на концентрацията във време	87.83 (ng/ml) (29.4-221.8)	391.4 (ng/ml) (95.9-1434.9)	1001.4 (ng/ml) (447.1-1660.2)



времето (AUC)*

Стойностите са дадени като средни геометрични* или медианни** и вариращи ()




фиг. 1

Крива на средната плазмена концентрация (като propafenon HCl) във времето след прилагане на 1 филмтабл. Rytmonorm 150 mg/ Rytmonorm 300 mg или 300 mg разтвор на propafenone hydrochloride, n=8.

Средна концентрация при дълготрайна употреба





Дневна доза на propafenone (mg)

фиг. 2

Връзка между дневната доза и основната плазмена концентрация по време на дълготрайно лечение. Ако кинетиката е линеарна, съответните стойности ще лежат на пунктирната линия. Точките и чертите показват средното аритметично и неговото стандартно отклонение.

5.4. Преклинични данни за безопасност Токсикологични свойства

a) Остра токсишност

Видове животни	Пол	LD 50	mg/kg
		I.V.	p.o.
Мишки	m	29.3 (26.6-32.7)	650 (445-888)
	f	31.1 (28.3-35.7)	605 (434-849)
Пълхове	m	18.6 (16.8-22.0)	1316 (978-1729)
	f	16.8 (14.4-19.4)	1250 (263-5943)

б) подостра и хронична токсичност

Незначителни странични ефекти са наблюдавани в 4 седмично проучване за ниска токсичност при пълхове и кучета, на които е даван до 6 mg/kg т.т. венозно и респ. до 5 mg/kg/т.т. пропафенон.

При маймуни, кучета и зайци, но не и при пълхове и само след венозно приложение в токсични дози е наблюдавано обратимо увреждане на сперматогенезата. Има изолирани доклади за редукция на броя на сперматозоидите при хора, което се оказа обратимо при прекратяване на терапията.

в) мутагенен и канцерогенен потенциал

Няма значими данни, че пропафенон индуцира мутагенност при проучвания *in vitro*.

Дълготрайни проучвания при определени животински видове (пълхове и мишки) показват, че липсва значима пропафенон индуцирана канцерогенност.



г) **репродуктивна токсичност**
Ембриотоксични проучвания (сегмент 2) при плъхове и зайци показваха липса на значима тераптогенност, индуцирана от пропафенон.
Ембриотоксичност несъмнено настъпва при токични дози при женски (600 мг/кг/т.т.) плъхове, (150 мг/кг/т.т.) при зайци. При дози 180 мг/кг т.т. и повече дадени на плъхове по време на феталното развитие и лактация (сегмент 3) е наблюдавано потискане на нарастването на неонаталното тяло (преходно, първа седмица от живота). При дози от 360 мг/кг т.т. и повече, е наблюдавано намаление на неонаталното тяло и отчетливо повишение на неонаталната смъртност. При проучване на фертилни плъхове (сегмент 1) не е наблюдавано значимо повлияване на теглото при дози до 270 мг/кг/т.т.

При случаи, докладвани при бременни жени и кърмачки, приемащи пропафенон, гестационните и лактационните периоди са били безпроблемни, а новородените - клинично здрави (виж също 13.3).

6. Фармацевтични особености

6.1. Списък на помощните вещества

Rytmonorm 70 mg/ 20 ml инжекционен разтвор:

1.076 g glucose monohydrate за инжекции за изотоничност, вода за инжекции.

Rytmonorm 150 mg филмирани таблетки:

Crosscarmellose sodium, purified water, macrogol 400, macrogol 6000, magnesium stearate, corn starch, hydroxypropyl methylcellulose, microcrystalline cellulose, titanium dioxide (E171).

Rytmonorm 300 mg филмирани таблетки:

Crosscarmellose sodium, purified water, macrogol 400, macrogol 6000, magnesium stearate, corn starch, hydroxypropyl methylcellulose, microcrystalline cellulose, titanium dioxide (E171).

6.2. Несъвместимости

Rytmonorm 70 mg/ 20 ml инжекционен разтвор не трябва да се смесва с физиологичен разтвор поради концентрационно и температурно видим утайвания.

6.3. Срок на годност

3 години - Rytmonorm 70 mg/ 20 ml инжекционен разтвор.

5 години - Rytmonorm 150 mg филмирани таблетки

5 години - Rytmonorm 300 mg филмирани таблетки.

Да не се използват след изтичане срока на годност!

6.4. Съхранение

Rytmonorm 70 mg/ 20 ml инжекционен разтвор да не се съхранява при температури под 15° C.

6.5. Опаковки

Rytmonorm 70 mg/ 20 ml инжекционен разтвор в ампули, 5 ампули поставени в картонена кутия.

Rytmonorm 150 mg филмирани таблетки – блистери PVC/Alu-фолио поставени в картонена кутия по 30 и по 50 таблетки в кутия.

Rytmonorm 300 mg 6 филмирани таблетки блистери PVC/Alu-фолио поставени в картонена кутия по 20 и по 50 таблетки в кутия .

6.6. Инструкции за употреба Няма.

7. Име и адрес на производителя и притежателя на разрешението за употреба

7.1. За Rytmonorm amp 70 mg/ 20 ml:

Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG
4866 Unterach
Австрия

Abbott GmbH & Co. KG,



Max-Planck-Ring 2;
65205 Wiesbaden
Германия

7.2. За Rytmonorm 150 mg tablets:
Abbott GmbH & Co. KG;
Knollstrasse 50,
67061 Ludwigshafen
Германия

Abbott GmbH & Co. KG;
Max-Planck-Ring 2;
65205 Wiesbaden
Германия

7.3. За Rytmonorm 300 mg tablets:

Abbott GmbH & Co. KG;
Knollstrasse 50
67061 Ludwigshafen
Германия

Abbott GmbH & Co. KG,
Max-Planck-Ring 2;
65205 Wiesbaden
Германия

8. Номер на регистрацията
Rytmonorm solution for injection 70 mg/ 20 ml: №20020601
Rytmonorm 150 mg tablets №20020603
Rytmonorm 300 mg tablets №20020602

9. Дата на последна актуализация
Март 2007 год.

