

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

ИАЛ

ОДОБРЕНО!

Флавамед таблетки против кашлица, 30 mg таблетки
Flavamed Cough Tablets 30 mg, tablets

ДАТА 11-09/01/30.10.04

Амброксолов хидрохлорид (ambroxol hydrochloride)

Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- Ако се нуждате от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват след 4-5 дни.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява *Флавамед таблетки против кашлица* и за какво се използва?
2. Преди да приемете *Флавамед таблетки против кашлица*
3. Как да приемате *Флавамед таблетки против кашлица*?
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхранение на *Флавамед таблетки против кашлица*
6. Допълнителна информация

1. Какво представлява *Флавамед таблетки против кашлица* и за какво се използва?

Флавамед таблетки против кашлица е муколитично лекарство (втечнява гъстия бронхиален секрет) при заболявания на дихателните пътища.

Флавамед таблетки против кашлица се прилага при заболявания на белия дроб и бронхите, съпроводени с образуването на гъст бронхиален секрет (мукус). *Флавамед таблетки против кашлица* втечнява гъстия бронхиален секрет и позволява по-лесното му отделяне чрез кашлица.

2. Преди да приемете *Флавамед таблетки против кашлица*

Не приемайте *Флавамед таблетки против кашлица*

- ако сте алергични (свърхчувствителни) към активното вещество на *Флавамед таблетки против кашлица* (амброксолов хидрохлорид) или към някоя от останалите съставки на *Флавамед таблетки против кашлица* (вж. т. 6 Какво съдържа *Флавамед таблетки против кашлица*).

- при деца под 6 години.

Обърнете специално внимание при употребата на *Флавамед таблетки против кашлица*

- ако сте имали много тежки кожни реакции на свръхчувствителност (синдром на Стивънс-Джонсън, синдром на Лайл);

• Синдром на Стивънс-Джонсън – заболяване с висока температура и обриви по кожата и лигавиците с образуване на мехури.

• Синдром на Лайл – животозастрашаващо състояние, известно още като токсичен епидермален некролиз. Симптомите са появата на големи мехури, подобно на изгаряне.



Ето защо, ако забележите промени по кожата и лигавиците, трябва веднага да спрете приема на *Флавамед таблетки против кашлица*. Посетете незабавно лекар!

- ако страдате от нарушена бъбречна функция или от тежко чернодробно заболяване. В този случай *Флавамед таблетки против кашлица* може да се прилага само с особено внимание (напр. на по-дълги интервали или в по-ниски дози – консултирайте се с Вашия лекар). При тежко нарушена бъбречна функция може да настъпи натрупване на разпадни продукти на активното вещество на *Флавамед*.

- ако страдате от рядко заболяване на бронхите с повишено образуване на гъст бронхиален секрет т.е. на мукус (напр. синдром на неподвижните реснички). При това мукусът не може да бъде отделен от белия дроб. В този случай *Флавамед таблетки против кашлица* може да се прилага само под лекарско наблюдение.

- ако сте имали пептична язвена болест, трябва да се посъветвате с Вашия лекар как да приемат *Флавамед таблетки против кашлица*, защото муколитиците могат да раздразнят стомашната лигавица. Консултирайте се с Вашия лекар преди да приемете *Флавамед таблетки против кашлица*.

Деца

Флавамед таблетки против кашлица може да се прилага само при деца на възраст над 6 години.

Прием на други лекарства

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали някакви други лекарства.

Лекарства, подтискащи кашлицата (антитусиви)

По време на приема на *Флавамед таблетки против кашлица* не трябва да приемате лекарства, които подтискат кашличния рефлекс (т. нар. антитусиви). Кашличният рефлекс е важен, за да може втечненият гъст бронхиален секрет (мукус) да се откашля и по този начин да се отдели от белите дробове.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

По време на бременност или кърмене може да приемате *Флавамед таблетки против кашлица* само според точните указания на Вашия лекар!

До момента няма достатъчно опит при хора при бременност и кърмене. При животни обаче е наблюдавано, че активното вещество на *Флавамед таблетки против кашлица* преминава в кърмата.

Шофиране и работа с машини

Флавамед таблетки против кашлица не повлиява или повлиява незначително способността за шофиране и работа с машини.

Важна информация относно някои от съставките на *Флавамед таблетки против кашлица*

Това лекарство съдържа лактоза (млечна захар). Ако Вашият лекар Ви е информирал, че имате непоносимост към някои захари, консултирайте се с лекар преди приема на това лекарство.

3. Как да приемате *Флавамед таблетки против кашлица*?

Винаги приемайте *Флавамед таблетки против кашлица* точно според указанията в тази листовка. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.



Освен ако лекар не Ви е предписал друго трябва да се имат предвид следните указания. Моля, спазвайте указанията за приложение, защото в противен случай *Флавамед таблетки против кашлица* може да не окаже ефект.

Възраст	Единична доза	Максимална дневна доза
Деца 6-12 години	По ½ таблетка 2-3 пъти дневно (еквивалентно на 15 mg ambroxol hydrochloride 2-3 пъти дневно)	1 ½ таблетки (еквивалентно на 45 mg ambroxol hydrochloride)
Юноши над 12 години и възрастни	През първите 2-3 дни, по 1 таблетка 3 пъти дневно (еквивалентно на 30 mg ambroxol hydrochloride 3 пъти дневно) Продължава се с по 1 таблетка два пъти дневно (еквивалентно на 30 mg ambroxol hydrochloride два пъти дневно)	3 таблетки (еквивалентно на 90 mg ambroxol hydrochloride)

Забележка

При възрастни дневната доза може да бъде увеличена до по 2 таблетки два пъти дневно.

Начин на приложение

Най-добре е *Флавамед таблетки против кашлица* да се поглъщат след хранене, без да се дъвчат и с обилно количество течност (напр. вода, чай или плодов сок).

Таблетката може да бъде разделена на две равни половини.

Продължителност на приложение

Флавамед таблетки против кашлица не трябва да се прилага повече от 4-5 дни без консултация с лекар.

Ако оплакванията Ви не се повлияват след 4-5 дневно лечение или дори се влошават, посетете веднага лекар!

Моля, споделете с Вашия лекар или фармацевт, ако имате чувството, че ефектът на *Флавамед таблетки против кашлица* е твърде силен или твърде слаб.

Ако сте приели повече от необходимата доза *Флавамед таблетки против кашлица*

До момента не са наблюдавани сериозни симптоми на интоксикация. Възможно е временно безпокойство и диария.

При много голямо предозиране може да се появи повишено слюноотделяне, гадене, повръщане, понижено на кръвното налягане с нарушения на циркулацията.

Консултирайте се с Вашия лекар! Спешни мерки като предизвикване на повръщане и стомашна промивка, обикновено не са необходими, освен при много голямо предозиране. Препоръчва се лечение в зависимост от проявените белези на предозиране.

Ако сте пропуснали да приемете *Флавамед таблетки против кашлица*

или сте приели много малка доза, вземете лекарството в предписаната доза на следващия прием. Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка.

Ако имате допълнителни въпроси за приложението на този лекарствен продукт, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт!



4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, *Флавамед таблетки против кашлица* може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

За оценка на нежеланите реакции се приема следната честота:

Много чести	Повече от 1 на 10 лекувани пациента
Чести	По-малко от 1 на 10, но повече от 1 на 100 лекувани пациента
Нечести	По-малко от 1 на 100, но повече от 1 на 1 000 лекувани пациента
Редки	По-малко от 1 на 1 000, но повече от 1 на 10 000 лекувани пациента
Много редки	По-малко от 1 на 10 000 лекувани пациента, неизвестни (не могат да се оценят от наличните данни)

Нежелани лекарствени реакции

Стомашно-чревни нарушения

Нечести: гадене, стомашна болка, повръщане

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Много редки: тежки кожни реакции, като синдром на Лайл и синдром на Стивънс-Джонсън (вж. т. 2 "Обърнете специално внимание при употребата на *Флавамед таблетки против кашлица*").

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

Нечести: реакции на свръхчувствителност, като кожни реакции, лицев оток (едем), задух, сърбеж, втрисане.

Много редки: тежки алергични (анафилактични) реакции до шок.

Предупреждения

Ако забележите, че имате една или повече от гореизброените нежелани реакции, преустановете лечението с *Флавамед таблетки против кашлица* веднага.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. Съхранение на *Флавамед таблетки против кашлица*

Да съхранява на място, недостъпно за деца!

Не използвайте *Флавамед таблетки против кашлица* след срока на годност, отбелязан върху блистера и картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява под 25° С!

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Допълнителна информация

Какво съдържа *Флавамед таблетки против кашлица*?

Активната съставка е амброксол хидрохлорид (ambroxol hydrochloride).

Една таблетка съдържа 30 mg ambroxol hydrochloride.

Другите съставки са лактоза монохидрат, царевично нишесте, целулозен прах, кроскармелоза натрий, повидон К 30, магнезиев стеарат.



Как изглежда Флавамед таблетки против кашлица и какво съдържа опаковката?

Бели, кръгли, плоски таблетки със скосени краища и делителна черта от едната страна.

Флавамед таблетки против кашлица е в опаковки по 10, 20 и 50 таблетки.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Berlin-Chemie AG
Glienicke Weg 125
D-12489 Berlin
Германия

Дата на последно одобрение на листовката

Август, 2007 год.

Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в страните-членки на Европейското икономическо пространство със следните имена:

България	Flavamed Cough Tablets
Чехия	Flavamed tablety
Естония	Flavamed 30 mg
Финландия	Flavamed 30 mg Tablets
Унгария	Flavamed Cough Tablets
Латвия	Flavamed Cough Tablets
Литва	Flavamed Cough Tablets
Полша	Flavamed Cough Tablets
Румъния	Flavamed Comprimate
Словакия	Flavamed Cough Tablets
Словения	Flavamed 30 mg Tablets

