

Инструкция за употреба
Echinacin® Madaus Salbe ointment
Ехинацин Мадаус Залбе маз



Драги Пациенти,

Моля, прочетете следващата по-долу инструкция внимателно, тъй като тя съдържа важни данни за това какво трябва да спазвате по време на употреба на този продукт. Ако имате някакви въпроси, моля, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Лекарствено вещество: изсушен получен чрез пресоване сок от Echinaceae purpureae herba

Състав: 100 g маз съдържат:

Лекарствено вещество: Dried pressed juice from fresh flowering purple coneflower herb (сок от стръкове на ехинацея - Echinacea purpurea herba) (1.7 – 2.5 : 1) 16 g

Консервант: метил 4-хидроксibenзоат

Помощни вещества: етанол, ланолинови алкохоли, глицерол сорбитанов естер на маслена киселина, течен парафин, жълт вазелин, микрокристален восък, полиалкилен гликол, магнезиев сулфат.7H₂O, пропиленгликол, пречистена вода.

Опаковка:

Оригинални опаковки с 25 и 50 g маз.

Растителен лекарствен продукт за лечение на рани.

Производител и притежател на разрешението за употреба:

MADAUS AG, D-51101 Cologne

Tel.: 0221/8998-0, fax: 0221/8998-711

e-mail: info@madaus.de

Показания:

В комплексна терапия на трудно заздравяващи повърхностни рани.

Противопоказания:

Кога не трябва да употребявате Ехинацин Мадаус Залбе?

Ехинацин Мадаус Залбе не трябва да се прилага при свръхчувствителност към активното вещество или някое от помощните вещества - напр. метил 4-хидроксibenзоат (парабени) или към растения от сем. Сложноцветни.

Дозировка, начин и продължителност на приложение:

Ако лекарят не е предписал друго, важат дадените по-долу инструкции. Моля, спазвайте ги, защото иначе Ехинацин Мадаус Залбе няма да подейства както трябва.

По колко и колко често трябва да употребявате Ехинацин Мадаус Залбе?

Ако не е предписано друго, възрастни и деца над 12 години трябва да прилагат лента от мазта с дължина 1-2 см 2 – 3 пъти дневно и да я размазват равномерно на тънък слой върху кожата.

Деца между 6 и 12 години да прилагат лента от мазта с дължина 0.5-1.5 см 2 - 3 пъти дневно.

Деца между 2 и 5 години да прилагат лента от мазта с дължина 0.5-1 см 2- 3 пъти дневно

Във всичките случаи мазта трябва да се размазва равномерно на тънък слой върху кожата.

Колко време трябва да употребявате Ехинацин Мадаус Залбе?

Ехинацин Мадаус Залбе не трябва да се прилага без прекъсване повече от 8 седмици.

Нежелани лекарствени реакции:

Какви нежелани реакции могат да настъпят докато използвате Ехинацин Мадаус Залбе?

В редки случаи могат да настъпят реакции на свръхчувствителност. Било е съобщено за локални алергични реакции (възпаления на кожата).

Моля, ако забележите някои нежелани реакции, които не са описани в тази листовка, информирайте Вашия лекар или фармацевт.

Специални предупреждения за употреба



Не трябва да се използва без прекъсване по-дълго от 8 седмици. При липса на ефект или влошаване на състоянието се консултирайте с лекар.

Условия за съхранение и срок на годност

При температура под 25° С.

Крайният срок на годност е отпечатан върху кутийката и тубата.

Да не се използва след тази дата!

Да се съхранява на места, недостъпни за деца!

Официален представител

"Натурпродукт" ООД

1592 - София, бул. "Искърско шосе" No. 12

телефон (02) 79 12 19, факс (02) 97 11 217

Последна редакция на информацията

Октомври 2003 г.

Reg. №: 9900141

