

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ENDOXAN обвита таблетка 50 mg

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

- ◆ Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- ◆ Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- ◆ Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите, както Вашите.
- ◆ Ако някои от нежеланите лекарствени реакции станат сериозни или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

По-долу в тази листовка ENDOXAN обвита таблетка 50 mg ще бъде наричан Ендоксан.

**ENDOXAN
ЕНДОКСАН**

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА
Листовка - Приложение 2
Към РУ №: 11-1254 , 13, 12.07
Одобрено 31.24.07.07

Важни неща, които трябва да знаете за Ендоксан

Вашият лекар Ви е предписал Ендоксан, защото имате рак и трябва да бъдете лекуван.

Ендоксан е много силно лекарство, което убива раковите клетки, но също така атакува и нормалните. Поради това е възможно при употребата му да се проявят силни нежелани ефекти. Вашият лекар няма да Ви предпише Ендоксан, докато не се убеди, че раковото Ви заболяване е по-голям риск за Вашето здраве, отколкото някои от предполагаемите нежелани ефекти. По време на лечението Ви той ще Ви наблюдава внимателно и, ако е възможно, ще лекува всяка появила се нежелана лекарствена реакция.

Ендоксан

- ◆ ще намали броя на кръвните клетки, които може би спомагат да се чувствате уморен или Ви правят по-податлив на инфекции.
- ◆ може да засегне бъбреците и пикочния мехур. Затова може да Ви бъде давано друго лекарство, наречено Уромитексан (месна), за да Ви помогне да се предотвратят евентуални увреждания на тези органи. Ако забележите появата на кръв в урината Ви, незабавно го съобщете на Вашия лекар!
- ◆ както повечето противоракови лекарства, може да доведе до загуба на косата Ви (от опредяване до пълна загуба), като тя ще възстанови своя растеж веднага след прекратяване на лечението. Той може също така да Ви накара да се чувствате болен или да се разболеете. В този случай Вашият лекар може да Ви даде съвет или лекарство, за да Ви помогне.
- ◆ може да увреди плода, така че е много важно по време на лечението да не забременявате и да се предприемат сигурни мерки против забременяване. Също така е възможно да увреди и сперматата, включително и до 6 месеца след прекратяване на лечението, така че през това време трябва да продължите използването на надеждни мерки против забременяване.

Сега прочетете внимателно останалата част от листовката. Тя съдържа друга важна информация за употребата на Ендоксан, която може да е от особено значение за Вас.

В тази листовка:



1. Какво представлява Ендоксан и за какво се използва?
2. Преди да използвате Ендоксан
 - ◆ Не използвайте Ендоксан
 - ◆ Важна информация относно продукта, която трябва да знаете
 - ◆ Кажете на Вашия лекар, ако
 - ◆ Употреба на други лекарства
 - ◆ Употреба на Ендоксан с храни и напитки
 - ◆ Бременност и кърмене
 - ◆ Шофиране и работа с машини
3. Как да използвате Ендоксан
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхранение на Ендоксан
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЕНДОКСАН И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?

Ендоксан е цитотоксично или противораково лекарство. То действа като убива раковите клетки (това лечение понякога се нарича "химиотерапия").

Използва се за лечение на множество различни ракови заболявания. Ендоксан често се използва заедно с други противоракови лекарства или лъчетерапия. Понякога някои лекари могат да Ви предпишат Ендоксан за лечение на други заболявания, несвързани с раковите; Вашият лекар ще Ви каже дали това се отнася за Вас.

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ЕНДОКСАН

Не използвайте Ендоксан, ако

- ◆ винаги проявявате алергична реакция към Ендоксан (цикрофосфамид). Алергичната реакция може да бъде установена при поява на проблеми с дишането (недостиг на въздух), хрипове, обрив, сърбеж или подуване на лицето и устните
- ◆ костният Ви мозък не работи правилно (особено, ако преди това сте били подложени на химиотерапия или лъчетерапия). За да се установи, колко добре работи Вашият костен мозък, трябва да Ви се направи анализ на кръвта
- ◆ имате възпален пикочен мехур (цистит), което може да се установи, ако чувствате болка при уриниране
- ◆ имате проблеми в отичането на урината
- ◆ в момента имате активни инфекции
- ◆ сте имали проблеми с бъбреците или пикочния мехур вследствие на предишна химиотерапия или лъчетерапия
- ◆ сте бременна или кърмите

Важна информация относно продукта, която трябва да знаете

◆ *Ефекти върху Вашата кръв*

Ендоксан е много силно лекарство, което убива раковите клетки, но също така атакува и нормалните. Най-атакуваните нормални клетки са тези на Вашия костен мозък. Костният мозък произвежда червени кръвни клетки, бели кръвни клетки, които се борят с инфекциите, и тромбоцити, които помагат на твоята кръв да се съсира. Вашият лекар ще провери дали броят на червените кръвни клетки, белите кръвни клетки и тромбоцитите е достатъчно висок, преди да започне да Ви лекува с Ендоксан. Той или тя ще проведе същите тестове и по време на лечението Ви. След прием на Ендоксан броят на кръвните клетки ще се понижи. Това е неизбежен



нежелан ефект на Ендоксан. Бroat на кръвните Ви клетки ще достигне своето най-ниско ниво след около 1 до 2 седмици след началото на лечението с Ендоксан и ще остане ниско още няколко дни след прекратяването му. Повечето хора възстановяват нормалния си брой кръвни клетки след около 20 дни. Ако в миналото сте имали повече цикли химиотерапия, ще Ви е необходимо малко повече време за възстановяване в нормални граници.

Понякога хора, които са лекувани с Ендоксан, получават анемия (недостиг на червени кръвни клетки). Обикновено не се налага лечение, защото Вашият организъм в крайна сметка ще ги възстанови. Ако получите много тежка форма на анемия, може да се наложи да Ви се прелива кръв.

Ако бroat на тромбоцитите Ви е много малък, е възможно кръвта Ви да не се съсирава добре. Повечето хора, които се лекуват с Ендоксан нямат проблеми с кръвосъсирването, но понякога Вие може да забележите, че като се порежете Ви е необходимо повече време за да спрете кървенето. При жените може да се установи, че месечните им цикли протичат по-тежко от нормалното.

Ако забележите, че се появяват синини по тялото Ви без да сте се удряли или венците Ви кървят, трябва незабавно да потърсите помощта на Вашия лекар! Трябва специално да Ви се прелеят тромбоцити, които ще заменят Вашите.

◆ *Инфекции*

Тъй като бroat на Вашите бели кръвни клетки е нисък, много е важно да внимавате да не влизате в контакт със заразени хора, тъй като поради липсата на достатъчен бroat бели кръвни клетки, Вашият организъм не може да се бори с инфекциите. За съжаление, някои инфекции се предават по въздушен път и поради това понякога не може да ги избегнете. Ако смятате, че сте се заразили (имате висока температура, постоянно Ви е студено и Ви тресе, или Ви е топло и се потите, или имате други признания на инфекция като кашлица или парещо усещане при уриниране, трябва незабавно да потърсите помощта на Вашия лекар! Без необходимия бroat бели кръвни клетки, може да са Ви необходими антибиотици, за да се преорите с инфекцията.

◆ *Ефекти върху черния Ви дроб и бъбреците*

Вашият лекар е в състояние да провери в какво състояние са черния Ви дроб и бъбреците, чрез провеждане на кръвни изследвания.

Много е важно по време на лечението с Ендоксан да приемате по-голямо количество течности и да информирате Вашия лекар, ако забележите някакви промени от нормалното при уриниране (като кръв в урината, болка при уриниране, отделяне на по-малко количество урина). Ако трябва да приемате по време на лечението с Ендоксан също и Уромитексан (месна), Вашият лекар ще Ви каже какво количество течности трябва да приемате.

◆ *Венци*

Много е важно по време на лечението с Ендоксан да поддържате добра хигиена на устната кухина и особено на венците, защото в противен случай е възможна появата на рани и инфекции. Потърсете в тази връзка за съвет Вашия лекар!

◆ *Имате чувството, че сте болен или сте болен*

Може да се наложи да Ви се дават лекарства, за да изчезне усещането Ви, че сте болен, или да бъдете излекуван, ако наистина сте болен. Потърсете в тази връзка за съвет Вашия лекар! Има много добри съвременни лекарства, чийто прием не позволява на пациентите да боледуват.

◆ *Ефекти върху никочния мехур*



Ендоксан произвежда вещество, което уврежда стената на пикочния мехур, причинявайки кръвоизлив в урината. Вашият лекар знае това и, ако е необходимо, той или тя ще ви даде лекарство, наречено Уромитексан (месна), което ще предпази пикочния Ви мехур от увреждане. Уромитексан може да Ви се прилага или като кратка инжекция или да се внася в организма Ви смесен с разтвора на Ендоксан за инфузия или да Ви се дава във вид на таблетки. Повече информация за Уромитексан можете да получите в "Листовката: информация за потребителя" на Уромитексан инжекции и Уромитексан таблетки. Повечето от хората, употребяващи едновременно Ендоксан и Уромитексан нямат проблеми с пикочния мехур, но Вашият лекар може да реши да тества урината Ви за наличие на кръв в нея. Ако установите кръв в урината си, Вие незабавно трябва да информирате Вашия лекар!

◆ *Предпазване от забременяване*

Мъже и жени, лекувани с Ендоксан, трябва да предприемат мерки за предпазване от забременяване, защото лекарството може да увреди плода.

Преди началото на лечението говорете с Вашия лекар за възможността за замразяване на Ваша сперма или яйцеклетки. Ако сте мъж има вероятност да не може да станете баща, а ако сте жена – да не може да забременеете, по време на лечението и най-малко 6 месеца след приключването му.

Информирайте Вашия лекар, ако

- ◆ сте болен от диабет
- ◆ имате проблеми с черния дроб
- ◆ имате проблеми с бъбреците
- ◆ имате проблеми със сърцето или сте били подложени на лъчетерапия в областта на сърцето или сте били лекувани с пентостатин или с вид антибиотик, наречен антрациклин, използвани за лечение на ракови заболявания
- ◆ имате влошено здраве или сте болnav
- ◆ сте много възрастен,

тъй като тя или той може да решат допълнително да изследват кръвта или урината Ви или да променят лечението.

Употреба на други лекарства

Моля информирайте Вашия лекар или медицинска сестра, ако приемате или нас скоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускати без рецепт. Обърнете им особено внимание, ако приемате някое от следните лекарства, защото може да бъде променено тяхното действие при едновременната употреба с Ендоксан:

- ◆ антидиабетни лекарства, наречени сулфанилурейни лекарствени продукти (понижаващият им кръвната захар ефект може да бъде усилен, когато се употребяват едновременно с Ендоксан)
- ◆ лекарство за лечение на подагра, наречено алопуринол (тъй като може да бъдат усиленi нежеланите му ефекти върху костния мозък)
- ◆ диуретично лекарство, наречено хидрохлортиазид (тъй като може да бъдат усиленi нежеланите му ефекти върху костния мозък)
- ◆ антибиотик от рода на ципрофлоксацина (тъй като може да промени действието на Ендоксан)
- ◆ антибиотик, наречен хлорамфеникол (тъй като Вашето тяло няма да се очисти достатъчно бързо от Ендоксан)



- ◆ ваксини (при едновременна употреба с Ендоксан е възможно те да не Ви защитят достатъчно надеждно)
- ◆ болкоуспокояващо лекарство, наречено индометацин
- ◆ лекарства, използвани за лечение на епилепсия, наречени фенобарбитал, фенитоин (тъй като е възможно да се увреди черния Ви дроб)
- ◆ успокоителни лекарства (тъй като е възможно да се увреди черния Ви дроб)
- ◆ приспивателно лекарство, наречено хлоралхидрат (тъй като е възможно да се увреди черния Ви дроб)
- ◆ определени лекарства, използвани за да се стимулира продукцията на бели кръвни клетки, наречени G-CSF или GM-CSF (тъй като е възможно да се увреди белия Ви дроб).
- ◆ лекарство, наречено азатиоприн, използвано за подтискане функцията на имунната Ви система (тъй като е възможно да се увреди черния Ви дроб)
- ◆ противогъбични продукти, итраконазол или флуконазол, (тъй като Вашето тяло няма да се очисти достатъчно бързо от Ендоксан)
- ◆ противоракови лекарствени продукти, наречени антрациклини, пентостатин или транстузумаб (тъй като е възможно да се увреди сърцето Ви)
- ◆ противораков лекарствен продукт, наречен бусулфан (тъй като е възможно да предизвика блокиране на кръвоносните Ви съдове или болезнено възпаление на стените на червата)
- ◆ лекарствен продукт, наречен циклоспорин, използван при органна или тъканна трансплантация (тъй като е възможно да не действа правилно)
- ◆ лекарствен продукт, наречен цитарабин, използван за лечение на левкемия (тъй като е възможно да се увреди сърцето Ви)
- ◆ лекарствен продукт, наречен тиотепа, използван за лечение на рак на пикочния мехур (тъй като може да промени действието на Ендоксан)
- ◆ лекарствен продукт, наречен ондансетрон, използван за лечение на гадене (чувство, че сте болен) и повръщане (болен сте), тъй като може да промени действието на Ендоксан
- ◆ мускулен релаксант, наречен суксаметониум (тъй като може да се усили действието му)

Употребата на Ендоксан може да влоши кожни проблеми, предизвикани от лъчетерапията (при появата на обрив, подобен на тежко стънчево изгаряне).

Употреба на Ендоксан с храни и напитки

По време на лечението пациентът не трябва да яде грейпфрут или да пие сок от него, тъй като те може да намалят скоростта, с която Вашето тяло се очиства от Ендоксан.

Алкохолът може да усили предизвиканото от Ендоксан гадене (чувство, че сте болен) и повръщане (болен сте) и с по-голяма вероятност да предизвика проблеми с черния дроб. Това означава също, че в този случай ще се наруши правилното действие на Ендоксан.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на Ендоксан и да е лекарство.

Ендоксан може да увреди плода. Информирайте Вашия лекар, ако сте бременно, мислите да забременеете или се опитвате да забременеете. Вижте също и "Важни неща, които трябва да знаете за Ендоксан".



Не се препоръчва да се кърми по време на лечението с Ендоксан или най-малко 36 часа след прекратяване на лечението. Обърнете се за съвет към Вашия лекар!

Шофиране и работа с машини

Някои от нежеланите лекарствени реакции след приложение на Ендоксан може да повлият способността Ви за безопасно шофиране и за работа с машини. Вашият лекар трябва да реши дали това е безопасно за Вас.

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ЕНДОКСАН

Винаги използвайте Ендоксан точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ендоксан обвити таблетки се приема през устата. Вие трябва да приемате Вашите таблетки с достатъчно количество течност, за да се улесни погълдането им. Не трябва да ги сдъвквате.

Често Ендоксан се дава едновременно с други противоракови лекарства или стероиди (преднизолон). Понякога той се предписва заедно с лъчетерапия.

Вашият лекар ще реши от какво количество от лекарството се нуждаете и кога ще е необходимо да Ви се даде.

Количество Ендоксан, което Ви се дава, зависи от раковото заболяване, от което страдате, от комбинацията от Вашето тегло и височина, от общото Ви състояние и от това дали Ви се дават други противоракови лекарства или сте подложен на лъчетерапия.

Обичайната доза варира между 100 mg (2 таблетки) и 300 mg (6 таблетки) дневно. Ендоксан таблетки обикновено се приема в рамките на няколко дни, което е определен курс лечение, след което се почива (следва период, през който таблетките не се приемат) преди следващия курс лечение. Понякога се налага да приемате различно количество таблетки в последователни дни, например 3 таблетки единия ден и 4 на следващия.

Кога трябва да приемате своето лекарство

Вие можете да приемате всички таблетки от дневната доза наведнъж, но това е добре да го правите всеки ден по едно и също време, за предпочтение сутрин.

Ако имате съмнение относно това, как трябва да приемате таблетките, се обърнете към Вашия лекуващ лекар или фармацевт.

Какво трябва да направите, ако сте забравили да приемете Вашето лекарство

Ако сте забравили да приемете Ендоксан таблетки, вие трябва да ги приемете веднага в момента, в който сте се сетили, ако това е в рамките на същия ден. Ако сте пропуснали един цял ден да приемете лекарството си, трябва да информирате за това Вашия лекуващ лекар. **Никога не приемайте повече таблетки в един ден от определената дневна доза** – т.е. никога не употребявайте две дневни дози в рамките на един ден с цел да “наваксате”.

Какво трябва да направите, ако сте приели повече от необходимото количество от Вашето лекарство

В случай на предозиране или ако дете е погълнало някои от Вашите таблетки, **незабавно** се свържете с Вашия лекар или най-близкото звено за спешна медицинска помощ. За да се приложи специализирано лечение може да се наложи постъпване в болница.

Какво трябва да направите, ако посетите друг лекар или болница?

Ако посетите друг лекар или по никаква причина трябва да отидете в болница, трябва да ги уведомите за лекарствата, които употребявате. **Не приемайте други лекарства, без лекуващият Ви лекар да знае за тях!**



4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Ендоксан е много силно противораково лекарство. Както всички лекарства, той може да има нежелани реакции, макар те да не се проявяват при всеки.

След употреба на Ендоксан са наблюдавани следните нежелани реакции:

Много чести (може да се проявят при повече от 1 на 10 пациента)

- ◆ Понижаване на броя на белите кръвни клетки

По всяка вероятност Вие няма да почувствате нищо, когато се понижи броят на белите Ви кръвни клетки, но ще сте по-податлив на инфекции

- ◆ Кръв в урината

Често това видимо не се забелязва, но се установява при изследване на урината.

Ако установите наличието на кръв в урината си, незабавно информирайте Вашия лекуващ лекар!

- ◆ Падане на косата

Вие може да установите това като малко по-интензивно падане на косата, когато се решите или миете косата си, или като доста по-серииозно или изцяло падане на косата. Количеството коса, което губите ще зависи от дозата Ендоксан, гъстотата на косата Ви или дали употребявате други противоракови лекарства. Ако употребявате Ендоксан с други противоракови лекарства е много по-вероятно да загубите косата си, отколкото ако го употребявате самостоятелно.

- ◆ Чувство, че сте болен или наистина сте болен

Това може да продължи 24 часа след приема на Ендоксан.

- ◆ Чувство за парене или болка при уриниране (цистит)

- ◆ Треска (висока температура)

Чести (може да се проявят при повече от 1, но по-малко от 10 на 100 пациента)

- ◆ инфекции (висока температура, втрисане, изпотяване или други симптоми на инфекция като например кашлица или парещо усещане при уриниране)
- ◆ чувство за парене и болка при уриниране с кръв в урината
- ◆ втрисане
- ◆ необичайна умора и слабост
- ◆ общо не се чувствате добре
- ◆ болезнено възпаление на вътрешната обвивка на чарвата

Нечести (може да се проявят при повече от 1, но по-малко от 10 на 1 000 пациента)

- ◆ пневмония
- ◆ слабост, затруднено дишане, изглеждате блед и с пожълтяла кожа и/или очи (анемия)
- ◆ лесно посинява удареното място, бавно се съсира кръвта
- ◆ алергични реакции като затруднения в дишането, хрипове, обрив, сърбеж или подуване на лицето и устните (в редки случаи – загрубяване на кожата, сърбящи (конюнктивит) или подути очи)
- ◆ промени или спиране (в редки случаи завинаги) на менструалния цикъл при жените
- ◆ загуба на апетит
- ◆ участен сърдечен ритъм
- ◆ промени в ритъма и работата на сърцето (както може да се установи при направена електрокардиограма (ЕКГ))
- ◆ увреждане на сърцето




- ◆ понижен брой на сперматозоидите (в редки случаи завинаги)

Редки (може да се проявят при повече от 1, но по-малко от 10 на 10 000 пациента)

- ◆ вторични тумори (понякога в областта на уринарния тракт и пикочния мехур)
- ◆ рак на кръвта (левкемия)
- ◆ силно чувство за жажда
- ◆ виене на свят
- ◆ неясно виждане
- ◆ неритмично биене на сърцето
- ◆ виждане на предметите с ореол или "виждане на звезди"
- ◆ проблеми с дишането
- ◆ затруднено кръвосъсирване
- ◆ диария
- ◆ запек
- ◆ възпълнеие на лигавицата на устата
- ◆ болки в стомаха (абдоминална болка)
- ◆ възпаление на черния дроб с пожълтяване на кожата и очите и болка в стомаха
- ◆ обриви и зачервена и раздразнена кожа
- ◆ липса на сперма (постоянно)
- ◆ болка в гърдите

Много редки (може да се проявят при повече от 1 на 10 000 пациента)

- ◆ сериозно понижение на кръвното налягане, свързано с инфекция (септичен шок)
- ◆ тежки стомашни спазми и водниста, кървава диария
- ◆ кръвни съсиреци
- ◆ неочеквано сериозни признания на алергия като обрив, сърбяща кожа, подуване на лицето, устните или езика, затруднения в дишането, хрипове (анафилактичен шок). Ако забележите тези симптоми, потърсете незабавно лекарска помощ!
- ◆ подпухване и подуване (задържане на течности)
- ◆ обърканост
- ◆ пристъпи (припадъци или гърчове)
- ◆ изтръпване или бодежи
- ◆ промени във вкуса
- ◆ промяна в душевното състояние, вследствие на тежко чернодробно увреждане
- ◆ болка в гърдите (ангина)
- ◆ сърдечен пристъп
- ◆ затруднения в дишането, течност в белите дробове, подуване на краката
- ◆ възпаление на белите дробове, което предизвиква затруднения в дишането, кашлица и повищена температура
- ◆ много сериозни проблеми с дишането
- ◆ течност в белите дробове
- ◆ кръвни съсиреци в кръвоносните съдове
- ◆ промени в кръвното налягане



- ◆ хрипове
- ◆ недостиг на въздух
- ◆ кашлица
- ◆ главоболие, умора, затруднения в дишането, чувство за изключително добро здравословно състояние и щастие и чувство, че сте болен
- ◆ подут корем
- ◆ рани
- ◆ болка, треска, подуване на корема, кървене от ануса и кръв в изпражненията
- ◆ болки и уголемяване на черния дроб
- ◆ пожълтяване на кожата и бялото на очите, предизвикано от проблеми с черния дроб и кръвта
- ◆ силни болки в корема и гърба (възпаление на панкреаса)
- ◆ сериозно заболяване с мехури по кожата, устата, гениталите и около очите
- ◆ мехури и белене на кожата
- ◆ промени в цвета на длани, ноктите на ръцете, ходилата
- ◆ сърбяща, зачервена кожа
- ◆ влошаване на кожните проблеми, предизвикани от лъчетерапията
- ◆ силни болки в мускулите, при което може да са засегнати всички мускули, които стават и много чувствителни при допир, мускулна слабост, тъмно оцветена урина. Ако забележите тези симптоми, потърсете незабавно лекарска помощ!
- ◆ кървене от пикочните пътища
- ◆ спазми
- ◆ чувствителен, подут пикочен мехур
- ◆ възпаление и разраняване на пикочния мехур
- ◆ проблеми с бъбреците, включително и увреждане
- ◆ главоболие
- ◆ болки
- ◆ комплексно увреждане на органи
- ◆ увеличаване на теглото
- ◆ чувство за безтегловност и замаяност (ниско кръвно налягане)

Промени могат да бъдат наблюдавани и в резултатите от лабораторните изследвания на кръвта и/или урината:

Нечесто – намалени нива на женските полови хормони, повишени нива на определени вещества в организма, наречени ензими

Рядко – промени в чернодробните показатели

Много рядко – повишаване нивата на вещества, които сигнализират за проблеми с бъбреците.

Някои от нежеланите реакции могат да бъдат много сериозни и в много редки случаи животозастрашаващи. Ако установите, че някои от нежеланите реакции стават сериозни или забележите други, неописани в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар или медицинска сестра.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНДОКСАН

- ◆ Да се съхранява на място, недостъпно за деца!



- ◆ Ендоксан не трябва да се използва след изтичане на датата, означена върху картонената кутия и етикета на флакона след текста "Годен до:". Датата на изтичане на срока на годност е последният ден от посочения месец.
- ◆ Да се съхранява под 25° в оригиналната опаковка, за да се пази от светлина!

Лекарството не трябва да се изхвърля в канализацията и с битовите отпадъци. Ако Ви е останало лекарство, което вече не Ви е необходимо, го върнете на Вашия фармацевт.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Ендоксан?

Лекарственото вещество е циклофосфамид (*cyclophosphamide*) и всяка таблетка съдържа 50 mg от него.

Другите съставки са: царевично нишесте, лактозаmonoхидрат, калциев хидрогенфосфат, талк, магнезиев стеарат, желатин, глицерол, сукроза, титанов диоксид (Е 171), калциев карбонат, макрогол, колоидален безводен силициев диоксид, повидон, кармелоза, натриева сол, полисорбат 20, монтангликол воськ.

Как изглежда външно Ендоксан и какво е съдържанието на една опаковка?

Ендоксан обвити таблетки са бели, кръгли, обвити таблетки с бяла сърцевина. По 10 таблетки в блистер са и по x 5, x 20, x 50, x 100 блистера в картонена кутия.

Име и адрес на производителя и притежател на разрешението за употреба

BAXTER Oncology GmbH
Kantstraße 2, D-33790 Halle
Германия

Дата на последно одобрение на листовката {MM/YYYY}

