

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 19.11.05

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

EGILOK® 25 mg, 50 mg и 100 mg таблетки ЕГИЛОК

Производител: EGIS Pharmaceuticals Ltd.
1106 Budapest, Keresztfuri ut 30-38
HUNGARY
Phone: (36-1) 265 5555
Fax: (36-1) 265 5529

1. КАКВО СЪДЪРЖА ВАШЕТО ЛЕКАРСТВО?

ЕГИЛОК (метопролол) принадлежи към групата на бета-блокерите. Използва се за лечение на високо кръвно налягане и болка при стенокардия. Прилага се също при аритмии (неритмична или ускорена сърдечна дейност), за поддържаща терапия след инфаркт на миокарда и профилактика на пристъпи от мигрена.

Всяка таблетка ЕГИЛОК съдържа 25 mg, 50 mg или 100 mg от лекарственото вещество метопролол тартрат. Като помощни вещества се съдържат: магнезиев стеарат, поливидон, безводен силициев диоксид, натриев скорбялен гликолат и микрокристална целулоза.

2. КОГА НЕ ТРЯБВА ДА ПРИЕМАТЕ ЕГИЛОК?

Не трябва да взимате таблетките, ако:

- сте алергични към метопролол или към някой от помощните вещества
- страдате от сериозни сърдечно-съдови заболявания, за които Вашият лекуващ лекар не е уведомен
- страдате от бронхиална астма

Преди започване на лечението с ЕГИЛОК непременно уведомете Вашия лекуващ лекар, ако страдате от захарен диабет, ако приемате други лекарствени продукти, ако сте бременна или планирате да забременеете или ако кърмите.

3. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРЕДИ ПРИЕМАНЕ НА ТАБЛЕТКИТЕ

Преди започване на лечението лекуващият лекар може да прецени да изследва чернодробните и бъбречните Ви функции. Моля уведомете го, ако страдате от чернодробно или бъбречно заболяване.

4. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПО ВРЕМЕ НА ПРИЕМАНЕ НА ТАБЛЕТКИТЕ

Внезапното прекъсване на лечението с ЕГИЛОК, особено при наличието на сърдечно заболяване, може да влоши Вашето състояние, затова спирането му трябва да става постепенно.

Ако Ви се налага оперативно или болнично лечение по друга причина, моля уведомете лекуващите лекари, че сте на лечение с ЕГИЛОК.

5. КАК ДРУГИТЕ ЛЕКАРСТВА МОГАТ ДА ПОВЛИЯЯТ ВАШЕТО ЛЕЧЕНИЕ С ЕГИЛОК

Трябва да знаете, че комбинирането на някои лекарства с ЕГИЛОК е забранено, а на други - изисква повишено внимание. Затова уведомете лекуващия лекар кои лекарствени продукти приемате (напр. лекарства за понижение на кръвното налягане).

6. ШОФИРАНЕ И РАБОТА С МАШИНИ ПО ВРЕМЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО С ЕГИЛОК

Употребата на лекарството може да предизвика уморяемост или леко замайване, което трябва да се има предвид при шофиране и работа с опасни машини.

7. ДОЗИРОВКА

Вашият лекар или фармацевт ще определи дневната доза, която Вие трябва стриктно да спазвате.

При високо кръвно налягане: По една таблетка от 50 mg сутрин или в зависимост от тежестта на хипертонията, лекарят може да назначи още 50 mg вечер. Тази доза може постепенно да се увеличи до 100-200 mg дневно, като може да се добавят и други лекарства за високото кръвно налягане.

Максималната дневна доза ЕГИЛОК е 400 mg.

При стенокардия: 100-200 mg, разпределени в две отделни дози. При тежки случаи дневната доза може да се увеличи до 400 mg дневно.

Винаги спазвайте стриктно лекарските предписания за приемане на ЕГИЛОК.

При сърдечни аритмии: Начална доза от 100-200 mg дневно, разпределена в два приема (сутрин и вечер). Лекуващият лекар може да увеличи дозата до 400 mg дневно, на два приема.

След инфаркт на миокарда: 200 mg поддържаща доза, разпределена в два приема.

За профилактика на мигренозни пристъпи: 100-200 mg, разпределени в два приема.

8. НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Може да появят следните нежелани реакции: умора, главоболие, прилошаване, замаяност, нарушения в съня и забавяне на сърдечната дейност. В много случаи тези ефекти са временни и изчезват при намаление на дозата.

Много рядко може да се появят кожни раздразнения и студени крайници.

Ако се появят някои други нежелани реакции, които не са споменати в тази листовка, трябва да съобщите на лекуващия лекар.

Свържете се с Вашия лекар за съвет, ако сте приели твърде много таблетки или се съмнявате, че Вашето дете е приело от лекарството. Вземете тази листовка и остатъка от таблетките за да ги покажете на лекаря.

Срокът на годност е отпечатан на картонената опаковка.
Не трябва да употребявате таблетките след тази дата!
Да се съхранява под 25⁰C.

Съхранявайте таблетките на място, недостъпно за деца.

ЗАПОМНЕТЕ: Лекарството е предписано САМО на ВАС. Не трябва да го предлагате на друг, дори и неговите оплаквания да са подобни на Вашите.

9. ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ ИЛИ ПОСЛЕДНА ПРОВЕРКА

Март, 2002