



ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

Espumisan®

Еспумизан



ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 26.07.05

Моля, прочетете внимателно следната листовка за пациента, преди да започнете Вашето лечение. За допълнителна информация се обръщайте към Вашия лекар или фармацевт.

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

Espumisan®

Еспумизан

Какво съдържа Вашето лекарство?

Лекарствено вещество

Една мека капсула *Еспумизан* съдържа 40 mg simethicone.

Помощни вещества

Метилпараидроксибензоат, желатин, глицерол (85 %), оцветители E104 и E110.

Опаковка

Блистер.

Опаковката съдържа 25, 50 или 100 капсули.

Как действа *Еспумизан*?

Еспумизан е лекарство против подуване и чувство на тежест в корема и допълнително средство за образна диагностика.

Повишеното образуване и натрупване на газове в стомаха и червата във вид на дребномехурчеста пяна води до неприятни оплаквания, като подуване и чувство на тежест в корема. *Еспумизан* намалява повърхностното напрежение на мехурчетата газ и разгражда дребномехурчестата пяна. Освободените по този начин газове могат да се резорбирамт от чревната стена и да се отделят по естествен начин.

Еспумизан действа по чисто физичен начин, не променя химическите реакции и е фармакологично и физиологично неактивен, не взаимодейства с микроорганизми и с ензими. *Еспумизан* не влияе върху храносмилането и не променя киселинността в стомаха. *Еспумизан* не се резорбира и се отделя непроменен.

Какво лекува *Еспумизан*?

Еспумизан се прилага:

- при всички заболявания, придружени с повищено образуване и натрупване на газове в стомашно-чревния тракт (метеоризъм), съпроводени с оплаквания като дискомфорт, подуване, чувство на тежест и пълнота в областта на корема;
- при прекомерно погълъщане на въздух, както и при прием на определени храни и напитки, водещи до повищено образуване на газове (боб, леща, зеле, газирани напитки);
- при сърдечни оплаквания, в резултат от придвижване на диафрагмата нагоре вследствие натрупване на газове в стомашно-чревния тракт;
- при подготовка на коремната кухина за образно изследване (рентгеново, ултразвуково и т.н.).



Кога не трябва да се прилага *Еспумизан*?

Еспумизан не трябва да се прилага при свръхчувствителност към някоя от съставките на лекарството.

Какво трябва да знаете преди да започнете лечението с *Еспумизан*?

Ако коремните оплаквания се появят отново или продължават дълго трябва да се консултирате с лекар.

При приложението на това лекарство може да се прояви уртикария (копривна треска) поради съдържанието на метилпараидроксибензоат. Възможни са и късни реакции, като контактен дерматит. Реакции, които се появяват веднага след приложението, като уртикария и спазъм на бронхите, са много редки.

Това лекарство съдържа оцветител Е110, който може да предизвика реакции, подобни на алергичните, напр. астма, при хора, които са особено чувствителни към това вещество. Тази реакция се наблюдава по-често при хора с алергични към ацетилсалицилова киселина.

Какви взаимодействия може да има между *Еспумизан* и други лекарства, които приемате?

Не са известни взаимодействия с други лекарства.

Може ли да се прилага *Еспумизан* по време на бременност и кърмене?

Няма основания да се избягва приложението на *Еспумизан* по време на бременност и кърмене.

Повлиява ли *Еспумизан* способността за шофиране и работа с машини?

Еспумизан не променя времето на реакция и не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

Как и колко време трябва да се прилага *Еспумизан*?

При подуване и чувство на тежест в корема

При деца над 6 години, юноши и възрастни – по 2 капсули *Еспумизан*, 3-4 пъти на ден.

Еспумизан се прилага по време на хранене или след хранене, а при необходимост и преди лягане.

Продължителността на лечението се определя в зависимост от оплакванията.

При необходимост *Еспумизан* може да се прилага продължително време.

При подготовка на коремната кухина за образно изследване (рентегово, ултразвуково и т.н.)

По 2 капсули *Еспумизан* 3 пъти в деня преди изследването и 2 капсули сутринта в деня на изследването.

Еспумизан не съдържа захар и поради това е подходящ за диабетици и хора с нарушен храносмилане.

Какво трябва да се направи в случай на предозиране с *Еспумизан*?

Лекарственото вещество на *Еспумизан* води до разпадане на мехурчетата газ в стомашно-чревния тракт по напълно физичен начин, като е напълно химически и



биологично неактивен. Поради това на практика отравяне може да се изключи. Приложението на големи дози *Еспумизан* също се понася без проблеми.

Какви нежелани лекарствени реакции може да причини *Еспумизан*?

До момента не са наблюдавани нежелани лекарствени реакции при приложението на *Еспумизан* (вж. "Какво трябва да знаете преди да започнете лечението с *Еспумизан*?"

Как да съхранявате *Еспумизан*?

Да се съхранява под 30° C!

Да се пази на място, недостъпно за деца!

Срок на годност

3 години.

Да не се използва след срока на годност, обозначен на опаковката!

Дата на последна редакция на листовката

Януари, 2005 год.

Притежател на разрешението за употреба



**BERLIN-CHEMIE
MENARINI GROUP**

BERLIN-CHEMIE AG
(MENARINI GROUP)
Glienicker Weg 125
12489 Berlin, Germany

