

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

**ИАЛ
ОДОБРЕНО!**
18.02.08
ДАТА.....

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Actalipid 10 mg, film-coated tablets

Actalipid 20 mg, film-coated tablets

Actalipid 40 mg, film-coated tablets

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка таблетка Actalipid 10 mg съдържа 10 mg simvastatin;

Всяка таблетка съдържа 65.73 mg lactose monohydrate

Всяка таблетка Actalipid 20 mg съдържа 20 mg simvastatin;

Всяка таблетка съдържа 131.46 mg lactose monohydrate

Всяка таблетка Actalipid 10 mg съдържа 10 mg simvastatin;

Всяка таблетка съдържа 262.92 mg lactose monohydrate

Помощни вещества:

За пълен списък на помощните вещества виж точка 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Филмирани таблетки.

Actalipid 10 mg е овална, розова, двойноизпъкнала, филмирана таблетка с цвят на праскова, с делителна черта от едната страна;

Таблетката от 10 mg може да бъде разделена на равни части.

Филмирани таблетки.

Actalipid 20 mg е овална, светло кафеава, двойноизпъкнала, филмирана таблетка, с делителна черта от едната страна;

Таблетката от 20 mg може да бъде разделена на равни части.

Actalipid 40 mg е тъмночервена, двойноизпъкнала, филмирана таблетка, с делителна черта от едната страна;

Таблетката от 40 mg може да бъде разделена на равни части.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1. Терапевтични показания

Хиперхолестеролемия

Като лечение на първична хиперхолестеролемия или смесена дислипидемия, като допълнение към диетата, когато резултатът от диетата и други нефармакологични лечения (упражнение, загуба на тегло) са се оказали неадекватни



Като лечение на хомозиготна наследствена хиперхолестеролемия като допълнение към диета и други липидо-понижаващи лечения (напр. LDL-афереза) или ако такива лечения са неподходящи.

Сърдечно-съдова превенция

Намаляване на сърдечно-съдовата смъртност и заболеваемост сред пациенти с изявено атеросклеротично сърдечно-съдово заболяване или diabetis mellitus, при нормални или повишени холестеролови нива, като добавка към подобряването на другите рискови фактори и друга терапия за сърдечно-съдова профилактика (виж точка 5.1.).

4.2. Дозировка и начин на приложение

Дозировката варира от 5 до 80 mg дневно, обикновено приемани перорално като единична доза вечер. В случай, че се налагат корекции на дозата, те трябва да бъдат правени на интервали не по-малки от 4 седмици, като се достига максимална доза от 80 mg дневно. Доза от 80 mg се препоръчва само за пациенти с тежка хиперхолестеролемия и повишен риск от сърдечно-съдови усложнения.

Хиперхолестеролемия

Пациентът трябва да се постави на стандартна диета за понижаване на холестерола и тази диета трябва да продължи по време на лечението с Акталипид. Обичайната начална доза е 10-20 mg дневно, приемани като единична доза вечер. Пациенти, при които е необходима значителна редукция на LDL-C (повече от 45%) може да стартират от 20-40 mg дневна доза, приемана еднократно вечер. В случай, че се налагат корекции на дозата, това трябва да се прави както е уточнено по-горе.

Наследствена хомозиготна хиперхолестеролемия

Въз основа на резултати от едно контролирано клинично изпитване, препоръчителната доза Акталипид е 40 mg дневно, приемани вечер или 80 mg дневно, разпределени в 3 дози от два приема по 20 mg и вечерна доза от 40 mg. Акталипид може да се използва като допълнение към други понижаващи холестероловите нива терапии (напр. LDL-афереза) при тези пациенти, или ако такива лечения не са на разположение.

Сърдечно-съдова превенция

Обичайната доза Акталипид е 20 до 40 mg дневно, приемана като единична доза вечер при пациенти с висок риск от коронарно сърдечно заболяване (CHD, с или без хиперлипидемия). Лекарствената терапия може да бъде започната едновременно с диета и упражнения. В случай, че се налагат корекции на дозата, това трябва да се прави както е уточнено по-горе.



Съпътстващо лечение

Акталипид е ефективен като самостоятелно лечение или в комбинация с производни на жълчна киселина. Приемането на Акталипид трябва да става или повече от 2 часа преди или повече от 4 часа след приложението на производното на жълчната киселина.

При пациенти, приемащи циклоспорин, даназол, гемфиброзил, други фибратори (освен фенофибрат) или липидо-понижаващи дози (≥ 1 g дневно) ниацин, едновременно с Акталипид, дозата Акталипид не трябва да превишава 10 mg на ден. При пациенти, приемащи амиодарон или верапамил едновременно с Акталипид, дозата Акталипид не трябва да превишава 20 mg дневно (виж точки 4.4. и 4.5.).

Дозировка при бъбречна недостатъчност

При пациенти с умерена бъбречна недостатъчност не се налага модификация на дозата. При пациенти с тежка бъбречна недостатъчност (креатининов клирънс <30 ml/min), е необходимо повишено внимание при приложението на дози над 10 mg дневно, в случаите, когато това наистина е наложително.

Деца и подрастващи

Няма достатъчен опит при деца. Акталипид не се препоръчва за употреба при деца.

Пациенти в напреднала възраст

Не се налага корекция на дозата.

4.3. Противопоказания

- Свръхчувствителност към симвастатин или някой от компонентите на продукта.
- Настоящо чернодробно заболяване или необясними постоянно завишени стойности на серумните трансаминази.
- Бременност и кърмене (виж точка 4.6.).
- Едновременно приложение на мощни CYP3A4 инхибитори (напр. итраконазол, кетоназол, HIV протеазни инхибитори, еритромицин, телитромицин и нефазодон) (виж точка 4.5.).

4.4. Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Миопатия/Рабдомиолиза

Акталипид, както и останалите инхибитори на HMG-CoA редуктазата, понякога причинява миопатия, изразяваща се в мускулна болка, чувствителност или слабост, като креатинкиназата достига нива над 10 пъти по-високи от горната граница на нормалните (UPN). Миопатията понякога се изявява като рабдомиолиза или без



остра бъбречна недостатъчност, в резултат на миоглобинурия, като са били наблюдавани и много редки смъртни случаи. Рискът от миопатия се увеличава при високи нива на HMG-CoA редуктазна инхибиторна активност в плазмата. Както и при други инхибитори на HMG-CoA редуктазата, рискът от миопатия/рабдомиолиза е свързан с дозата. В база данни от клинични изпитвания, където 41 500 пациента са лекувани със симвастатин, от които 24 747 пациента (приблизително 60%) са лекувани поне 4 години, честотата на миопатия е 0.02%, 0.08% и 0.53% при съответно 20, 40 и 80 mg дневно. При тези изпитвания, пациентите са внимателно наблюдавани и някои взаимодействащи си продукти са изключени.

Измерване на Креатинкиназа

Креатинкиназата (КК) не трябва да се измерва след изморителни упражнения или при наличието на вероятна алтернативна причина за увеличение на КК, тъй като това прави трудно интерпретирането на стойностите. Ако КК нивата са значително увеличени в началото ($>5 \times \text{ULN}$), те трябва да бъдат повторно измерени в рамките на 5 до 7 дни, за да се потвърдят резултатите.

Преди лечение

Всички пациенти, започващи лечение с Акталипид или чиято доза Акталипид е увеличена, трябва да бъдат информирани за риска от миопатия и да бъдат посъветвани да съобщават незабавно за необясними мускулни болки, чувствителност или слабост.

При пациенти, при които са налице предразполагащи фактори за рабдомиолиза, трябва да се процедира с повишено внимание. За да се установи референтна начална стойност, нивото на КК трябва да се измери преди начало на лечението в следните случаи:

- Пациенти в напреднала възраст (над 70 години).
- Бъбречни увреждания.
- Неконтролиран хипотиреоидизъм.
- Наследствени мускулни заболявания.
- Предходен опит с мускулна токсичност при прилагане на статин или фибрат.
- Злоупотреба с алкохол.

В такива случаи, рисъкът от лечението трябва да се оценява спрямо възможната полза, като клиничното проследяване е препоръчително. Ако пациентът е имал предишни мускулни проблеми при приемане на фибрат или статин, лечение с друг продукт от тази група трябва да бъде започнато с повишено внимание. Ако КК нивата са значително увеличени в началото ($>5 \times \text{ULN}$), лечението трябва да се започва.



По време на лечение

Ако мускулна болка, слабост или схващания се появят, докато пациента е на лечение със статин, трябва да бъдат измерени КК нивата. Ако при липса на сериозни упражнения тези нива са силно завишени ($>5 \times ULN$), лечението трябва да бъде преустановено. Ако мускулните симптоми са сериозни и причиняват ежедневен дискомфорт на пациента, дори при СК нива $< 5 \times ULN$, може да се обмисли прекратяване на лечението. Ако се подозира миопатия, дължаща се на друга причина, лечението трябва да бъде прекратено.

Ако симптомите отшумят и КК нивата се върнат към нормални стойности, тогава повторно приложение на статина или приложение на друг статин може да бъде обмислено, като това става при най-ниската възможна доза и при внимателно наблюдение.

Терапията с Акталипид трябва временно да бъде спряна за няколко дни преди голяма операция или ако се появи сериозно медицинско или оперативно състояние.

Мерки за намаляване на риска от миопатия, предизвикана от взаимодействия с други лекарствени продукти (виж също точка 4.5.)

Рискът от миопатия и рабдомиолиза значително се увеличава при едновременна употреба на Акталипид с мощни инхибитори на CYP3A4 (като итраконазол, кетоконазол, еритромицин, кларитромицин, телитромицин, HIV-протеазни инхибитори, нефазодон), както и гемфиброзил, циклоспорин и даназол (виж точка 4.2.).

Рискът от миопатия и рабдомиолиза също се увеличава значително при едновременна употреба с други фибратори, липид-понижаващи дози ($\geq 1 \text{ g}$ дневно) нияцинили, при едновременна употреба на амиодарон или верапамил с по-високи дози на Акталипид (виж точка 4.2 и 4.5.). Има леко увеличение на риска при употреба на дилтиазем с Акталипид 80 mg. Рискът от миопатия, включително рабдомиолиза, може да бъде увеличен при едновременно приложение на фусидна киселина и статини (виж точка 4.5.).

Следователно, относно CYP3A4 инхибиторите, използването на Акталипид заедно с итраконазол, кетоконазол, HIV-протеазни инхибитори, еритромицин, кларитромицин, телитромицин и нефазодон е противопоказано (виж точка 4.3 и 4.5.). Ако лечението с итраконазол, кетоконазол, еритромицин, кларитромицин или телитромицин не може да бъде избегнато, терапията с Акталипид трябва да бъде прекратена докато продължава лечението. Освен това, трябва да се наблюдава внимателно при



комбинирането на Акталипид и определени други, по-слаби СУРЗА4 инхибитори: циклоспорин, верапамил, дилтиазем (виж точка 4.2 и 4.5.). Едновременната употреба на Акталипид и сок от грейпфрут трябва да се избягва.

Дозата Акталипид не трябва да превишава 10 mg дневно при пациенти, приемащи едновременно циклоспорин, даназол, гемфиброзил или липидо-понижаващи дози (≥ 1 g дневно) ниацин. Комбинираната употреба на Акталипид и гемфиброзил трябва да се избягва, освен ако ползата не превишава повишения рисък от комбинацията на лекарствата. Ползата от комбинираната употреба на Акталипид 10 mg заедно с други фибратори (освен фенофибрат), ниацин или циклоспорин или даназол, трябва да бъде преценена внимателно спрямо потенциалния рисък от тези комбинации (виж точка 4.2 и 4.5.).

Фенофибрат в комбинация с Акталипид трябва се прилага с повищено внимание, тъй като всяко от тези лекарства може да предизвика миопатия, когато е приемано като самостоятелно лечение.

Едновременната употреба на Акталипид, в дози по-високи от 20 mg на ден, заедно с амиодарон или верапамил би следвало да се избягва, освен ако клиничната полза превишава увеличеният рисък от миопатия (виж точка 4.2. и 4.5.).

Ако комбинацията е необходима, пациенти на фусидна киселина и Акталипид трябва да бъдат внимателно следени (виж точка 4.5.). Може да се обмисли временно прекратяване на лечението с Акталипид.

Чернодробни ефекти

При клинични изпитвания, постоянно увеличение (до $> 3 \times$ ULN) на серумните трансаминази са се появили при няколко пациента, които са получавали симвастатин. Когато Симвастатина е прекъсван или спиран при такива пациенти, нивата на трансаминазите обикновено са падали бавно до нивата от преди началото на лечението.

Препоръчва се да се правят изследвания на чернодробната функция преди началото на лечението и след това, когато това е клинично показано. Пациенти, при които дозата е определена до 80 mg, би следвало да правят допълнителен тест преди лечението, 3 месеца след лечението до 80 mg и периодично след това (напр. на всяка половина година) за първата година от лечението. Трябва да се обрне специално внимание на пациенти, които развиват завишени серумни нива на трансаминазите, като при тези пациенти измерванията трябва да се извършат бързо, след което да се правят повторяни по-често. Ако нивата на трансаминазите започнат да се покачват и поособено ако



достигнат 3 x URL и останат постоянни, лечението със Симвастатин трябва да се преустанови.

Лекарственият продукт трябва да се използва с повищено внимание при пациенти, които консумират значителни количества алкохол.

Както и при други липидо-понижаващи лекарства, умерени ($< 3 \times ULN$) увеличения в серумните трансаминази са били докладвани след терапия със симвастатин. Тези промени се появяват скоро след започване на терапията със симвастатин, често са преходни, не са съпътствани от симптоми и не налагат прекратяване на лечението.

Помощни вещества

Този продукт съдържа лактоза. Пациенти с редки наследствени заболявания на галактозна непоносимост, липса на лап-лактаза или глюкозо-галактозна малабсорбция, не трябва да приемат този лекарствен продукт.

4.5. Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Изследвания за взаимодействие са били правени само при възрастни хора

Фармакодинамични взаимодействия

Взаимодействия с липидо-понижаващи лекарствени продукти, които могат да причинят миопатия, когато се използват самостоятелно.

Рискът от миопатия, включително рабдомиолиза се увеличава при едновременна употреба с фибратори и ниацин (никотинова киселина) (≥ 1 g дневно). Освен това, съществува фармакокинетично взаимодействие с гемифиброзил, изявяващо се в увеличени нива на Симвастатин (вж по-долу Фармакокинетични взаимодействия и точки 4.2. и 4.4.). Когато Симвастатин и фенофибрат се прилагат едновременно, няма свидетелство рискът от миопатия да превишава сборния риск от всяко лекарство поотделно. Няма адекватни данни за лекарствена безопасност при други фибратори.

Фармакокинетични взаимодействия

Препоръките за предписване са обобщени в таблицата по-долу (допълнителни детайли са осигурени в текста; вж също така точки 4.2., 4.3. и 4.4.).



**Лекарствени взаимодействия, свързани с повишен риск от
Миопатия/Рабдомиолиза**

Взаимодействащи лекарства	Препоръки за предписване
Мощни инхибитори на CYP3A4: Итраконазол Кетоконазол Еритромицин Кларитромицин Телитромицин HIV протеазни инхибитори Нефазодон	Противопоказани са за приложение с Симвастатин
Гемфиброзил	Да се избягва, но ако е необходимо, да не се превишава 10 mg Симвастатин дневно
Циклоспорин Даназол Други фибратори (освен фенофибрарат) Ниацин (≥ 1 g дневно)	Да не се превишава 10 mg Симвастатин дневно
Амиодарон Верапамил	Да не се превишава 20 mg Симвастатин дневно
Фусидна киселина	Пациентите следва да бъдат наблюдавани внимателно. Може да се наложи временно прекъсване на лечението с Симвастатин.
Дилтиазем	Да не се превишава 40 mg Симвастатин дневно
Сок от грейпфрут	Избягвайте сок от грейпфрут, когато приемате Симвастатин

Ефекти на други лекарствени продукти върху действието на Симвастатин

Взаимодействия с участието на CYP3A4.

Симвастатин е субстрат на цитохром P450 3A4. Мощни инхибитори на цитохром P450 3A4 увеличават риска от миопатия и рабдомиолиза като увеличават концентрацията на HMG-CoA ред уктазната инхибиторна активност в плазмата по време на терапия с Симвастатин. Такива инхибитори включват итраконазол, кетоконазол, еритромицин, кларитромицин, телитромицин, HIV-протеазни инхибитори, нефазодон. Едновременно приложение на итраконазол води до повече от десетократно увеличение на симвастатиновата киселина (активният метаболит, β -хидроксикиселина). Телитромицин води до единадесет пъти увеличение на симвастатиновата киселина.

Следователно комбинацията с итраконазол, кетоконазол, еритромицин, кларитромицин, телитромицин, HIV-протеазни инхибитори и нефазодон е противопоказана. Ако лечение с итраконазол, кетоконазол, еритромицин, кларитромицин или телитромицин не може да бъде избегнато, терапията с



Симвастатин трябва да бъде прекратена по време на лечението. Трябва да се подхожда с повищено внимание при комбиниране на Симвастатин с други, по-слаби CYP3A4 инхибитори като: циклоспорин, верапамил, дилтиазем (виж точка 4.2. и 4.4.).

Циклоспорин

Рискът от миопатия/рабдомиолиза се увеличава при едновременно приложение на циклоспорин, особено с по-високи дози Симвастатин (виж точка 4.2. и 4.4.). Следователно, дозата Симвастатин не трябва да превишава 10 mg дневно при пациенти, лекувани едновременно с циклоспорин. Въпреки че механизъмът не е напълно изяснен, циклоспорин увеличава AUC на HMG-CoA редуктазните инхибитори. Увеличението в AUC на симвастатиновата киселина вероятно отчасти се дължи на потискане на CYP3A4.

Даназол

Рискът от миопатия и рабдомиолиза се увеличава при едновременно приложение на даназол с по-високи дози Симвастатин (виж точка 4.2. и 4.4.).

Гемфиброзил

Гемфиброзил увеличава AUC на симвастатиновата киселина 1.9 пъти, вероятно поради потискане на глюкуронидната верига (виж точка 4.2. и 4.4.).

Амиодарон и верапамил

Рискът от миопатия и рабдомиолиза се увеличава при едновременно приложение на амиодарон и верапамил с по-високи дози симвастатин (виж точка 4.4.) Във все още незавършено клинично изследване, миопатия е докладвана в 6% от пациентите, приемащи симвастатин 80 mg и амиодарон.

Анализът на наличните клинични изследвания показва приблизително 1% честота на миопатия при пациенти, приемащи симвастатин 40 mg и 80 mg едновременно с верапамил. Съгласно едно фармакокинетично изследване, едновременното приложение с верапамил може да води до 2.3 пъти увеличение в излагането на симвастатинова киселина, дължащо се вероятно, отчасти, на потискане на CYP3A4. Следователно Симвастатин не трябва да превишава 20 mg дневно при пациенти, лекувани едновременно с амиодарон или верапамил, освен ако клиничната полза не превишава повишенния риск от миопатия и рабдомиолиза.

Дилтиазем

Анализ на наличните клинични изпитвания показва 1% заболеваемост от миопатия при пациенти, приемащи симвастатин 80 mg и дилтиазем. Рискът от миопатия при пациенти приемащи симвастатин 40 mg не се увеличава при едновременна терапия с дилтиазем (виж точка 4.4.). В едно фармакокинетично изследване, едновременно приложение на дилтиазем води до 2.7 пъти увеличение в излагането на симвастатинова киселина, вероятно дължащо се на потискане на CYP3A4. Следователно, дозата Симвастатин не бива да превишава 40 mg дневно при пациенти, приемащи едновременно дилтиазем, освен ако клиничната полза не превишава увеличения риск от миопатия и рабдомиолиза.



Фусидна киселина

Рискът от миопатия може да бъде увеличен при едновременно приложение на фусидна киселина и статини, включително Симвастатин. Има докладвани отделни случаи на рабдомиолиза, причинени от симвастатин. Може да се наложи временно прекъсване на лечението. Ако има необходимост, пациенти на фусидна киселина и Симвастатин трябва да бъдат наблюдавани внимателно (виж точка 4.4.).

Сок от грейпфрут

Сокът от грейпфрут потиска цитохром P450 3A4. Едновременното приемане на големи количества (над 1 литър дневно) сок от грейпфрут и симвастатин води до 7 пъти увеличение на симвастатиновата киселина. Приемането на 240 ml сок от грейпфрут сутрин и симвастатин вечер води до 1.9 пъти увеличение на симвастатиновата киселина. Следователно, приемането на сок от грейпфрут по време на лечение с Симвастатин трябва да бъде избягвано.

Перорални антикоагуланти

В две клинични изпитвания, едното проведено със здрави доброволци, а другото с хиперхолестеролемични пациенти, симвастатин 20-40 mg дневно слабо увеличава ефекта на кумариновите антикоагуланти: протромбиновото време, отчитано като Международно Нормализирано Съотношение (INR) претърпява увеличение от 1.7 до 1.8 и от 2.6 до 3.4 съответно при доброволци и пациенти. Има данни за много редки случаи на повищено INR. При пациенти приемащи кумаринови антикоагуланти, протромбиновото време трябва да бъде определяно преди началото на лечението с Симвастатин и достатъчно често по време на ранната терапия, за да е сигурно, че няма значително отклонение в протромбиновото време. Когато се установи стабилно протромбиново време, то може да бъде наблюдавано на интервали, обикновено препоръчвани за пациенти на кумаринови антикоагуланти. Ако дозата Симвастатин бъде променена или лечението бъде спряно, същата процедура трябва да се повтори. Терапията със симвастатин не е свързана с кървене или промяна на протромбиновото време при пациенти, които не приемат антикоагуланти.

Ефект на Симвастатин върху други лекарствени продукти

Симвастатин няма потискащ ефект върху цитохром P450 3A4, следователно Симвастатин не се очаква да влияе върху плазмената концентрация на вещества, метаболизирани от този ензим.

4.6. Бременност и кърмене

Бременност

Акталипид е противопоказан по време на бременност (виж точка 4.3.).

Не е установена безопасността при бременни жени. Не са били провеждани контролирани клинични изпитвания при бременни жени. Има получени редки съобщения за вродени аномалии след приемане на HMG-СОДИУЛ[®] инхибитори по време на бременност. Въпреки това, при анализ на резултатите при приблизително 200 бременни жени приемащи симвастатин или друг HMG-СОДИУЛ[®] редуктазен



инхибитор, по време на първите три месеца от бременността, честотата на вродените аномалии е сравнима с тази на общата популация. Този брой бременности е статистически достатъчен, за да се изключи възможността за 2.5 пъти или по-голямо увеличение в конгениталните увреждания спрямо общата честота.

Въпреки, че няма доказателства за разлики в честотата на конгениталните отклонения при деца на майки, приемащи симвастатин или друг HMG-CoA редуктазен инхибитор, спрямо тази в общата популация, приемането на Акталипид от страна на майката, може да намали зародишните нива на мевалонат, който е прекурсор за холестероловата синтеза. Атеросклерозата е хроничен процес и прекратяването на липидо-понижаващите лекарствени продукти по време на бременността не би трябвало да оказва влияние върху дългосрочния рисък, свързан с първичната хиперхолестерolemия при бременната. Затова, Акталипид не бива да се приема от бременни жени, такива които се опитват да забременеят или подозират, че може да са бременни. Лечението с Акталипид трябва да бъде прекъснато по време на бременността или докато се установи, че жената не е бременна. (виж точка 4.3.).

Кърмене

Не е известно дали симвастатин или неговите метаболити се отделят в майчиното мляко. Тъй като много лекарствени продукти се отделят в кърмата и поради риска за сериозни нежелани лекарствени реакции, жени приемащи Акталипид не бива да кърмят децата си (виж точка 4.3.).

4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Акталипид няма, или има много слаб ефект върху способността за шофиране и работа с машини. Въпреки това, по време на шофиране или работа с машини, трябва да се има в предвид, че рядко е било докладвано за замаяност при постмаркетингови изследвания на симвастатин.

4.8. Нежелани лекарствени реакции

Честотата на следните нежелателни лекарствени реакции, които са били докладвани по време на клинични изследвания и/или след маркетинговата употреба са категоризирани спрямо оценката на честотите им в големи, дългосрочни, плацебо-контролирани клинични изследвания, включително Heart Protection Study (HPS) и Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S) съответно с 20,536 и 4,444 пациента (виж точка 5.1.). За HPS, единствените сериозни нежелани реакции, освен миалгия, са увеличение в серумните трансаминази и КК. За 4S, всички странични реакции, изброени по-долу са били описани. В тези клинични изследвания, ако честотата на страничните реакции, предизвикани от симвастатин е по-малка или подобна на тази от плацебо, както и ако има относително причинно-свързани докладвани спонтанно случаи, то тези нежелани реакции се категоризират като „редки”.

За HPS (виж точка 5.1.), включващо 20 536 пациенти, приемащи 40 mg дневно симвастатин ($n = 10 269$) или placebo ($n = 10 267$), профилите на безопасност са сравними между пациентите, приемащи симвастатин/40 mg дневно при приемащи плацебо



за цялата продължителност от 5 години. Честотата на прекратяване поради странични ефекти са сравними (4.8 % при пациентите, приемащи симвастатин 40 mg, сравнено с 5.1 % при пациентите, приемащи плацебо. Случаите на миопатия са с 0.1 % по-малко при пациентите, приемащи симвастатин 40 mg. Повишени трансаминази ($> 3 \times$ ULN, потвърдено чрез повторен тест) се наблюдаваха в 0.21 % (n = 21) от пациентите, приемащи симвастатин 40 mg, сравнено с 0.09 % (n = 9) при пациентите, приемащи плацебо.

Честотите на страничните реакции са подредени спрямо следния критерий: Много чести ($> 1/10$), Чести ($\geq 1/100, < 1/10$), Нечести ($\geq 1/1000, < 1/100$), Редки ($\geq 1/10\,000, < 1/1000$), Много редки ($< 1/10\,000$) включващи изолирани доклади.

Нарушения на кръвта и лимфната система

Редки: анемия.

Нарушения на нервната система:

Редки: главоболие, парестезия, замаяност, периферна невропатия.

Гастро-интестинални нарушения

Редки: запек, коремна болка, газове, диспепсия, диария, гадене, повръщане, панкреатит.

Хепатобилиарни нарушения

Редки: хепатит/жълтеница.

Много редки: чернодробна недостатъчност

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Редки: обрив, пруритус, алопеция.

Мускуло-скелетни нарушения, нарушения в съединителната тъкан и костите

Редки: миопатия, рабдомиолиза (виж точка 4.4.), миалгия, мускулни схващания.

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

Редки: астения

Има редки съобщения за изявен синдром на свръхчувствителност, който включва някои от следните състояния: ангиоедем, лупус-подобен синдром, полимиалгия ревматика, дерматомиозит, васкулит, тромбоцитопения, еозинофилия, увеличена СУЕ, артрит и артракгия, уртикария, светложучувствителност, треска, зачервяване на лицето, диспнея и неразположение.

Изследвания:

Редки: увеличение в серумните трансаминази (аланин аминотрансфераза, аспартат аминотрансфераза, γ - glutamил транспептидаза) (виж точка 4.4. „Чернодробни ефекти”), увеличена алкална фосфатаза, увеличение в нивата на серумната КК (виж точка 4.4.)



4.9. Предозиране

До момента са били докладвани единични случаи на предозиране; максималната приета доза е 3.6 g. Всички пациенти са се възстановили без последствия. Няма специфично лечение в случай на предозиране, В такива случаи трябва да се предприеме симптоматично и поддържащо лечение.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1. Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: HMG-CoA редуктазни инхибитори

ATC Код: C10A A01

След перорално приложение, симвастатин, който е неактивен лактон, се хидролизира в черния дроб до съответната активна β -хидроксикислена, която има мощна потискаща активност спрямо HMG-CoA редуктазата (3 hydroxy – 3 methylglutaryl CoA reductase). Този ензим катализира превъръщането на HMG-CoA в мевалонат, ранна и скороствоопределяща стъпка в биосинтезата на холестерол.

Има данни, че симвастатин намалява нормални и повишени LDL-C концентрации. LDL се формира от липопротein с много ниска плътност (VLDL) и се кatabолизира основно от високо афинитетния LDL receptor. Механизмът на LDL-понижаващия ефект на симвастатин може да включва едновременно редукция на VLDL-холестероловата (VLDL-C) концентрация и включването на LDL receptor, което води до намалено производство и повишен кatabолизъм на LDL-C. Аполипопротein В също спада значително по време на лечение със симвастатин. В допълнение, симвастатин умерено увеличава HDL-C и намалява плазмения TG. В резултат на тези изменения, съотношението между общия холестерол спрямо HDL-C и LDL- към HDL-C се намалява.

Висок риск от коронарно сърдечно заболяване (CHD) или съществуващо коронарно сърдечно заболяване

В Heart Protection Study (HPS), ефектите от терапия със симвастатин са оценени за 20 536 пациента (на възраст 40-80 години), с или без хиперлипидемия и с коронарно сърдечно заболяване, друго оклузивно артериално заболяване или диабетис мелитус. В това изследване 10 269 пациента са приемали симвастатин 40 mg дневно, а 10 267 пациента са приемали плацебо в продължение на 5 години. В началото, 6 793 пациента (33%) са показали LDL-C нива под 116 mg/dL; 5063 пациента (25%) са показали нива между 116 mg/dL и 135 mg/dL; 8 680 пациента (42%) са имали нива повисоки от 135 mg/dL.

Лечението със симвастатин 40 mg дневно, сравнено с плацебо, значително намалява риска от смъртност (1328 [12.9%] при приемащи симвастатин пациенти, сравнено с 1507 [14.7%] при пациентите приемащи плацебо; $p = 0.003$), в резултат на 18% намаление в коронарната смъртност (587 [5.7%] срещу 707 [6.9%]; $p = 0.0005$; абсолютно намаляване на риска от 1.2 %). Понижението на смъртността, предизвикана от извън съдови причини не достига статистическа значимост. Симвастатин също така намалява риска от сериозни коронарни съдови състояния.



крайна точка, състояща се от не-фатален миокарден инфаркт или CHD смърт) с 27% ($p < 0.0001$). Симвастатин намалява необходимостта от коронарни реваскуларизационни процедури (включително коронарен артериален байпас или перкутанна транслуминална коронарна ангиопластика) и периферни или друг вид некоронарни реваскуларизационни процедури с 30% ($p < 0.0001$) и 16% ($p = 0.006$) съответно. Симвастатин снижава риска от мозъчен инсулт с 25% ($p < 0.0001$), което се дължи на намаляване с 30% на риска от исхемичен инсулт. Освен това, в подгрупата на пациенти с диабет, симвастатин намалява риска от развитие на макроваскуларни усложнения, включително периферни реваскуларизационни процедури (операции или ангиопластика), ампутации на долн крайник или язви на краката с 21% ($p = 0.0293$). Пропорционалното намаление на съответните събития е подобно при всяка подгрупа изследвани пациенти, включително тези без коронарна болест, които са имали церброваскуларно или периферно артериално заболяване (мъже и жени, на възраст под и над 70 години, с или без хипертензия, както и тези с LDL-холестерол под 3.0 mmol/l при включването в изпитването).

В Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S), ефектите от терапията със симвастатин на цялостната смъртност е оценена при 4 444 пациента с CHD и начални нива на холестерола при пациентите 212-309 mg/dL (5.5-8.0 mmol/L). В това многоцентрово, рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано клинично изследване, пациенти с ангина или предишен миокарден инфаркт (MI) са подложени на диета, стандартни грижи и или симвастатин 20-40 mg дневно ($n = 2 221$) или плацебо ($n = 2 223$) в продължение на средно 5.4 години. Симвастатин намалява риска от смъртни случаи с 30% (абсолютно намаление на риска от 3.3%). Рискът от смърт от CHD се намалява с 42% (абсолютно намаление на риска с 3.3%). Симвастатин също така намалява риска от сериозно коронарен инцидент (смърт от CHD и установен в болница тих, нефатален миокарден инфаркт) с 34%. Освен това, симвастатин значително намалява риска от фатални и нефатални мозъчно-съдови събития (удар и преходни исхемични атаки) с 28%. Не е отчетена статистически значима разлика между групите по отношение на несърдечно-съдовата смъртност.

Първична хиперхолестеролемия и комбинирана хиперхолестеролемия

В изследвания, сравняващи ефикасността и сигурността на симвастатин 10, 20, 40 и 80 mg дневно, при пациенти с хиперхолестеролемия, цялостното намаление на LDL-C е съответно 30, 38, 41 и 47%. В изследвания, сравняващи пациенти със смесена хиперлипидемия, приемащи симвастатин 40 mg и 80 mg, средното намаление на триглицеридите е съответно 28 и 33% (плацебо: 2%), като общите увеличения в HDL-C са 13 и 16% (плацебо: 3%), съответно.

5.2. Фармакокинетични свойства

Симвастатин е неактивен лактон, който се хидролизира до съответната β-хидроксикиселина, мощен инхибитор на HMG-CoA редуктаза. Хидролизата се извършва основно в черния дроб; скоростта на хидролиза в човешкия кръвоток е много ниска.



Резорбция

Симвастатин се абсорбира добре и претърпява first-pass ефект. Екстракцията в черния дроб зависи от кръвния ток в черния дроб. Черният дроб е и основното място на действие на активната форма. Наличността на β-хидроксикиселина в системната циркулация след перорална доза симвастатин е по-малко от 5 % от дозата. Максималните плазмени концентрации на активни инхибитори се достига приблизително 1-2 часа след приложението на симвастатин. Едновременната консумация на храна не влияе на резорбцията.

Фармакокинетиката на единична и многократни дози симвастатин не показват натрупване на медицинския продукт при многократни дози.

Разпределение

Белъчното свързване на симвастатин и неговия активен метаболит е над 95%.

Елиминиране

Симвастатин е субстрат на CYP3A4 (виж точки 4.3. и 4.5). Основните метаболити на симвастатин, откриващи се в човешката плазма са β-хидроксикиселина и 4 други активни метаболита. След перорална доза радиоактивен симвастатин, приета от човек, 13 % от радиоактивността и се отделя чрез урината, а 60 % чрез изпражненията, в рамките на 96 часа. Количество, открито в изпражненията представлява еквиваленти на резорбиран лекарствен продукт, изхвърлени чрез жълчния сок, както и нерезорбиран лекарствен продукт. След интравенозна инжекция на метаболита β-хидроксикиселина, полуживота му е средно 1.9 часа. Средно само 0.3 % от ИВ дозата се изхвърля в урината като инхибитори.

5.3. Предклинични данни за безопасност

Основано на конвенционални животински модели, относно фармакодинамика, токсичност при многократни дози, генотоксичност и карциногенност, не съществуват други рискове за пациентите, които да могат да се очакват въз основа на фармакологичният механизъм. При максимални толериирани дози при зайци и пълхове, симвастатин не води до фатални последици, нямаше ефект върху плодовитостта, репродуктивната способност на животните и неонаталното развитие.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1. Списък на помощните вещества

Ядро на таблетката:

Лактозаmonoхидрат

Микрокристална целулоза (E460)

Прежелатинизирано нишесте

Бутил хидроксианизол (E320)

Бутил хидрокситолуен (E321)

Аскорбинова киселина (E 300)

Лимонена киселина (E330)

Колоидален силициев диоксид (E551)

Талк (E553b)

Магнезиев стеарат (E470b)



Филмово покритие:

Хипромелоза (E464)
Червен железен оксид (Е172)
Жълт железен оксид (Е172)
Триетилов цитрат (Е1505)
Титанов диоксид (Е171)
Талк (Е553b)
Повидон K-30

6.2. Несъвместимости

Не е приложимо.

6.3. Срок на годност

3 години.

6.4. Специални условия на съхранение

Да не се съхранява при температура над 30°C. Да се съхранява в оригиналната опаковка, защитено от светлина и влага.

6.5. Данни за опаковката

Блистер PVC/PVDC/Al

Размер на опаковката: 10, 20, 28 и 30 таблетки.

Възможно е не всички опаковки да се предлагат на пазара.

6.6. Специални предпазни мерки при употреба

Няма специални изисквания

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegur 76-78,
220 Hafnarfjörður,
Исландия

8. РЕГИСТРАЦИОНЕН №

**9. ДАТА НА ПЪРВОТО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО
ЗА УПОТРЕБА**

10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Януари, 2008

