

Nurofen for children orange
Нурофен за деца с вкус на портокал
Ibuprofen 100mg/5ml
Суспенсия за деца

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ЛЕКАРСТВЕНАТА
Листовка - Приложение 2
Към РУ №: 1435 / 22.01.08
Одобрено: 9 / 04.12.07

Моля, прочетете внимателно листовката, преди да започнете да ползвате вашия лекарствен продукт. Запазете листовката, може да пожелаете да я прочетете отново.

Какво се съдържа в Нурофен за деца с вкус на портокал?

Полиетиленовото шише съдържа 100ml Нурофен за деца с вкус на портокал. Всяка опаковка съдържа дозировайна спринцовка. В 5ml суспенсия се съдържа 100mg ибупрофен - лекарственото вещество на лекарствения продукт.

В Нурофен за деца с вкус на портокал също се съдържат и помощни вещества – малцов сироп, вода, глицерол, лимонена киселина, натриев хлорид, натриев цитрат, захарин-натрий, ксантанова гума, полисорбат 80, домифен бромид и портокалова есенция.

Какъв лекарствен продукт е Нурофен за деца с вкус на портокал?

Лекарственото вещество на Нурофен за деца с вкус на портокал - Ибупрофен, принадлежи към групата на нестероидните противовъзпалителни лекарствени продукти (НСПВС), с основно действие понижаване на температурата и облекчаване на болка.

За какво се използва?

Нурофен за деца с вкус на портокал е суспенсия за кърмачета и деца над 3 месеца.

Отпуска се без лекарско предписание.

Приема се през уста и води до:

- Понижаване на температурата на вашето дете (включително и температура след имунизация)
- Облекчаване на лека до умерена болка, например при никнене на зъбки, зъбобол, възпаление на гърлото, болки в ушите, главоболие, слаби болки и навяхвания.

Следвайте инструкциите колко често и по-колко да давате от продукта на вашето дете.

Какво трябва да знаете преди започване на лечението с този лекарствен продукт:

Да не се дава на кърмачета и деца, ако:

- имат стомашна язва, получавали са кървене от стомашно – чревния тракт или перфорация след прием на НСПВС
- са с данни за астма, ринит, уртикария и алергии към ацетилсалицилова киселина или други НСПВС
- страдат от тежка чернодробна, бъбречна и сърдечна недостатъчност и заболявания, свързани с намален имунитет
- са алергични към лекарственото вещество или към някое от помощните вещества
- има наследствена непоносимост към фруктоза (плодова захар), тъй като организма може да произвежда малки количества фруктоза от съставката - малцов сироп

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да започнете да давате Нурофен за деца с вкус на портокал, ако вашето дете:

- има астма
- има бъбречни, чернодробни или сърдечни проблеми
- има наследствена непоносимост към фруктоза



- след имунизация все още поддържа висока температура и Вие мислите, че може да се наложи да дадете трета доза от този лекарствен продукт.

Посъветствайте се с лекуващия лекар преди употреба, ако детето Ви приема други лекарствени продукти или редовно взема лекарствени продукти за хронични заболявания, както следва:

- приема други болкоуспокояващи или други НСПВС, като ибупрофен и ацетилсалицилова киселина. **Нурофен за деца с вкус на портокал** не трябва да се приема заедно с ацетилсалицилова киселина и други НСПВС
- противосъсирващи (антикоагуланти) лекарствени продукти
- лекарствени продукти за високо кръвно налягане (антихипертензивни)
- лекарствени продукти за увеличаване отделянето на урина (диуретици)
- литий и метотрексат
- кортикостероиди

Някои хора могат да имат непоносимост към определени съставки, като малц и глицерол (известен също като глицерин).

- Малцът може да има лек разхлабващ ефект
- Глицеролът може да причини главоболие, стомашни болки или диария

Този лекарствен продукт може да се ползва при необходимост и от възрастни.

- Бременни жени трябва да се консултират с лекар преди употребата му. Лекарственият продукт не трябва да се използва през последния триместър на бременността.
- Възрастните трябва да са осведомени за единични случаи на употреба на НСПВС, прилагани, продължително и при по-високи дози, които могат да повлияят временно и обратимо възможността за забременяване.
- Предупрежденията и горната информация се отнасят и за възрастни.

Предупреждения:

Лекарства като **Нурофен за деца с вкус на портокал** могат да бъдат свързани с леко увеличен риск от сърдечен инцидент („миокарден инфаркт“) или инсулт. Всеки риск е по-вероятен при високи дози и при продължително лечение. Не превишавайте препоръчаните дози и продължителността на лечението 3 дни.

Ако имате проблеми със сърцето, прекаран инсулт или мислите, че за Вас може да има риск от появата им (например ако имате високо кръвно налягане, диабет, повишени стойности на холестерол или сте пушач) трябва да обсъдите лечението с Вашия лекар или фармацевт.

Как да се използва Нурофен за деца с вкус на портокал ?

Прочетете внимателно листовката преди употреба.


Махнете капачката, натиснете я надолу и я завъртете по посока на часовниковата стрелка. В зависимост от възрастта на вашето дете използвайте дозироваща спринцовка.

► Указание за използване на 5 милилитровата спринцовка, за улеснение при дозиране.

1. Поставете дозиращата спринцовка в гърлото на бутилката.
2. Добре разклатете шишето.
3. За да напълните спринцовката - обърнете бутилката надолу и внимателно издърпайте буталото, за да изтеглите необходимото количество от суспенсията, отбелязано на спринцовката.
4. Обърнете бутилката обратно и махнете дозиращата спринцовка.
5. Сложете края на спринцовката в устата на детето. Натиснете буталото надолу, за да излеете суспенсията.

След употреба поставете отново капачката, измийте спринцовката с топла вода и я оставете да изсъхне.

Съхранявайте я на място, недостъпно за деца.



■ Температура, предизвикана от имунизация:

- Дайте 2.5ml Ако е необходимо дайте още 2.5ml 6 часа по-късно.
- Не давайте повече от две дози по 2,5ml за 24 часа.

Ако температурата не се понижава, не давайте трета доза.

Консултирайте се задължително с лекуващия лекар.

■ Температура и болка:

Този лекарствен продукт е за кратковременна употреба.

Ако симптомите на вашето дете продължат повече от 3 дни, консултирайте се с лекуващия лекар.

- **Кърмачета от 3 до 6 месеца:** Една доза от 2.5ml се приема 3 пъти дневно за 24 часа.
- **Кърмачета от 6 до 12 месеца:** Една доза от 2.5ml се приема 3-4 пъти за 24 часа
- **Деца от 1 до 3 години:** Една доза от 5ml се приема 3 пъти за 24 часа
- **Деца от 4 до 6 години:** 7,5ml (5ml+2.5 ml) доза се приема 3 пъти за 24 часа
- **Деца от 7 до 9 години:** Две 5ml дози се приемат 3 пъти за 24 часа.
- **Деца от 10 до 12 години:** Три 5ml дози се приемат 3 пъти дневно за 24 часа.

Предупреждение: Не превишавайте посочената доза!

Какво да правите, ако дадете на детето си твърде голямо количество?

Проблеми с предозиране са рядко срещани, но ако случайно дадете повече от препоръчаната доза, незабавно уведомете лекуващия лекар.

Нежелани лекарствени реакции:

Нежеланите реакции са много редки и могат да бъдат някои характерни за НСПВС или някои, дължащи се на другите съставки. При появата на някои от тях, **СПРЕТЕ ДА ДАВАТЕ** лекарствения продукт и се консултирайте незабавно с лекар:

- Следи от кръв в изпражненията
- Оцветени в тъмно изпражнения
- Повръщане със следи от кръв или тъмни, с цвят на кафе частици
- Подуване на лицето – **потърсете незабавно лекарска помощ** (случва се рядко и може да е тежка алергична реакция)

Лекарства като **Нурофен за деца с вкус на портокал** могат да бъдат свързани с леко повишен риск от сърдечен инцидент („миокарден инфаркт“) или инсулт.

Спрате да взимате лекарствения продукт и се консултирайте с лекар ако се появи:

- Нарушено храносмилане и киселини в стомаха
- Болки в стомаха или други стомашни проблеми
- Други нежелани лекарствени реакции: лек слабителен ефект, в редки случаи - обрив, сърбеж или влошаване на астма, внезапни хрипове или затруднено дишане, лющене на кожата, склонност към лесно получаване на синини, замайване, нарушение на слуха, главоболие, влошаване на колит, възпаление на мозъчната обвивка, без да е причинено от инфекция, чернодробни и бъбречни проблеми.

Съхранение:

Няма специални условия на съхранение.


След отваряне на опаковката срокът на съхранение е до 6 месеца.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се употребява преди изтичане срока на годност, посочен на етикета.

Как да получите повече информация за Нурофен за деца с вкус на портокал?

Най-важната информация е дадена в тази листовка. Ако имате допълнителни въпроси, след като сте я прочели, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт, които ще Ви дадат допълнителна информация.



Притежател на разрешението за употреба:
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.
103-105 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3UH
Великобритания

Производители:

1. BSM Ltd.

1 Thane Road, Nottingham,
Nottinghamshire NG90 2DB
Великобритания

2. Hermal Kurt Herrmann GmbH & Co

Scholtzstrasse 3
D-21465 Reinbeck
Германия

Последна редакция на текста: март, 2007

