

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1. Търговско име на лекарствения продукт

FLIXOTIDE™ 125 Inhaler (ФЛИКСОТИД 125 Инхалер)
FLIXOTIDE™ 250 Inhaler (ФЛИКСОТИД 250 Инхалер)

2. Количество и качествен състав

Flixotide 125 Inhaler, представлява контейнер под налягане с дозираща помпа, която освобождава 125 µg fluticasone propionate при всяко впръскване (доза). Всеки контейнер съдържа 60 или 120 дози (впръсквания).

Flixotide 250 Inhaler, представлява контейнер под налягане с дозираща помпа, която освобождава 250 µg fluticasone propionate при всяко впръскване (доза). Всеки контейнер съдържа 60 или 120 дози (впръсквания).

3. Лекарствена форма

Суспензия под налягане за инхалация.

4. Клинични данни

4.1. Показания

Бронхиална астма

За постигане на контрол (терапевтична ремисия) при възрастни с:

- Лека персистираща форма на бронхиална астма (стойности на ВЕД над 80 % спрямо базовите и вариабилност под 20 %): пациенти с необходимост от по-често симптоматично лечение с бронходилататор

- Среднотежка форма на бронхиална астма (стойности на ВЕД 60-80 % спрямо базовите и вариабилност 20-30 %): тоест пациенти, при които е необходимо редовно противовъзпалително лечение на бронхиална астма или пациенти с нестабилна или прогресираща форма на болестта

- Тежка форма на бронхиална астма (стойности на ВЕД под 60 %, спрямо базовите, и вариабилност над 30 %): пациенти с тежка хронична форма на бронхиална астма. При много пациенти, нуждаещи се от системно лечение с кортикоステроиди с цел контрол върху симптоматиката, приложението на инхалаторен fluticasone propionate, може да доведе до значително редуциране на дозата или елиминиране на необходимостта от перорален кортикостероид.

Хронична Обструктивна Белодробно Болест (ХОББ)

Симптоматично лечение на ХОББ:

При проведените клинични изследвания се установява, че редовното приложение на инхалаторен fluticasone propionate води до подобряване на дихателната функция, ограничаване на симптомите на ХОББ, редуциране на честотата и тежестта на обострянията и нуждата от допълнителен перорален прием на кортикостероиди. Също така се забавя процеса на влошаване здравното състояние на пациентите.

4.2. Дозировка и начин на приложение

Flixotide Inhaler се прилага инхалаторно само през устата.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО	
Приложение към №-5661, №-5662 разрешение за употреба № 17.02.02-	
623/25.06.2002	<i>Мария</i>



Пациентите трябва да имат предвид, че инхалаторният fluticasone propionate се използва за контрол на заболяването и независимо от наличието или липсата на симптоми, лекарството трябва да се приема редовно. Ефектът от терапията се проявява 4-7 дни след началото на лечението. При пациенти, които не са приемали инхалаторни кортикоステроиди може да се наблюдава промяна в състоянието още след първите 24 часа.

Дозата на fluticasone propionate трябва да се определя в зависимост от индивидуалния отговор към терапията.

Необходимо е повишено внимание при пациенти, съобщаващи за отслабващ ефект на бързодействащия бронходилататор или нужда от по-чест прием спрямо предписания.

Предписаната дневна доза по възможност да се приема в два приема.

При пациенти, които се затрудняват с координацията при използването на инхалатора, Flixotide може да се прилага с помощта на обемна камера за инхиляране Volumatic™.

4.2.1. Дозировка при бронхиална астма

Дозировка при възрастни и деца над 16 години: 250 до 1000 µg два пъти дневно.

Началната доза инхалаторен fluticasone propionate е препоръчително да се определя в зависимост от тежестта на състоянието:

- Лека форма на бронхиална астма - до 250 µg два пъти дневно.
- Среднотежка форма на бронхиална астма - от 250 до 500 µg два пъти дневно.
- Тежка форма на бронхиална астма - от 500 до 1000 µg два пъти дневно.

След това дозата може да се промени до постигане на контрол върху състоянието или в зависимост от индивидуалния отговор към терапията може да се редуцира до минималната ефективна доза.

За ориентирано определяне на първоначалната доза Flixotide може да послужи половината от дневната доза на инхалаторен beclomethasone dipropionate или негов еквивалент.

Тежката форма на бронхиална астма изиска редовна оценка на състоянието поради риска от летален изход. При тях е необходим прием на високи дози инхалаторен (вж.4.2.) или перорален кортикостероид. При внезапно влошаване на състоянието може да се наложи повишаване на дозата на кортикостероида. Описаното повишаване на дозата трябва да се назначи от лекар.

Специални групи пациенти:

Не е необходима промяна в дозата при пациенти в напреднала възраст или при такива с бъбречно или чернодробно увреждане.


4.2.2. Дозировка при ХОББ

Дозировка при възрастни: 500 µg два пъти дневно.

Пациентите трябва да имат предвид, че Flixotide трябва да се използва редовно, което обуславя по-голям терапевтичен успех. Промяна в състоянието се установява след 3 до 6 месеца. Ако все пак не се наблюдава подобрене при лечение в продължение на 3 до 6 месеца, е необходима клинична оценка на състоянието.

4.3. Противопоказания

Свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта.



4.4. Специални предупреждения и специални предпазни мерки при употреба

Лечението на астмата трябва да следва стъпаловидна програма. Повлияването на пациента трябва да се контролира клинично и чрез функционални изследвания на дишането.

Засилената употреба на бързодействащи инхалаторни β_2 агонисти показва влошаване на бронхиална астма. Препоръчва се при тези условия да се промени терапевтичния план на лечение.

Внезапното и прогресиращо влошаване на контрола върху заболяването може да доведе до смърт. Препоръчва се повишаване на дозата на кортикоステроиди. При пациенти с повишен риск се препоръчва ежедневно наблюдение на ВЕД.

Fluticasone propionate инхалер не се препоръчва за овладяване на пристъпите. Лекарството е показано за продължително лечение на заболяването. За овладяване пристъпите на бронхиална астма е необходимо приложение на бързодействащи инхалаторни бронходилататори.

При липса на отговор към терапията или обостряния на бронхиална астма се препоръчва повишаване дозата на инхалаторния fluticasone propionate, като при необходимост може да се приложи системно лечение с кортикоステроиди и/или антибиотици при наличие на инфекция.

Трябва да се провери техниката на инхалиране на пациента, за да се установи наличието на синхрон между вдишване и инхалиране. Постигането на синхрон е от голямо значение за доброто разпределение на лекарството в белия дроб.

Може да се развият нежелани реакции от страна на целия организъм при приложение на инхалаторни кортикоステроиди, особено при прием на високи дози за дълъг период от време. Тези реакции се развиват по-често при приложение на перорални кортикоステроиди. Възможна е изявата на реакции като надбъбречна супресия, забавяне на растежа при деца и подрастващи, редуциране на костната минерална плътност, катараракта и глаукома. По тази причина е важно да се приема най-ниската терапевтична доза инхалаторен кортикоステроид за ефективен контрол върху състоянието (вж. 4.8).

Препоръчва се редовно проследяване на промените в ръста при деца на продължително лечение с инхалаторни кортикоステроиди.

При някои пациенти може да се установи повищена чувствителност към ефектите на инхалаторни кортикоステроиди в сравнение с реакцията на по-голяма част от лекуваните лица.

В повечето случаи при приложение на fluticasone propionate в препоръчани дози, надбъбречните функции и резерви се запазват в референтни граници. Промяната в състоянието в резултат от терапията с инхалаторен fluticasone propionate, може да доведе до редуциране на нуждите от перорални кортикоステроиди. Въпреки това, има възможност за развитие на нежелани реакции за известен период от време, като те са в резултат от проведена или интермитираща терапия с перорални кортикоステроиди. Препоръчва се клинична оценка на нарушената надбъбречна функция, преди да се пристъпи към терапия за нейното овладяване.

При спешни или планови операции и манипулации трябва винаги да се има предвид възможността за влошен отговор от страна на надбъбрека, което налага преценка на нуждата от подходящо кортикоステроидно лечение.

При преминаване от перорални кортикоステроиди към инхалаторно лечение с fluticasone propionate се препоръчва повишено внимание и редовно проследяване на надбъбречната функция. Съществува възможност за развитие на нежелани реакции от страна на надбъбрека в отговор на терапията.

При преминаване от перорални кортикоステроиди към инхалаторна терапия с fluticasone propionate се препоръчва постепенно редуциране дозата на пероралния кортикоステроид. Препоръчва се пациентите да носят предупредителна карта за възможна нужда от допълнителна доза от кортикоステроида при условия на стрес.

По подобен начин преминаването от системна към инхалаторна терапия с кортикоステроид може да доведе до проява на маскирани алергични състояния като алергичен



ринит или екзема. Приемът на системни кортикоステроиди води до потискане на тяхната изява. Препоръчва се симптоматично лечение с антихистаминови и/или продукти за локално приложение, включително локални кортикостероиди.

Лечението с fluticasone propionate инхалер трябва да се спира постепенно.

Подобно на другите кортикостероиди за инхалаторно приложение, се препоръчва повишено внимание при пациенти с активна или латентна белодробна туберкулоза.

4.5. Лекарствени и други взаимодействия

След инхалаторно приложение се достигат ниски концентрации на лекарството в плазмата. По тази причина не се очаква развитие на клинично значими лекарствени взаимодействия. Препоръчва се повишено внимание при едновременно приложение на препарати, известни като високоактивни инхибитори на ензима CYP 3A4 (напр. ketoconazole, ritonavir). Тези лекарства може да доведат до повишаване на системната експозиция на fluticasone propionate.

4.6. Бременност и кърмене

Няма достатъчно доказателства за безопасността от приложение на fluticasone propionate по време на бременност при човека. При репродуктивни изследвания при животни се установяват нежелани ефекти, характерни за глюокортикоиди само след прием на дози, които водят до системна експозиция, многократно надвишаваща тези стойности при инхалаторно приложение на fluticasone propionate в терапевтични дози. Не се установява токсичност върху генома при проведените тестове за мутагенност.

Въпреки това, както при всички други лекарства, по време на бременност fluticasone propionate може да се прилага само ако очакваната полза от лечението на майката е по-голяма от възможния рисък за плода.

Кърмене:

Не са провеждани изследвания за екскретирането на fluticasone propionate в кърмата при човека. При достигане на измерими плазмени нива на продукти, след подкожно приложение при кърмещи лабораторни пълхове, fluticasone propionate се установява в кърмата. След инхалаторно приложение на fluticasone propionate в терапевтични дози се очакват ниски плазмени концентрации.

4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Не се очаква fluticasone propionate да води до такива.

4.8. Нежелани лекарствени реакции

При някои пациенти се описва појава на кандидоза на устата и гърлото.

Изплакването на устата с вода след инхалиране може да ограничи тези прояви при повечето пациенти.

По време на лечение с fluticasone propionate инхалер, симптоматичната кандидоза може да се лекува с локални противогъбични продукти.

При някои пациенти приложението на инхалаторен fluticasone propionate може да доведе до дрезгавост в гласа. Изплакването на устата с вода след инхалиране може да ограничи тези прояви.

Както при инхалаторното приложение на други продукти е възможно да се развие парадоксален бронхоспазъм с увеличаване на хрипотенето веднага след приложението на дозата. Тази реакция трябва да се третира незабавно с приложение на бързодействащ инхалаторен бронходилататор. Приема на fluticasone propionate инхалер трябва веднага да



бъде преустановен. Необходимо е да се направи оценка на състоянието на пациента и при необходимост да се обмисли алтернативна терапия.

Описват се реакции на свръхчувствителност от страна на кожата.

Докладвани са редки случаи на лицев и орофарингеален оток.

Възможно е развитие на нежелани реакции като супресия функцията на надбъбрека, забавяне на растежа при деца и подрастващи, намаляване на костната минерална плътност, катаракта и глаукома (вж. 4.4).

4.9. Предозиране

Случайното инхиалиране на fluticasone propionate в дози, по-високи от терапевтичните, може да доведе до временна супресия на надбъбречната функция. В тези случаи не е необходимо лечение. Функцията на надбъбрека се възстановява след период от няколко дни, като това може да се обективизира чрез измерване стойностите на плазмения кортизол. По-силно проявено потискане на надбъбречната функция може да се развие при предозиране за по-дълъг период от време. В тези случаи може да е необходимо проследяване на процеса на регенериране на надбъбрека. В случай на предозиране, fluticasone propionate може да се приема в дози, необходими за контрол на състоянието.

5. Фармакологични данни

ATC код: R03BA05

5.1. Фармакодинамични свойства


При инхалаторно приложение в препоръчани дози fluticasone propionate притежава силен глукокортикоиден противовъзпалителен ефект върху белия дроб.

При пациенти на лечение с бронходилататор или други продукти за профилактика, приложението на лекарството води до редуциране на симптомите и пристъпите на бронхиална астма. При приложение в препоръчани дози не променя надбъбречната функция или резерви при голяма част от пациентите.

Също така води до ограничаване на симптомите при ХОББ и подобряване на дихателната функция независимо от възрастта, пола, дихателния статус на пациента преди лечението, тютюнопушенето или реактивността на организма към алергени. По този начин може да се постигне значително подобреие на качеството на живот.

5.2. Фармакокинетични свойства

Абсолютната бионаличност на инхалаторен fluticasone propionate варира приблизително между 10 и 30 % от приетата доза, като зависи от устройството за инхиалиране. Лекарството се резорбира предимно в белия дроб. Скоростта на резорбцията отначало е висока като постепенно намалява. Останалата част от инхиалираната доза може да се погълне. Това може да повиши системната експозиция в много малка степен поради слабата разтворимост и прехепаталния метаболизъм на продукта, като се установяват стойности на орална бионаличност под 1 %. При графично представяне, повишаването на инхиалираната доза води до линейно нарастване на системната експозиция. Елиминирането на fluticasone propionate се определя от високите стойности на клирънс от плазмата (1150 ml/min), големият обем на разпределение при steady state (приблизително 300 l) и крайно време на плазмен полуживот 8 часа. Установява се на ензими Р450 CYP 3A4, до неактивен метаболит на карбоксиловата киселина. Fluticasone propionate се елиминира за кратко време от циркулацията, основно чрез метаболизиране с участие на ензими Р450 CYP 3A4, до неактивен метаболит на карбоксиловата киселина. Fluticasone propionate се елиминира непроменен през бъбреците в много ниска степен (< 0,2 %) и около 5 % под формата на метаболит. Препоръчва се повищено внимание при едновременно



приложение с продукти, познати като инхибитори на ензима CYP 3A4. Тези лекарства може да доведат до повишаване на системната експозиция на fluticasone propionate.

5.3. Предклинични данни за безопасност

При проведени изследвания за токсичност се установяват нежелани реакции, типични за високоактивните кортикоиди само при прием на дози, многократно надвишаващи терапевтичните. Не се установяват значими ефекти при проведени тестове за токсичност с повтарящи дози, изследвания за тератогенност или репродуктивна способност.

При условия *in vitro* и *in vivo* не се установява мутагенна активност на fluticasone propionate. Не се установява канцероген потенциал на продукта при гризачи. При лабораторни животни лекарството не води до дразнене и сенсибилизиране.

Не се установява токсичност причинена от помощното вещество-пропелант HFA 134a. Изследването е проведено при много високи концентрации, надвишаващи многократно тези в инхалаторното устройство. Различни животински видове са изследвани за ефекта на веществото в продължение на 2 години.

6. Фармацевтични данни

6.1. Списък на помощните вещества и техните количества

Помощно вещество	Количество на доза
HFA 134a (P134a, norflurane, 1,1,1,2-tetrafluoroethane)	to 75 mg

6.2. Физикохимични несъвместимости

Не са описани.

6.3. Срок на годност

24 месеца. при съхранение при температура под 30°C.

6.4. Специални условия за съхранение

Flixotide Inhaler не трябва да се съхранява при температура над 30°C.

Да не се замразява. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Както при повечето инхалаторни продукти в опаковки под налягане, терапевтичният ефект на това лекарство може да намалее, когато флаконът е изстуден.

Флаконът да не се пробива, чупи или изгаря, даже ако ви се струва празен.

6.5. Дани за опаковката

Flixotide 125 Inhaler и Flixotide 250 Inhaler съдържат суспенсия от fluticasone propionate в пропелант HFA 134a, без фреони. Суспенсията се съдържа в контейнер от алуминий, запечатан с дозираща помпа - клапа. Алуминиевият контейнер е поставен в пластмасово устройство с разпръскаща дюза, наконечник и защитна капачка.

Количество в една опаковка: 60 или 120 инхалаторни дози.

6.6. Препоръки при употреба

Проверка на инхалера:

Преди да използвате инхалера за първи път или ако вашия инхалер не е бил използван в продължение на една седмица или повече, отстранете капачката на наконечника, която се



поставя в устата чрез внимателно стисване от двете ѝ страни, разклатете инхалера добре и пръснете един път във въздуха, за да се уверите, че работи.

Използване на инхалера:

- 1) Отстранете капачката на наконечника чрез внимателно притискане от двете страни и проверете отвътре и отвън дали наконечника е чист.
- 2) Разклатете инхалера добре.
- 3) Дръжте инхалера между пръстите и палеца, като палеца поставете долу под наконечника.
- 4) Издишайте и след това поставете наконечника в устата си между зъбите и затворете устни около него, без да го захапвате.
- 5) Веднага, след като започнете вдишването през устата натиснете върха на инхалера, за да впръскате fluticasone propionate, като вдишвате продължително и дълбоко.
- 6) Докато задържате дъха си, извадете инхалера от устата и махнете пръста от върха на инхалера. Задръжте дъха си докато ви е възможно.
- 7) Ако трябва да поемете повече на брой дози, задръжте инхалера нагоре и изчакайте половин минута, след което повторете действията от т.2 до т.6.

Наконечника се затваря чрез силно притискане на капачката.

ВАЖНО! Изпълнявайте възможно по-бавно действията от точка 4, 5 и 6. Важно е да започнете да дишате, колкото е възможно по-бавно точно преди задействането на инхалера.

Упражнявайте се пред огледало пъrvите няколко пъти. Ако след инхиалиране видите капчици по вашия инхалер или отстрани по устните си трябва да повторите приема от т.2.

Ако лекувация ви лекар е дал други инструкции за употреба на инхалера, моля спазвайте ги внимателно. Ако нещо ви притеснява, смущава или не го разбирате, попитайте вашия лекар.

При пациенти със слаба мускулна сила на ръцете се препоръчва инхалерът да се държи с двете ръце. Двата показалеца трябва да се поставят на върха на инхалера, докато двата палеца се държат върху основата под наконечника.

Почистване:

Вашият инхалер трябва да бъде почистван поне веднъж седмично по следния начин:

- 1) Извадете металния флакон от пластмасовата част на инхалера и отстранете капачката на наконечника, който се поставя в устата.
- 2) Изплакнете пластмасовата част с наконечника в топла вода.
- 3) Оставете ги да изсъхнат на сухо и топло място. Не ги нагрявайте.
- 4) Отново поставете на място флакона и капачката.

Във водата може да се постави слаб детергент или разтвор от типа на тези за измиване на бутилки за хранене на бебета (потърсете съвета на фармацевт). След това се препоръчва да се изплакне обилно с чиста вода преди подсушаване. Не поставяйте металния флакон във вода.

7. Име и адрес на притежателя на разрешението за употреба

Glaxo Group Ltd.
Greenford road, Greenford,
Middlesex UB6 0NN, UK

Производител

Glaxo Wellcome Production
Zone Industrielle No 2
23 rue Lavoisier
27000 Evreux



France

8. Регистрационен номер в регистъра по чл. 28 ЗЛАХМ

9. Дата на първо разрешаване за употреба на лекарствения продукт

Дата на първо разрешение за употреба в България:

Flixotide inhaler (CFC-free) без фреони 125 µg/dose - 09.06.1999 г.

Flixotide inhaler (CFC-free) без фреони 250 µg/dose - 09.06.1999 г.

10. Дата на (частична) актуализация на текста

*Издание № 08
21.06.2001 г.*

