

**ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ**

**Hexoral® oromucosal spray**  
**Хексорал спрей за устна лигавица**  
Hexetidine (хексетидин)

ИЗДАВАТЕЛСТВО "ЛЕКАРСТВО" АД	ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕКАРСТВО" АД
ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕКАРСТВО" АД	
Към РУ № 11699 / 13.03.08	
Одобрено: 12 / 12.02.08	

**Прочетете внимателно цялата листовка тъй като тя съдържа важна за Вас информация.**  
Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват 10 дни.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

**В тази листовка:**

1. Какво представлява Хексорал и за какво се използва
2. Преди да използвате Хексорал
3. Как да използвате Хексорал
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Хексорал
6. Допълнителна информация

**1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ХЕКСОРАЛ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА**

Хексорал спрей принадлежи към група лекарства с антимикробно и противогъбично действие (антисептици) и е ефективен срещу повечето болестотворни микроорганизми в устата и гърлото. Хексорал спрей се използва за:

- като поддържащо локално лечение
- на възпалителни и инфекциозни заболявания на устата и гърлото,
- на тежки гнойни заболявания на устата и гърлото, протичащи с фебрилитет и изискващи лечение с антибиотици или сулфонамиди;
- за предотвратяване на суперинфекция;
- преди и след хирургически интервенции в областта на устата и фаринкса;
- за устна хигиена в случай на общи заболявания;
- против лош дъх, специално при тумори в разпад в устата и гърлото;
- като допълнително средство при лечение на простудни състояния.

**2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ХЕКСОРАЛ**

**Не използвайте Хексорал**

- ако сте алергични (свърхчувствителни) към хексетидин или към някоя от останалите съставки на Хексорал.
- при деца под 3 години

**Обърнете специално внимание при употребата на Хексорал**

- Хексорал не трябва да се използва продължително време. Ако симптомите са персестират повече от 10 дни, лечението трябва да се прецени отново.

**Прием на други лекарства**

Моля информирайте Вашия фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.



Не се препоръчва едновременната или последователна употреба на други антисептици.

### **Бременност и кърмене**

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

До момента не са известни нежелани ефекти при приложението на разтвора Хексорал по време на бременност и кърмене.

Хексорал спрей трябва да се използва при бременност само след строга преценка на съотношението полза/риск, тъй като няма достатъчно налични данни за преминаването през плацентата и екскрецията на субстанцията в кърмата.

### **Шофиране и работа с машини**

Хексорал не повлиява способността за шофиране и работа с машини

## **3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ХЕКСОРАЛ**

### *Възрастни и деца на 6 и повече години*

Напълно ефективна доза Хексорал спрей се получава след впръскване за 1 - 2 секунди.

Ако не е предписано друго, се прилага 2 пъти дневно за предпочитане сутрин и вечер след хранене.

Хексорал в някои случаи може да се прилага и по-често.

Хексетидин полепва по лигавицата и по този начин осигурява продължителен ефект, затова той трябва да се прилага след хранене.

Продължителността на лечение не трябва да превишава 10 дни. По-продължителен курс на лечение може да се определя от лекар.

### *Деца от 3 до 6 години*

Както е предписано от лекуващия лекар.

### *Деца под 3 години*

Приложението на това лекарство не е препоръчително в тази възрастова група.



Лекарството се впръсква в устата и гърлото. По този начин заболелите участъци се третира специфично, бързо и удобно.

Моля, спазвайте следните инструкции:

Поставете впръскващата тръбичка върху съответстващия наконечник на флакона, като леко притискате. Не насочвайте дюзата на впръскващата тръбичка към тялото.

Поставете впръскващата тръбичка в устата и я насочете към местата, които трябва да бъдат третирани в устата и гърлото, вижте схемата по-долу. Докато впръсквате, винаги дръжте флакона в изправено положение.

Впръскайте необходимото количество Хексорал спрей, като натиснете капачето за 1 - 2 секунди. Не вдишвайте по време на впръскването.



**Ако сте приели повече от необходимата доза Хексорал**  
Поглъщането на големи количества може да доведе до повръщане.

**Ако сте пропуснали да използвате Хексорал**  
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

#### **4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ**

Както всички лекарства, Хексорал спрей може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В някои случаи могат да се наблюдават алергични реакции (реакции на свръхчувствителност), алергични контактни дерматити, усещане за парене, слаб локален анестетичен ефект, промяна на вкуса.

#### **5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ХЕКСОРАЛ**

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Хексорал спрей след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява под 25°C.

#### **6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

##### **Какво съдържа Хексорал**

- Активното вещество е хексетидин 200 mg
- Другите съставки са: захарин натрий, лимонена киселина монохидрат, натриев хидроксид, глицерол, макрогол лаурил етер, ментов аромат (33С071), азот, пречистена вода

##### **Как изглежда Хексорал и какво съдържа опаковката**

Флакон: Пластична алуминиева опаковка под налягане с вътрешна обвивка, снабдена с апликатор от полипропилен с дюза от полиетилен с ниска плътност  
Бутилка с 40 ml спрей в картонена кутия.

**Притежател на разрешението за употреба**  
PFIZER EUROPE MA EEIG  
Ramsgate Road, Sandwich, Kent  
Англия CT13 9NJ

**Производител**  
Pfizer PGM GmbH  
5 avenue de Concorde  
45071 Orleans Cedex 2  
Франция

Дата на последно одобрение на листовката {мм /гггг}.

