

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВА	
Листовка - Приложение 2	
Към РУ №:	111 1659, 29.02.08
Одобрено:	10/18.12.07

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

ИМОМЕД

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарството.

- Запазете тази листовка. Може да имате нужда дая прочетете отново.
- Ако имате допълнителни въпроси, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преостъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.

В тази листовка ще намерите:

1. Какво представлява Имомед и за какво се използва;
2. Преди да приемете Имомед таблетки;
3. Как да приемате Имомед таблетки;
4. Възможни нежелани реакции;
5. Съхранение на Имомед таблетки;
6. Допълнителна информация;

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЛЕКАРСТВОТО

Името на Вашето лекарство е ИМОМЕД (IMOMED)

Състав

Всяка таблетка ИМОМЕД съдържа лоперамид хидрохлорид 2mg

Помощни вещества:

Нишесте, лактоза, повидон, брилянтно синьо, хинолиново жълто, магнезиев стеарат, талк, колоидален силиконов диоксид, натриев нишестен гликолат.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Медика АД

Бул. "Княз Ал. Дондуков" № 82

София, 1504

Телефон 96 00 330

Факс 96 00 330

E-mail sofia@medica.bg

ПРОИЗВОДИТЕЛ

МЕДИКА АД

Сандански, 2800, Индустритна зона

Телефон 0746/ 34 276

Факс 0746/ 34 140

E-mail info@medica.bg



За какво се използва Имомед?

ИМОМЕД се прилага за краткотрайно симптоматично лечение на остро разстройство (диария) или при продължаваща (хронична) диария.
Прилага се и вслучай с диария след оперативно отстраняване на част от червата

ПРЕДИ ДА ПРИЕМАТА ИМОМЕД ТАБЛЕТКИ

Не трябва да приемата Имомед в следните случаи:

- съръччувствителност към някоя от съставките;
- състояния, при които трябва да се избегне забавяне функцията на червата например подут корем, запек и преплитане на червата;
- разстройство придруженено с повишена температура и/или кървави изпражнения;
- разстройство при което е установено възпаление на дебелото черво (улцерозен колит или псевдомембранизен колит, възникващ, в резултат на антибиотично лечение),
- не се препоръчва за употреба Имомед при деца под 12 години

Преди да започнете лечението с Имомед обърнете особено внимание

При разстройство се губят значително количество течности и електролити. Поради това трябва да компенсирате тази загуба като приемате много повече течности, отколкото бихте приемали нормално. Това важи в особена степен за деца.

При остра диария прилагането на ИМОМЕД преустановява появите ѹ до 48 часа.

При отсъствие на ефект, спрете лекарството и се обърнете към Вашия лекар.

При нарушена чернодробна функция, уведомете Вашия лекар; Вие може да се нуждаете от стриктно лекарско наблюдение при лечение с Имомед.

Не се изиска коригиране на дозата на пациенти с бъбречно заболяване, тъй като по-голяма част от лекарството се отделя с фекалите.

Употреба при деца

Имомед се дава на деца над дванадесет годишна възраст, но не повече от 4 таблетки за 24 часа.

Ако сте бременна или кърмете

Няма достатъчно данни за употребата на продукта при бременни жени, поради което Имомед не трябва да се прилага по време на бременност.

Препоръчва се да не се приема Имомед по време на кърмене, тъй като малки количества преминават във Вашата кърма.

Ако шофирате или работите с машини

Досега не са известни ефекти върху способността за шофиране и работа с машини. Поради това, че диарията може да предизвика умора, виене на свят или сънливост, препоръчително е да се внимава при шофиране или работа с машини.

Как да приемате Имомед ?

Имомед може да се прилага по всяко време на деня.

Вземете едновременно две таблетки, след което приемайте по една таблетка след всяка диарична дефекация. Продължителността на приложение е не повече от



дни. Ако разстройството продължава повече от 2 дни, трябва да се обърнете за консултация към Вашия лекар.

Не приемайте повече от 8 таблетки за 24 часа!

Спрете да давате Имомед, ако изпражненията се нормализират или няма повече изхождания в продължение на 12 часа. Ако се съмнявате, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

Може ли да се приема Имомед с други продукти?

Уведомете Вашия лекар в случай, че приемате лекарства, които забавят перисталтиката на стомаха и червата, тъй като тези средства могат да засилят ефекта на Имомед.

Ако сте приели повече от необходимата доза Имомед

Ако сте приели голямо количество Имомед се обърнете към Вашия лекар, особено, ако имате някой от следните симптоми: скованост на мускулите, некоординирани движения, сънливост, затруднено уриниране или отслабено дишане.

Реакцията на децата към високи дози Имомед е изразена в по- силна степен в сравнение с възрастните. Ако детето е приело по-голямо количество или проявява някой от посочените симптоми, незабавно се обърнете към Вашия лекар.

Ако е наложително се провежда стомашна промивка.

Като противоотрова може да се приложи опиоидния антагонист налоксон под контрол от лекар.

Възможни нежелани реакции

ИМОМЕД се понася добре и появата на нежелани реакции е малко вероятна, ако продуктът се приема според указанията.

Стомашно-чревни нарушения:

гадене, коремни спазми, сухота в устата, запек, метеоризъм, диспепсия.

Много редко: чревна непроходимост и съпътстващо разширяване на дебелото черво като усложнение на хронично възпалително заболяване на червата (токсичен мегаколон).

Нарушения на нервната система: главоболие, умора, замайване.

Нарушение на имунната система: реакции на свръхчувствителност като кожни обриви, ангионевротичен оток, анафилактичен шок.

Нарушения на кожата и подкожната тъкан:

Много рядко: булоzни обриви, включително синдром на Стивън-Джонсън, мултиформена еритема и токсична епидермална некролиза

Ако забележите нежелани реакции, които не са отбелязани в тази листовка, моля информирайте Вашия лекуваш лекар. Той ще реши какви мерки трябва да бъдат предприети.

Как да се съхранява Имомед?

Съхранява се при температура под 25°C

Да се съхранява на места недостъпни за деца!



Срок на годност

Три години.

Не употребявайте това лекарство след изтичане срока на годност обозначен върху опаковката.

Данни за опаковката

Един блистер по 10 таблетки

Допълнителна информация

За допълнителна информация относно този продукт, моля свържете се с локалния представител на притежателя за разрешението за употреба:

Ралица Савова Тишкова

Пл. "Папа Йоан Павел II" № 1

Тел. 96 00 353

E-mail rtishkova@medica.bg

Дата на последна редакция на текста

Месец ноември 2007 г.

