

ИЗПОЛНИТЕЛ
Листовка Приложение
Към РУ №: X-1649 / 28.02.08
Одобрено: 71 30.10.2007

Листовка: информация за потребителя

Cromogom Adipharm 2 % eye drops, solution
Кромором Адифарм 2 % капки за очи, разтвор
Натриев кромогликат (*sodium cromoglicate*)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите както Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт

В тази листовка:

1. Какво представлява Cromogom Adipharm и за какво се използва
2. Преди да използвате Cromogom Adipharm
3. Как се прилага Cromogom Adipharm
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхранение на Cromogom Adipharm
6. Допълнителна информация

Какво съдържа Cromogom Adipharm?

Cromogom Adipharm е лекарствен продукт, капки за очи в 10 ml бутилка, с капкомер и капачка на винт, запечатана с предпазен пръстен.

Състав

Лекарствено вещество: Един ml от разтвора съдържа 20 mg натриев кромогликат (*sodium cromoglicate*).



Помощни вещества: динатриев фосфат додекахидрат, натриев дихидрогенфосфат монохидрат, динатриев едетат, бензалкониев хлорид, натриев хлорид, полисорбат 80 и пречистена вода.

1. Какво представлява Cromogom Adipharm и за какво се използва?

Cromogom Adipharm се използва за симптоматично лечение на остри и хронични алергични състояния, засягащи очите, включително алергии предизвикани от използването на контактни лещи.

2. Преди да използвате Cromogom Adipharm

Не използвайте Cromogom Adipharm, ако сте алергични (свръхчувствителни) към натриев кромогликат или към някоя от останалите съставки на Cromogom Adipharm.

Обърнете специално внимание при употребата на Cromogom Adipharm

Използването на този продукт може да не е подходящо за някои пациенти.

Вие трябва внимателно да избягвате контакта между откапващия наконечник на бутилката и окото, носа, ръцете или други повърхности.

При неправилна употреба или съхранение, разтворът може да бъде замърсен с бактерии, причиняващи очни инфекции. Използването на замърсени разтвори може да доведе до сериозни увреждания на очите и последваща частична загуба на зрението.

В случай, че по време на лечението претърпите очна травма, хирургична интервенция или имате очна инфекция, потърсете незабавно консултация с лекар относно по-нататъшната употреба на това лекарство.

Ако използване и други очни капки, трябва да спазвате интервал от най-малко 15 минути между отделните приложения.

Разтворът е предназначен за локално приложение в очите. Той не трябва да се инжектира в субконюнктивалното пространство или в предната камера на окото.

Трябва да потърсите консултация с лекар, ако симптомите продължават или не се получи подобрение до 72 часа след началото на лечението.

Ако сте лекуван с кортикостероиди преди използването на Cromogom Adipharm и дозата им е била променена, Вашият лекар следва да назначи отново предишната доза кортикостероиди, преди преустановяване прилагането на този продукт.

Прием на други лекарства



Моля, информирайте Вашия лекар ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Вашият лекар има подробна информация относно възможните взаимодействия на този лекарствен продукт с останалите лекарства, както и дали е уместно едновременното им приложение.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Ако сте бременна или планирате бременност, както и ако кърмите обсъдете това с Вашия лекар и той ще прецени дали трябва да приемате този лекарствен продукт.

Шофиране и работа с машини

Подобно на всички капки за очи, приложението на Cromogom Adipharm може да доведе до временно замъгляване на зрението. Ето защо, Вие не трябва да шофирате или работите с машини до отминаването на тези проблеми.

Важна информация относно някои от съставките на Cromogom Adipharm

Консервантът в Cromogom Adipharm (бензалкониев хлорид) може да се абсорбира от меките контактни лещи. Може да поставите меките контактни лещи обратно в очите най-малко 15 минути след прилагането на Cromogom Adipharm

3. Как се прилага Cromogom Adipharm

Винаги прилагайте Cromogom Adipharm точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Обичайната доза е:

Четири пъти дневно по една капка от разтвора се поставя в конюнктивалния сак. Дневната доза може да се увеличи до шесткратно приложение. Дори след подобряване на симптомите, лечението трябва да продължи до отстраняване или изчезване на алергенните фактори.

Вашият лекар ще проследява редовно ефекта от лечението. След стабилизиране на състоянието Ви, Вашият лекар ще направи опит за намаляване на дозата.

В случай на едновременно използване на друг разтвор, представляващ капки за очи, между отделните приложения трябва да се спазва 15-минутен интервал.



Не се препоръчва употребата на Cromorom Adipharm при деца под 4 годишна възраст, поради липсата на достатъчно данни за безопасността и/или ефикасността на продукта. Ако подозирате, че Cromorom Adipharm предизвиква алергична реакция (сърбеж, зачервяване, астматичен пристъп), прекратете приложението му и се свържете с Вашия лекар, колкото се може по-бързо.

Как да прилагате Cromorom Adipharm

Може би ще Ви бъде по-лесно да си поставите капки в окото, докато седите или лежите. Ако носите контактни лещи, отстранете ги преди да поставите капки в окото си.

1. Измийте добре ръцете си със сапун и вода.
2. Не пипайте вътрешната страна на капачката. Така тя ще се запази чиста и предпази капките за очи от микроби.
3. Дръжте бутилката с дъното нагоре в едната ръка, като поставите палеца и пръста си върху зоната "Натисни с пръст".
4. С другата ръка внимателно изтеглете надолу долния клепач, за да се образува "джоб".
5. Наклонете главата си назад и гледайте нагоре.
6. Поставете близо до долния си клепач върха на бутилката. Не докосвайте с него окото си.
7. Притискайки леко бутилката, капнете една капка в джоба, образуван между окото и клепача.
8. Затворете окото си и го задръжте затворено. Не премигвайте и не го търкайте.
9. Докато окото Ви е все още затворено, поставете показалеца си срещу вътрешния му ъгъл и натискайте към носа си в продължение на около две минути. Това ще спре изтичането на лекарството през слъзния канал към носа и гърлото, откъдето то може да се резорбира и да попадне в други части на тялото Ви. Попитайте лекаря си за други специфични указания при тази техника.
10. Поставете капачката, като я затворите плътно без да я затягате.
11. Измийте си отново ръцете със сапун и вода, за да премахнете всякакъв остатък.

Изчакайте най-малко 15 мин преди да поставите отново контактните си лещи.

Внимавайте да не докоснете с откапващото устройство окото, клепача или нещо друго, за да избегнете замърсяването на капките за очи.

Замърсяването на капките за очи може да предизвика инфекция на очите.



Може да изпитвате леко парещо усещане в окото кратко време след прилагане на капките за очи. Ако това продължава или ако е много неприятно, свържете се с Вашия лекар или фармацевт.

Колко дълго да използвате Cromogol Adipharm

Лечението трябва да продължи до изчезване на алергичните фактори, дори след подобряване на симптомите. Лечебният ефект трябва да бъде контролиран редовно. След стабилизиране на клиничния ефект, трябва да се опита намаляване на дозата. Препоръчва се лечението да продължи до пълното изчезване на всички симптоми.

Ако сте пропуснали да приложите Cromogol Adipharm

Ако почти е настъпило времето за прилагане на следващата доза, пропуснете забравената доза и приложете следващата в определеното време. В останалите случаи, използвайте капките веднага щом се сетите, а после отново ги прилагайте, така както би трябвало.

Ако не сте сигурен дали трябва да пропуснете доза, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Не използвайте двойна доза, за да компенсирате дозата, която сте пропуснали.

Ако имате проблеми да запомните часовете за прилагане на капките за очи, попитайте Вашия фармацевт за някакви начини за подсещане.

Ако сте приложили повече от необходимата доза Cromogol Adipharm

Ако смятате, че Вие или някой друг е погълнал част или цялото съдържание на опаковката Cromogol Adipharm, или че сте приложили твърде много капки, веднага телефонирайте на Вашия лекар или отидете до спешното отделение на най-близката болница. Направете това, дори да няма признаци на дискомфорт или предозиране.

4. Възможни нежелани реакции

Обикновено продуктът се понася добре.

Рядко се съобщава за усещания на парене или чуждо тяло, замъгляване на зрението, хемоза, зачервяване на конюнктивата, сухота в очите или повишено сълзотечение, сърбеж.

Съобщават се също така и редки случаи на свръхчувствителност (алергия)



Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. Съхранение на Cromogon Adipharm

Да се съхранява в оригиналната опаковка, при температура под 25°C.

Да не се използва повече от 28 дни след първоначалното отваряне на бутилката.

Да не се използва след изтичане на срока на годност, обозначен на опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

6. Допълнителна информация

Притежател на разрешението за употреба и производител

Адифарм ЕАД

1700, София

бул. "Симеоновско шосе" № 130

Дата на последна актуализация

Септември, 2007

