

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 12.04.05.

Информация за пациента. Моля прочетете внимателно!

Fucidin®
(Sodium fusidate)
2% ointment

Фусидин®
2% маз

За приложение върху кожата

Състав

Всеки грам от лекарството съдържа: Натриев фусидат 20 mg в в неутрална основа за маз.

Помощни вещества: ланолин, цетилов алкохол, течен парафин, бял мек парафин.

Притежател на разрешението за употреба

LEO Pharmaceutical Products Ltd A/S (LEO Pharma A/S)
Ballerup - Denmark

Действие

Fucidin е антибиотик получен от *Fusidium coccineum*, притежаващ силна антибактериална активност срещу редица Грам-положителни микроорганизми. Стафилококите, включително щамове резистентни към пеницилини или други антибиотици, са особено чувствителни към **Fucidin**. Терапевтичната ефективност на локално приложения **Fucidin** се дължи частично на изразената антибактериална активност на продукта срещу микроорганизмите причиняващи кожните инфекции, и отчасти на изключителната способност на този антибиотик да прониква през неувредената кожа.

Показания

Fucidin е показан за лечение на инфекции на кожата причинени от микроорганизми чувствителни на натриев фусидат.

Противопоказания

Установена свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта.

Специални предпазни мерки при употреба

Повишено внимание се налага когато **Fucidin** маз се прилага в областта на окото, тъй като продуктът може да предизвика дразнене, ако попадне в окото. Продължителната употреба може да доведе до селекция на резистентни микроорганизми.

Лекарствени и други форми на взаимодействие

Няма данни

Бременност и кърмене

Необходимо е повишено внимание, когато се прилага на бременни. Ако се прилага върху зърното на гърдата, продуктът трябва да се измие преди кърмене и да не се нанася непосредствено преди кърмене.

Влияние върху способността за шофиране и работа с машини

Fucidin приложен локално не повлиява или незначително повлиява способността за шофиране и работа с машини.



Дозировка и приложение

Възрастни и деца

Дозировката и продължителността на лечението се определят от лекар.

Fucidin се прилага върху засегнатия участък 2-3 пъти дневно в продължение на 7 дни. Той може да се използва със или без оклузивна превръзка.

Предозиране

Малко вероятно е да се наблюдава предозиране

Нежелани реакции

Fucidin е изключително добре поносим. Най-често наблюдаваните нежелани реакции са различни кожни реакции и по-специално реакции в мястото на приложение. Наблюдавани са и алергични реакции

Съхранение

Да се съхранява при температура под 25°C.

Срок на годност

Да не се използва след изтичане срока на годност, обозначен на опаковката.

Опаковка

Туби по 15 g

ТОВА Е ЛЕКАРСТВО - ОТПУСКА СЕ САМО ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ

- Лекарството е продукт различен от другите продукти.
- Лекарството е продукт, който влияе на Вашето здраве и употребата му несъобразена с указанията за това е опасна за Вас.
- Следвайте стриктно лекарското предписание, начина на употреба и указанията на фармацевта, който Ви е отпуснал лекарството. Лекарят и фармацевтът са експерти по лекарствата, техните ползи и рискове.
- Не прекъсвайте сами указания Ви курс на лечение.
- Не повтаряйте лечението със същия продукт и не увеличавайте дозите без да се посъветвате с Вашия лекар.

Пазете лекарството на места, недостъпни за деца

Дата на последна редакция на текста
01/2005

