

## ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

**Дипросалик 0,5 mg/g + 20 mg/g дермален разтвор**  
бетаметазон/салицилова киселина  
**Diprosalic 0,5 mg/g + 20 mg/g cutaneous solution**  
betamethasone/salicylic acid

**Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да прилагате това лекарство.**

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

### В тази листовка:

1. Какво представлява Дипросалик и за какво се използва
2. Преди да използвате Дипросалик
3. Как да приемате използвате Дипросалик
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Дипросалик
6. Допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към РУ №:	18.04.08
N=2/24-03-2008	
Одобрено:	

### 1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДИПРОСАЛИК И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Дипросалик дермален разтвор съдържа две активни съставки: бетаметазон (под формата на дипропионат) и салицилова киселина. Бетаметазонът е локален кортикостероид и спада към групата на мощните кортикоステроиди. Този вид лекарства се прилагат върху кожата, за да намалят червенината и сърбежа, причинени от различни кожни заболявания. Салициловата киселина омекотява сухите люспести образувания по кожата, причинени от кожното заболяване и така позволява на бетаметазона да достигне подлежащата болна кожа и да спомогне за нейното излекуване.

Дипросалик дермален разтвор се използва при възрастни и деца за облекчаване на възпаление, сухота, сърбеж и дискомфорт, които могат да настъпят при псориазис, себорея, екзема, дерматит и други заболявания на скалпа и кожата, които се повлияват от лечение с кортикостероиди.

### 2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ДИПРОСАЛИК

#### Не използвайте Дипросалик дермален разтвор

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към бетаметазон, салицилова киселина или към някоя от останалите съставки на Дипросалик.
- при други кожни заболявания, защото състоянието може да се влоши, особено при случаи на розацея (заболяване на кожата, което засяга лицето), акне, периорален дерматит (възпаление на кожата около устата), сърбежи в областта на гениталиите, обриви под бебешки пелени, херпеси, варицела, и други вирусни кожни заболявания.

#### Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, трябва да информирате Вашия лекар, преди да започнете да прилагате Дипросалик дермален разтвор.

### 3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ДИПРОСАЛИК



Винаги използвайте Дипросалик точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Обичайната доза при деца и възрастни е няколко капки Дипросалик дермален разтвор, които два пъти дневно (сутрин и вечер) се втриват леко в засегнатите участъци от кожата на главата до пълно попиване на лекарството.

Не използвайте за никакви други болести на скалпа и кожата.

Не използвайте върху големи участъци от тялото, тъй като това може да увеличи абсорбираното количество.

При деца не прилагайте за период, по-дълъг от 5 дни.

Не използвайте големи количества от дермалния разтвор за продължителен период от време (например всеки ден в продължение на седмици или месеци).

Избягвайте контакт с очите.

#### **Ако сте използвали повече от необходимата доза Дипросалик**

Ако Вие (или някой друг) погълнете от дермалния разтвор, това не би трябвало да предизвика проблем. Все пак, ако сте разтревожени, посъветвайте се с Вашия лекар. Ако използвате дермалния разтвор по-често, отколкото трябва, това може да окажа влияние върху някои хормони; при деца може да повлияе растежа и развитието им. Съобщете на Вашия лекар, ако не сте използвали дермалния разтвор както Ви е бил предписан или сте го използвали прекалено често и/или продължително време.

#### **Ако сте пропуснали да използвате Дипросалик**

Ако забравите да приложите дермалния разтвор, направете го веднага щом се сетите и продължете с обичайната схема на приложение.

Ако имате никакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

### **4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ**

Както всички лекарства, Дипросалик може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

При повечето хора, когато се прилага правилно, Дипросалик не предизвиква никакви проблеми. Все пак, ако използвате дермалния разтвор по-често, отколкото е необходимо, това може да доведе до изтъняване на кожата и да забележите по нея червени петна. Това може да се случи по-лесно при бебета и деца. Освен това, дермалният разтвор може да причини друго кожно заболяване, наречено дерматит – състояние, провокирано от реакцията на кожата към външни агенти, напр. препарати за миене, които предизвикват зачерявания на кожата и сърбези. Ако тези или други нежелани реакции Ви тревожат, информирайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

### **5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ДИПРОСАЛИК**

Съхранявайте под 25°C.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Дипросалик след срока на годност, отбелзан върху картонената опаковка и бутилката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. Срок на годност след първо отваряне на опаковката: 6 седмици.



## **6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

### **Какво съдържа Дипросалик**

- Активните вещества са: бетаметазон 0,5 mg/g (под формата на дипропионат 0,64 mg/g) и салицилова киселина 20 mg/g.
- Другите съставки са: динатриев едетат, хидроксипропил метилцелулоза, натриев хидроксид, изопропилов алкохол и пречистена вода.

### **Как изглежда Дипросалик и какво съдържа опаковката**

Дипросалик дермален разтвор е безцветен, леко гъст разтвор. Доставя се в бутилки от 30 ml.

### **Притежател на разрешението за употреба и производител**

Притежател на разрешението за употреба

Schering-Plough Europe, 73 Rue de Stalle, B-1180 Brussels, Белгия

Производител

Schering-Plough Hérouville Saint-Claire, Франция

**Дата на последно одобрение на листовката:**

