

Уважаеми пациенти,

Преди да започнете да взимате това лекарство, моля прочетете внимателно тази листовка за пациента.

- Пазете тази листовка. Може да се наложи да я прочете отново.
- Ако имате въпроси или не можете да разберете нещо, питайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предназначено за Вас и не трябва да го давате на други. То може да е вредно за тях, дори и да имат симптоми като Вашите.

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

OXACID 200 CAPSULES
ОКСАЦИД 200 КАПСУЛИ

OXACID 400 CAPSULES
ОКСАЦИД 400 КАПСУЛИ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	11-1665-
Към РУ №	11-1666 07 04 08
Одобрено	13/26.02.08

Лекарственото вещество е офлоксацин.

Помощни вещества са царевично нишесте, лактоза, магнезиев стеарат.

ОКСАЦИД 200 капсули са тъмно зелени и съдържат бял до жълтеникав прах.

ОКСАЦИД 400 капсули са сино-бели и съдържат бял до жълтеникав прах.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ОКСАЦИД И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

ОКСАЦИД принадлежи към групата от лекарства, наречени синтетичени 4-флуорохинолони, които са антибактериални продукти с бактерицидно действие срещу широк спектър от микроорганизми.

Показан е за лечение на следните инфекции: На горните и долните пикочни пътища (инфекции на бъбреците и пикочния мехур), на долните дихателни пътища (бял дроб и гръдни инфекции), трипер, засягащ уретрата и шийката на матката, протичащ без усложнения, не-гонгококова инфекция на уретрата и шийката на матката, инфекции на кожата и меките тъкани.

Попитайте Вашия лекар, защо трябва да приемате това лекарство.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ПРЕДИ ДА ВЗЕМЕТЕ ОКСАЦИД

Не приемайте ОКСАЦИД при

- свръхчувствителност (алергия) към офлоксацин или към някоя от помощните съставки или към 4-хиноловите антибактериални продукти
- ако сте бременни или кърмите
- ако сте под 18 години
- ако често се излагате на силна слънчева светлина
- ако страдате от диабет, припадъци или епилепсия, душевно или психическо заболяване, порфирия или недостиг на глюкозо-6-фосфат или предишно възпаление на сухожилията

Бъдете внимателни при употребата на ОКСАЦИД

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Продуктът може да причини възпаление на сухожилие или разкъсване на сухожилията.
- Уведомете Вашия лекар, ако ще правите медицински изследвания, тъй като Оксацид може да влияе върху резултатите.
- Не трябва да се излагате без нужда на слънчева светлина и избягвайте ултравиолетови лъчи (УВ лампи, солариуми).
- Продължителната употреба на антибиотици може да доведе до разрастване и размножаване на резистентни микроорганизми.

Прием на ОКСАЦИД с храна и напитки

Поглъщайте капсулите с чаша вода. Вие може да взимате лекарството с или без ядене.

Препоръчва се да не консумирате никакъв алкохол по време на лечението с ОКСАЦИД, защото алкохолът може да влоши възможните нежелателни странични реакции.

Бременност и кърмене

Да не се приема по време на бременност и кърмене!

Шофиране или работа с машини

Ако се чувствате сънлив или замаян, или имате проблеми със зрението след прием на това лекарство, не шофирайте и не работете с опасни машини.

Прилагане на други лекарства

Уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако приемате други лекарства, дори и такива, които се отпускат без рецепта.

Особено е важно да уведомите Вашия доктор, ако приемате някои от следните:

- антиациди (лекарства за неразположение в стомаха)
- сукралфати или желязо-съдържащи лекарства
- антикоагуланти (предотвратяват кръвосъсирването)
- антибиотици (предотвратяват инфекции)
- лекарства за контрол на кръвната захар
- лекарства за ревматизъм и ставни болки
- нестероидни притивовъзпалителни лекарства
- пробенецид, циметидин, фруземид, метотрексат

КАК ДА ПРИЕМАТЕ ОКСАЦИД

Приемайте ОКСАЦИД стриктно съгласно лекарските указания. Ако се съмнявате за нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Важно е да приключите курса от капсули, дори и да се почувствате по-добре преди да сте ги свършили всичките. Ако спрете капсулите прекалено рано, състоянието Ви може да се влоши.

Повечето възрастни се нуждаят от доза между 200 и 800 mg дневно. До 400 mg могат да се приемат като единична доза, обаче по-големите дози трябва се приемат на две отделни дози.

Инфекции на долните пикочни пътища (напр. цистит): 200 - 400 mg 2 пъти дневно

Инфекции на горните пикочни пътища (напр. бъбречни инфекции) : 200 – 400 mg 2 пъти дневно

Инфекции на долните дихателни пътища (напр. бронхити) : 400 mg 2 пъти дневно

Неkomplицирана уретрална и церивикална гонорея (напр. полово предавани заболявания) : единична доза от 400 mg

Негонгококов уретрит и цервицит (напр. полово предавани заболявания) : 600 mg дневно в единична доза или разпределена на две

Инфекции на кожа и меки тъкани: 400 mg два пъти дневно

Нарушена бъбречна функция: Следвайки нормална начална доза, следващата доза трябва да се понижава при пациенти с нарушена бъбречна функция. Препоръчва се доза от 100 mg до 200 mg, на всеки 24 часа.

Нарушена функция на черния дроб: При нарушена функция на черния дроб, отделянето от организма на ОКСАЦИД намалява.

Деца: ОКСАЦИД не се прилага при деца и юноши.

Пациенти в старческа възраст: При по-възрастните пациенти не се налагат промени в дозировката, освен в случаите при проблеми с бъбречната и чернодробна функция.

Продължителност на лечението: Зависи от тежестта на инфекцията и клиничния отговор. Обичайният период на лечение е 5–10 дни, освен при неkomplицирана гонорея, където се препоръчва единична доза. Лечението не трябва да продължава повече от два месеца.

Ако имате впечатление, че действието на ОКСАЦИД е или много силно или много слабо, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте приели по-голяма доза ОКСАЦИД

Ако сте приели по погрешка по-голяма доза ОКСАЦИД, веднага се свържете с Вашия лекар или най-близката болница. По-висока доза може да предизвика нежелани странични реакции.

Ако сте забравили да вземете ОКСАЦИД

Ако сте забравили да приемете една доза, вземете я веднага щом си спомните. Ако приближава време за следващия прием, пропуснете забравената доза и продължете както преди.

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате забравената.

ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Подобно на всички лекарства Оксацид може да предизвика нежелани реакции.

Всяко лекарство може да има нежелани реакции.

Ако страдате от някои от следните симптоми, прекратете приема на капсулите и отидете веднага на лекар или в бърза помощ:

- обрив или кожен сърбеж
- затруднено дишане
- висока температура

- оток на лицето, езика или гърлото
- ускоряване на сърдечния пулс
- болки в областта на Ахилесовото сухожилие

Уведомете Вашия лекар, ако страдате от някои от следните симптоми и го попитайте, дали трябва да продължите да взимате капсулите.

- диария с кръв
- пожълтяване на кожата (жълтеница) дължащо се на нарушена чернодробна функция
- свръхчувствителност на някои части на тялото
- неволеви движения

Други нежелани реакции на ОКСАЦИД капсули може да включват нарушен сън, главоболие, замаяност, безпокойство, стомашна болка, гадене или диария. Уведомете Вашия лекар, ако са тежки или продължават много време.

Ако се чувствате болен след приема на капсулите или имате някакви необичайни, или неочаквани симптоми, уведомете Вашия лекар за тях.

Уведомете Вашия лекар, ако не се чувствате по-добре след приключване на курса на лечение с капсулите.

Ако някоя от горе споменатите реакции стане прекалено интензивна, консултирайте се с Вашия лекар, колкото е възможно по-скоро.

СЪХРАНЕНИЕ НА ОКСАЦИД

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

При температура под 25°C.

Съхранявайте в оригиналната опаковка.

Да се предпазва от светлина и влага.

Да не се използва след срока на годност, посочен върху опаковката.

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Ако имате допълнителни въпроси, моля обърнете се към притежателя на разрешението за употреба или дистрибутора на лекарствения продукт.

Притежателя на разрешението за употреба
Ozone Laboratories B.V.,
 Martinus Nijhofflaan 2, 2624 ES Delft,
 Холандия

Производител:

Aegis Ltd.

P.O. Box 28629, 2081 Nicosia,
 Кипър (Europe)

Януари, 2008