

Ф

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВОТА
Листовка - Приложение 2
Към РУ №. 11-1763 / 20 03. 08г.
Одобрено 12 / 12.02.08

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Какво представлява *Saridon* и за какво се използва?

Saridon е болкоуспокояващ лекарствен продукт. Той облекчава болка и понижава повишената температура. Използва се за лечение на главоболие, зъбобол, менструално неразположение (болки при месечен цикъл), ревматични болки, болки след оперативна намеса и повишена температура вследствие на настинка или грип.

Кога не трябва да използвате *Saridon*?

Не използвайте *Saridon* ако сте свръхчувствителни към пропифеназон, други пирозолонови вещества или парацетамол (ацетаминофен).

Не използвайте *Saridon* ако имате сериозно чернодробно или бъбречно заболяване или наследствена анемия (хемолитична анемия).

Saridon не трябва да се дава на деца под 12 годишна възраст.

Кога трябва да обърнете специално внимание при употреба на *Saridon*?

Не приемайте дози *Saridon* по-високи от посочените в тази листовка. Както при всички болкоуспокояващи лекарства, не бива да приемате *Saridon* за дълъг период от време, освен под лекарско наблюдение.

Трябва да имате предвид, че при продължителния прием на болкоуспокояващи за лечение на главоболие, главоболието може да стане хронично.

Приемът на *Saridon* или други аналгетици съдържащи парацетамол (ацетаминофен) за дълъг период от време може да причини бъбречно увреждане или дори бъбречна недостатъчност.

Ако имате температура или болки, продължаващи повече от една седмица, трябва да се консултирате с лекар.

Ако страдате от астма, хронични настинки или хронични обриви, или сте свръхчувствителни към други болкоуспокояващи или антиревматични лекарствени продукти, трябва да употребявате *Saridon* само след консултация с лекар. Има съобщения за дихателни и циркулаторни проблеми при лица, приемащи лекарства, съдържащи парацетамол (ацетаминофен) или пропифеназон, особено при чувствителни пациенти.

Не употребявайте болкоуспокояващи като *Saridon* заедно с алкохол или ако страдате от разстройства, свързани с консумацията на алкохол.

Уведомете лекаря или фармацевта си, ако страдате от други заболявания или алергии, или ако приемате други лекарства (включително такива без лекарско предписание)



Може ли *Saridon* да се употребява по време на бременност или кърмене

Не употребявайте *Saridon* ако сте бременна или кърмите, освен с изразеното съгласие на Вашия лекар.

Как да приемате *Saridon*

Единичната доза за възрастни е 1-2 таблетки; за юноши на възраст между 12-16 години тя е 1 таблетка. При нужда можете да приемате до три единични дози в рамките на 24 часа.

Приемайте таблетките с обилно количество вода или други течности. Придържайте се към дозировката описана в тази листовка или дозировката, определена от Вашия лекар. Ако смятате, че ефектът на лекарството е прекалено слаб или прекалено силен, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Възможни нежелани реакции при употреба на *Saridon*

Наблюдавани са редки алерични реакции (кожни обриви, уртикария) при хора, използващи *Saridon*.

Много рядко могат да се появят дихателни проблеми или реакции на системата на кръвообращение, особено при чувствителни лица (виж предпазни мерки по-горе). Ако забележите подобни реакции, прекратете приема на *Saridon* и посетете лекар възможно най-скоро.

Допълнителна информация

Съхранявайте на място недостъпно за деца. Не използвайте след изтичане срока на годност, отбелязан върху опаковката.

Допълнителна информация можете да получите от Вашия лекар или фармацевт, които разполагат с подробна информация за продукта.

Какво съдържа *Saridon*

Активните съставки във всяка таблетка са 250 mg парацетамол, 150 mg пропифеназон и 50 mg кофеин.

Къде можете да намерите *Saridon*

В аптеките и дрогерии без лекарско предписание.

Налични опаковки

Опаковки с по 10 таблетки.



Производител

Bayer Sante Familiale

33, rue de l'industrie, 74240 Gaillard

Франция

