

ИЗПЪЛНИТЕЛНА Агенция по лекарствата	
Листовка - Приложение 2	1
Към РУ №:	11-1664, 04.03.08
Одобрено:	12/12.02.08

Panadol\* Rapide Tablets  
Листовка за пациента

**PANADOL\* RAPIDE 500mg film-coated tablets (Paracetamol)**  
**ПАНАДОЛ\* РАПИД 500mg филмирани таблетки (Парацетамол)**

**Какво трябва да знаете за ПАНАДОЛ Рапид?**

Моля, прочетете внимателно тази листовка преди да започнете да приемате този продукт, особено частта, озаглавена "Проверете преди да приемете това лекарство". Ако имате някакви въпроси или не сте сигурни за нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Запазете листовката, може да поискате да я прочетете отново.

**Какво има в опаковката?**

Panadol Rapide.

Опаковката съдържа 10, 14 или 20 таблетки.

**Какво съдържа ПАНАДОЛ Рапид?**

Всяка таблетка съдържа paracetamol 500 mg

Таблетката съдържа също така натриев бикарбонат, разтворимо нишесте, повидон, царевично нишесте, калиев сорбат (E202), микрокристална целулоза, магнезиев стеарат, восък карнауба, титаниев диоксид (E171), полидекстроза, хидроксипропил метилцелулоза, глицерол триацетат и полиетилен гликол.

**Кой произвежда ПАНАДОЛ Рапид?**

Притежател на разрешението за употреба е:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

GlaxoSmithKline Export Ltd.

Brentford, TW8 9GS, Великобритания

Производител е:

GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd,

Knockbrack, Dungarvan, Co. Waterford, Ирландия

**Как действа ПАНАДОЛ Рапид?**

Панадол Рапид съдържа парациетамол – аналгетик (болкоуспокояващо) и антипиретик (понижава температурата). Таблетките са специално разработени, така че парациетамол се абсорбира в кръвта най-малко два пъти по-бързо от стандартните таблетки парациетамол.

**За какво е показан ПАНАДОЛ Рапид?**

Панадол Рапид таблетки е показан за облекчаване на болката при главоболие, включително и мигrena, зъбобол, невралгия, ишиас, ревматични и мускулни болки и менструални болки.

Също така, Панадол Рапид облекчава неразположението при възпалено гърло и висока температура и при болки при простудни заболявания и грип.

**Проверете преди да приемете това лекарство, ВАЖНО!**

**Запомнете: ПАНАДОЛ Рапид съдържа парациетамол.**


**Не приемайте други лекарства, съдържащи парациетамол.**

Не взимайте Панадол Рапид, ако сте алергични към парациетамол или някоя от другите съставки, посочени по-горе. Всяка таблетка съдържа 173 mg натрий.

Не приемайте таблетките, ако сте на ниско солева диета.

**Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди да вземете ПАНАДОЛ Рапид, ако:**

- имате тежко бъбречно или чернодробно заболяване;



- взимате метоклопрамид, домперидон (използван за повлияване на гадене и повръщане) или холестириамин, прилаган за понижаване нивото на холестерин;
- взимате антикоагуланти – лекарства, използвани за разреждане на кръвта;
- трябва да взимате обезболяващо средство всеки ден за продължителен период. Въпреки това, може да приемате епизодично единични дози парацетамол за кратък период от време;
- сте бременна или кърмите;
- очаквате високите дози натриев бикарбонат да предизвикат гастро-интестинални смущения, включително оригване и гадене. Високи дози натрий могат да доведат до хипернатриемия и това състояние трябва да бъде следено.

**Как трябва да приемате ПАНАДОЛ Рапид?**

**Възрастни, включително и тези над 60 години, и деца на и над 12 години:**

Една до две таблетки до четири пъти на ден при необходимост.

Дозата да не се взима на интервали, по-кратки от 4 часа.

**Възрастни:** Да не се взимат повече от 8 таблетки за 24 часа.

**Деца на и над 12 г.:** Да не се взимат повече от 6 таблетки за 24 часа.

**Деца под 12 години:** Не се препоръчва при деца под 12 години.

Да не се надвишава препоръчаната доза.

Ако температурата се запази в продължение на 3 дни, а болката повече от 5 дни, консултирайте се с Вашия лекар.

Да не се приема с други лекарства, съдържащи парацетамол.

**Какво трябва да направите, ако приемете прекалено много?**

Ако вземете повече от препоръчаната доза, независимо потърсете лекарска помощ, дори и да се чувствате добре. Предозирането с парацетамол може да причини увреждане на черния дроб.

**Какви нежелани реакции биха могли да се наблюдават при ПАНАДОЛ Рапид?**

Нежеланите реакции при парацетамол са редки. Може да се наблюдават алергични реакции, напр. кожен обрив и чернодробни нарушения. Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, ако наблюдавате някакви неочеквани реакции.

**Как да съхранявате ПАНАДОЛ Рапид?**

Да се съхранява при температура под 25°C.

Не използвайте след датата, посочена на опаковката.

**Запомнете: Съхранявайте всички лекарства на места, недостъпни за деца.**

Срок на годност – 3 години.

Без лекарско предписание.

Последна актуализация – януари 2008

GSK logo

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford,  
TW8 9GS, UK

Panadol\* е търговска марка на GlaxoSmithKline group of companies.

