

ИЗДАВАТЕЛСКА АГЕНЦИЯ
ИЗДАТЕЛСТВО "ТРИКОН"
КЪМ РУ № 11-1693 / 10.03.08
Одобрено 9/04.22.07

Информация за пациента

Моля, прочетете внимателно тази листовка, тъй като в нея се съдържа важна за Вас информация. Ако искате да научите повече за този продукт или част от информацията в листовката не Ви е ясна, моля консултирайте се с Вашия лекар.

НАИМЕНОВАНИЕ

UPSAVIT Vitamin C 1 g effervescent tablets
УПСАВИТ Витамин С 1 g ефервесцентни таблетки

СЪСТАВ

Ascorbic acid (Vitamin C) 1 g
Аскорбинова киселина (Витамин С) 1 g

Помощни вещества: натриев хидроген карбонат, безводна лимонена киселина, захароза, захарин натрий, макрогол 6000, натриев бензоат, аромат на портокал, оранжево жълто (E110)

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Ефервесцентни таблетки

ПРОИЗВОДИТЕЛ

Bristol-Myers Squibb
304 avenue du Dr Jean Bru,
47000 Agen, France

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Bristol-Myers Squibb Kft
1054 Budapest
Унгария

ЗА КАКВО СЕ ПРИЛАГА УПСАВИТ ВИТАМИН С

УПСАВИТ Витамин С се прилага при лечение на хипо- и авитаминоза С (скорбут) и в комплексното лечение на състояния с повишени нужди или с недостиг на Витамин С.

СЛУЧАИ, В КОИТО ТОВА ЛЕКАРСТВО НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА

Свръхчувствителност към някоя от съставките.

В случай на оксалатни камъни в бъбреците и глюкозо-изомалтазна недостатъчност.

В случай на колебание се консултирайте с Вашия лекар.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА



- Вследствие на леко стимулиращия ефект на Витамин С, за предпочитане е лекарството да не се приема в края на деня.
- Този лекарствен продукт съдържа 283 g натрий на една таблетка, което трябва да се отчита при пациенти, подложени на строг хипонатриев режим.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИ ЛЕКАРСТВА И ДРУГИ ФОРМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

При болни от диабет Витамин С може да взаимодействува с реактивите, които се използват за изследване на кръвта и урината.

Винаги информирайте лекаря за другите лекарствени продукти, които приемате, дори и тези без рецепта.

Големи дози аскорбинова киселина (над 2 g/ден) намаляват абсорбцията на индиректните коагуланти.

Аскорбиновата киселина намалява съдържанието на Витамин В12.

Чрез големи дози аскорбинова киселина и поради подкиселяване на урината се увеличава екскрецията на оксалати в урината.

Ацетилсалициловата киселина намалява кръвните нива и бионаличността на аскорбиновата киселина.

БРЕМЕННОСТ И КЪРМЕНЕ

Използването на Витамин С трябва да се предписва по време на бременността само при необходимост.

Да се избягва употребата на Витамин С по време на кърмене.

ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ СПОСОБНОСТТА ЗА ШОФИРАНЕ И РАБОТА С МАШИНИ

Не е приложимо.

ПОМОЩНИ ВЕЩЕСТВА, НАЛИЧИЕТО НА КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ИМА ПРЕДВИД ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ ПАЦИЕНТИ

Съдържание на натрий: 283 mg на една таблетка, натриев бензоат.

КАК ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЕМА ТОВА ЛЕКАРСТВО

Това лекарство е предназначено за възрастни.

Дозировка: 1 таблетка дневно.

Таблетката се разтваря в половин чаша с вода.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЛЕЧЕНИЕТО

Поради високата концентрация лечението може да продължи до 10 дни.

НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Това лекарство при някои хора може да доведе до нежелателни реакции като болки в стомаха, диарии, трудности при уриниране или оцветяване на урината в



оранжево. При появяване на някои от тези симптоми е необходимо да уведомите Вашия лекар.

В случаи на диета с намалено съдържание или липса на натрий необходимо е да се отчита, че всяка таблетка **УПСАВИТ Витамин С** съдържа около 283 mg натрий. Това трябва да се има предвид при изчисляване на дневния прием на сол.

ОПАКОВКА

Кутия с 1 туба с 10 ефервесцентни таблетки.

СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява под 25°C.

Съхранявайте тубата плътно затворена, за да се предпази от влага.

Да не се използва след изтичане срока на годност, отбелязан върху опаковката.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

ДАТА НА ПОСЛЕДНА РЕДАКЦИЯ НА ЛИСТОВКАТА

25.02.2005 г.

За информация относно това лекарство, моля да се свържете с местното представителство на притежателя на разрешението за употреба:

Озон Лабораторис България

ул. "Асен Златаров" № 1

1504 София

тел: 0800 12 400

