

Информация за пациентта. Моля, прочетете внимателно !

Febichol®

Фебихол

Състав

Активна съставка: Fenipentol 100 mg в една капсула.

Помощни вещества: глицерол 85%, меден комплекс на хлорофилин (Е 141), метилпарабен, желатин.

Действие

Активното вещество на този препарат е доказан холеретик, изолиран от растителния вид сигсита. Увеличава обема на секретираната жълчка, както и съдържанието на нейните компоненти (холестерол, жълчни киселини), подобрявайки по този начин храносмилането.

Показания

Препарата Фебихол се прилага за лечение на оплакванията, свързани със заболявания на жълчните пътища (хронични холецистопатии с намалено отделяне на жълчка) и хроничен панкреатит.

Противопоказания

Свръхчувствителност към някоя от съставките на препарата, остри хепатити (вирусни, инфекциозни, токсични или медикаментозни), пълна или частична обструкция на жълчните пътища, остри холецистити, остри панкреатити, стеноза на пилора. Този препарат не се препоръчва за употреба при деца под 15-годишна възраст.

Нежелани лекарственни реакции

Фебихол обикновено се понася добре, но в изолирани случаи е възможно да се появят неразположение и тежест в подлъжичната област, гадене, стомашни киселини и обрив. В случай на поява на нежелани лекарствени реакции или други необичайни реакции, трябва да се консултирате с Вашия лекар относно по-нататъшната употреба на препарата.

Лекарствени взаимодействия

Досега не са известни взаимодействия.

Препарата не оказва влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

Дозировка и начин на приложение

Възрастни: по 2 капсули 1 път дневно до 3 пъти дневно, приети непосредствено преди хранене, с достатъчно количество вода (200 ml). Лечението може да се провежда продължително.

Предпазни мерки

Активното вещество на този препарат – фенипентол – има лютив вкус, поради това е обвит с желатинова обвивка. С оглед на това, препарата трябва да се прилага внимателно при пациенти с активна язвена болест на стомаха и дуоденума, и с хиперацидитет при остри и хронични гастрити и гастродуоденити, при които може да предизвика или увеличи обичайните прояви (болки, киселини, гадене, повръщане).

Съдържащият се в препарата глицерол може да причини главоболие, стомашно дразнене и диария.

При пациенти с бъбречни заболявания не се налага намаляване на дневните дози освен при напреднала бъбречна недостатъчност и прояви на елиминационен гастрит.

В случай, че симптомите на заболяването продължават или дори се засилват след продължително приложение, трябва да се обърнете към Вашия лекар относно по-нататъшната употреба на препарата.

Предозиране

Необходимо е да се посъветвате с Вашия лекар в случай на предозиране или инцидентно приемане на препарата от дете.

Лекарствена форма и опаковка

50 капсули по 100 mg.

Съхранение

На сухо място, при температура до 25° С, защитено от светлина.

Срок на годност

3 години.

Внимание

Препаратът да се съхранява на места, недостъпни за деца!

Препаратът не може да се употребява след изтичането на срока на годност, който е отбелязан върху опаковката.

Притежател на разрешението за употреба

Словакофарма АД

Хлоховец

Словашка република

Адрес за контакти

“Словакофарма – България” ООД

ул “Голо бърдо” № 22

София 1407

тел. 9 62 41 91, 9 62 41 40

Последна редакция : март 2001 г.