

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА ...10.03.2005...

Информация за пациента! Моля прочетете внимателно!

Fucicort®
cream

Фусикорт®
крем

Състав

Всеки грам от продукта съдържа:

Fusidic acid 20 mg

Betamethasone valerate 1 mg

Стабилизиран с chlorocresol

Свойства

Fucicort съчетава антибактериално действие на фусидовата киселина с противовъзпалителните и противосърбежни ефекти на бетаметазона.

Показания

Fucicort се прилага за лечение на възпалителни дерматози при наличие или опасност от появата на бактериална инфекция, като напр. атопична екзема и контактен дерматит.

Дозировка

Fucicort се прилага върху засегнатата кожна повърхност 2 пъти дневно.

Противопоказания


Свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта.

Поради съдържанието на кортикоид, *Fucicort* крем не трябва да се използва при първични кожни инфекции, причинени от бактерии, гъбички или вируси (напр. Херпес или варицела).

Fucicort крем не трябва да се използва още при пациенти с язви, атрофични кожни заболявания, периорален дерматит, розацеа и кожни прояви свързани с туберкулоза или сифилис.

Предпазни мерки

Трябва да се избягва продължителното и непрекъснато локално лечение, особено при новородени и деца. Потискане на надбъбречната функция може да се наблюдава дори без използването на оклузивна превръзка. Поради съдържанието на кортикоид използването на *Fucicort*® трябва да се избягва при следните състояния: атрофична кожа, язви на кожата, обикновено акне, чупливост на вените на кожата, перианален и генитален сърбеж. *Fucicort*® крем трябва да се използва внимателно при лечението на големи участъци от тялото, лицето и кожните гънки. Необходимо е повишено внимание при прилагането на локалното кортикоидно средство в близост до очите. При попадане на продукта в окото може да се наблюдава глаукома. В случай на внезапно прекратяване на лечението след продължителна употреба може да се наблюдава ефект на отнемането под формата на зачерявяне и чувство за парене на кожата.



Бременност и кърмене

Изследвания върху експериментални животни и дългогодишният клиничен опит дават основание да се предположи, че фусидовата киселина няма тератогенни ефекти. Локалното приложение на кортикостероиди на бременни животни води до нарушения в развитието на плода въпреки, че връзката на това при хора не е изяснена. **Fucicort** крем не трябва да се използва по време на бременност или кърмене, освен ако това е необходимо.

Нежелани лекарствени реакции

Въпреки че при повечето хора не са наблюдавани проблеми при използването на този крем, подобно на други сходни лечения при някои пациенти може да се наблюдават нежелани реакции.

Не толкова чести нежелани реакции са: дразнене на кожата в мястото на прилагане, чувство за парене или смъдене, сърбеж или зачерьяване на кожата или суха кожа. Обикновено тези реакции са леки по тежест и са преходни. Наблюдавани са още не толкова често влошаване на екзема, уртикария или друг вид алергична реакция.

Както при другите кортикостероиди, макар и рядко, могат да се наблюдават фоликулит, хипертрихоза, периорален дерматит, алергичен контактен дерматит, депигментация и системна активност.

Макар, че това не е наблюдавано при клиничните проучвания с **Fucicort**, то локалното използване на кортикостероиди може да доведе до атрофия, телеангиектазии или стрии на кожата, особено при продължително приложение.

Предозиране

Ако дозата е надвишена или периодът на употреба надвишава препоръчания има риск от:

- кожата в мястото на прилагане да стане по-тънка и малките вени да се виждат, особено ако крема се използва върху кожни гънки или ако лекуваният участък е покрит с пластир/ бинт;
- твърде голямо количество кортикостероид да се резорбира в кръвта и може да се наблюдават системни ефекти; в този случай лицето може да подпухне.

Новородените и децата са повече изложени на тези рискове и особено ако лекуваният участък се покрие с облекло или превръзка.

Срок на годност

Да не се използва след изтичане срока на годност обозначен на опаковката.

Съхранение

Да се съхранява при температура под 25° С.

Опаковка

Туби по 15 g.

ВНИМАНИЕ - ТОВА Е ЛЕКАРСТВО - ОТПУСКА СЕ ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ!

- Лекарството е продукт различен от другите продукти.
- Лекарството е продукт, който влияе на Вашето здраве и употребата му несъобразена с указанията за това е опасна за Вас!

- Следвайте стриктно лекарското предписание, начина на употреба и указанията на фармацевта, който Ви е отпуснал лекарството. Лекарят и фармацевтът са експерти по лекарствата, техните ползи и рискове.
- Не прекъсвайте сами указания Ви курс на лечение.
- Не повтаряйте лечението със същия продукт и не увеличавайте дозите без да се посъветвате с Вашия лекар.

Пазете лекарството на места, недостъпни за деца!

Притежател на разрешението за употреба
LEO Pharmaceutical Products
Ballerup – Denmark

Дата на последна редакция на текста
BG 12/2004

