

Указания за употреба. Моля, прочетете внимателно!



FERRONAT®
(Ferrous fumarate)
oral suspension

ФЕРОНАТ®
Перорална суспензия

Производител и притежател на разрешението за употреба
IVAX Pharmaceuticals s.r.o, Opava - Komarov, Czech Republic.

Състав

Ferrous fumarate 150 g в 5 ml.

Помощни вещества: глицерол моностеарат, полисорбат 80, аскорбил палмитат, аскорбинова киселина, лимонена киселина монохидрат, фумарова киселина, ксантанова гума, динатриев едетат дихидрат, пропил парабен, натриев бензоат, гриота есенция, есенция малина, оцветител E124, захароза и пречистена вода.

Фармакотерапевтична група

Антианемични средства

Действие

Лекарството доставя необходимото желязо в организма, чиито недостиг се проявява с анемия.

Показания

Лекарството се използва за профилактика и лечение на анемия от различен произход: недостиг на желязо, кръвозагуба (изразено кръвотечение), нарушения в резорбцията на желязото или повишена употреба на желязо (бърз растеж по време на детството, бременност и кърмене).

Противопоказания

Феронат не трябва да се използва при сидеробластна анемия и при сидероза (натрупване на желязо в организма).


Нежелани лекарствени реакции

По време на лечението могат да се наблюдават следните по-чести нежелани реакции: стомашно-чревни нарушения, киселини и парене в стомаха, повръщане, диария или запек. Оцветените в черно изпражнения не са проява на увреждане на организма. Алергични реакции.

Острото предозиране на лекарството се проявява със симптоми на дразнене или сериозно увреждане на стомашно-чревния тракт с повръщане на кръв и диария. Ако се получи остро предозиране или ако има съмнение за това пациентът трябва да бъде откаран до болницата, колкото е възможно по-скоро. Ако има опасност от закъснение и пациента е в съзнание и може да съдейства, тогава е необходимо да се предизвика повръщане (чрез дразнене на носоглътката) и може да се приеме яйчен белтък с мляко.

Взаимодействия

Ефектите на Феронат и на други едновременно приети лекарства могат взаимно да се повлияят. Лекарят трябва да бъде информиран за всички лекарства, които вземате в момента или ще вземате с или без лекарско



предписание. Преди да започнете да вземате някакви лекарства заедно с Феронат, информирайте Вашия лекар.

Резорбцията на желязото се намалява от антиацидни средства, фитати, яйца, мляко, кафе, цейлонски чай, етиндронат, пенициламин, миноциклин, доксициклин, демеклоциклин, окситетрациклин, тролеандомицин, еноксацин, офлоксацин, норфлоксацин, левофлоксацин, ломефлоксацин, грепафлоксацин, спарфлоксацин, тровафлоксацин, леводопа, левотироксин, метилдопа. Наличието на храна в стомашно-чревния тракт намалява резорбцията на желязото. Лекарственият продукт не трябва да се използва два часа преди използването на посочените по-горе продукти.

Дозировка и приложение

Дозировката и продължителността на лечението се определя и регулира само от лекар! Обикновено се приема 5-6 mg/kg дневно желязо, което отговаря приблизително на 0,5 ml/kg тегло Феронат суспенсия.

Обичайната дозировката за деца е следната:

| | |
|-----------|----------------------|
| до 2 г.: | 5 ml един път дневно |
| 2 - 6 г.: | 5 ml 2 пъти дневно |
| над 6 г.: | 5 ml 3-4 пъти дневно |

Дозировката за възрастни (само в случай на непоносимост към други продукти, съдържащи желязо):

Дозата обикновено е 10 ml 2 пъти дневно.

Лекарството трябва да се приема преди хранене с вода или плодов чай. Да не се приема с черен чай. Не се препоръчва приемането на мазнини преди използване на лекарството.

Дозата се измерва с помощта на приложената във всяка опаковка мерителна чашка. Преди употреба разклатете шишето със суспенсия и измийте с гореща вода мерителната чашка.

Ефект от лечението (в кръвната картина) се наблюдава след 4 дни от започването му, но е необходимо то да продължи поне 4-5 седмици.

Предпазни мерки

Ако вземате някакви други лекарства, Вие трябва да се посъветвате с Вашия лекар дали е подходящо едновременното приемане на Феронат.

Лекарството трябва да се прилага на деца само по препоръката и под наблюдението на лекуващия лекар.

При предозиране трябва да потърсите незабавно лекарска помощ.

Съхранение

Да се съхранява на тъмно място при температура под 25°C.

Предупреждения

Да не се използва след изтичане срока на годност обозначен на опаковката.

Да се съхранява на места, недостъпни за деца!

Опаковка

100 ml

Дата на последната редакция на текста

10/2005

