

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

**BIFUNAL®
БИФУНАЛ**

1% крем за употреба върху кожата

ИЗДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към РУ №: Н-2133, 27.05.08	
Одобрено: 17/13.05.08	

ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ЛИСТОВКА ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОЗИ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

- *Запазете тази листовка! Може да се имате нужда да я прочетете отново.*
- *Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт!*
- *Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.*
- *Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.*

В ТАЗИ ЛИСТОВКА:

1. Какво представлява Бифунал и за какво се използва
2. Преди да приемете Бифунал
3. Как се прилага Бифунал
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхранение на Бифунал
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА БИФУНАЛ И ЗА КАКВО СЕ ПРИЛАГА

Бифоназол е производно на имидазола с широк спектър на действие спрямо различни видове гъбички, където се включват дерматофити, гъбички, плесени и други видове, като напр. Маласезия фурфур. Той е ефективен също и при Коринебактериум минутисиум.

Бифунал се прилага за лечение на кожни микози, причинени от инфекции с дерматофити, гъбички, плесени и други фунги, в т.ч. Маласезия фурфур и Коринебактериум минутисиум: тинеа педум, тинеа мануум, тинеа корпорис, тинеа ингвиналис, питириазис верзиколор, повърхностни кандидози и еритразма.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ БИФУНАЛ

Не прилагайте Бифунал:

Ако сте алергични (свръхчувствителни) към бифоназол, някоя от другите съставки на лекарствения продукт; ако сте алергични към цетостеарил алкохол.

Обърнете специално внимание при употребата на Бифунал:

Деца

Не са установени вредни ефекти при деца. При бебета бифоназол трябва да се прилага само под медицинско наблюдение.

Предпазни мерки

Няма

Прием на други лекарства

Моля, кажете на лекуващия си лекар или фармацевта си ако взимате или сте взимали скоро други лекарства, включително лекарства, които се отпускат без рецепт!

Няма известни взаимодействия с Бифунал крем.

Бременност

Не са доказани вредни ефекти върху майката и детето при прилагане на бифоназол по време на бременност. Няма клинични данни за безопасност.

Продуктът не трябва да се прилага без лекарска консултация през първите 3 месеца от бременността.

Шофиране и работа с машини

Продуктът не влияе върху способността за шофиране и работа с машини.

3. КАК ДА ПРИЛАГАТЕ БИФУНАЛ

Винаги прилагайте Бифунал точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в някои неща, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Кремът се използва веднъж дневно, за предпочитане вечер преди лягане.

За постигане на продължителен резултат лечението с крем, съдържащ bifonazole, трябва да бъде проведено докрай и за подходящ период от време.

Обикновено периодите на лечение са следните:

При микози на краката и между пръстите, атлетично стъпало (тинеа педум, тинеа педум интредигиталис)	3 седмици
---	-----------

Микози на тялото, ръцете и кожни гънки (тинеа корпорис, тинеа манум, тинеа ингуиналис)	2-3 седмици
--	-------------

Питириазис верзиколор, еритразма	2 седмици
----------------------------------	-----------

Повърхностни кандидози на кожата	2-4 седмици
----------------------------------	-------------

Малко количество от крема обикновено е достатъчно за лечението на кожен участък с големината на човешка длан.	
---	--

Начин на приложение


Продуктът се нанася на тънък слой върху засегнатата кожа и се втрива в нея.

Продължителност на лечението

Продължителността на лечението се определя от лекуващия Ви лекар.

Ако сте приложили повече от необходимата доза Бифунал

Няма данни за предозиране.



4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Бифунал може да причини нежелани реакции.

Най-честите нежелани реакции са следните:

>0,01%<0,1%

Нарушения на имунната система – алергична реакция;

>0,1%<1%

Нарушения на нервната система – болка;

Нарушения на кожата и подкожната тъкан – контактен дерматит, екзема, упорит сърбеж (пруритус), обрив (везикулобулозен), изсъхване на кожата, неприятно усещане по кожата.

Посочените нежелани реакции са обратими при прекратяване на лечението.

Ако забележите нежелани реакции, които не са споменати в тази листовка, моля информирайте Вашия лекар или фармацевт!

5. СЪХРАНЕНИЕ НА БИФУНАЛ

При температура под 25°C.

След първо отваряне на опаковката - 3 (три) месеца при температура под 25°C.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца!

Не използвайте Бифунал след срока на годност, отбелязан върху опаковката.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия лекар или фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Бифунал

Активната съставка е бифоназол 0,01 g

Другите съставки са: октилдодеканол, цетостеарилов алкохол, цетилов восък, сорбитанов стеарат, полисорбат 60,ベンзилов алкохол, пречистена вода

Как изглежда Бифунал и какво съдържа опаковката

*Описание - еднородна маса, без агломерати и въздушни мехури с бял цвят
Bifunal крем 15 g в алуминиеви туби, лакирани, затворени с пластмасова капачка на винт, 1 туба с листовка за пациента в картонена кутия*

Bifunal крем 30 g в алуминиеви туби, лакирани, затворени с пластмасова капачка на винт, 1 туба с листовка за пациента в картонена кутия

Притежател на разрешението за употреба

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

“Актавис” ЕАД

София 1407

ул. "Атанас Дуков" № 29

България

Производител

“Балканфарма-Разград” АД

бул. “Априлско въстание” №68

7200 Разград

Тел. 084615318

