

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 12.10.04

1

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

1. НАИМЕНОВАНИЕ

HUMEXCOUGH Children 2%, syrup
ХЮМЕКСКОФ за деца 2%, сироп

2. СЪСТАВ за 100 ml:

Лекарствено вещество:

CARBOCISTEINE..... 2.00 g

Помощни вещества:

Натриев метил парагидроксибензоат, разтвор на натриев хидроксид, аромат на банан, лимонена киселина моногидрат, разтвор на захароза, пречистена вода.

Една доза (5 ml в мерителна чашка) съдържа съдържа 100 mg carbocisteine и 1.9 g захароза.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И ОПАКОВКА

Сироп; бутилка от 125 ml с мерителна чашка

4. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА:

Laboratoires URG0, 42, rue de Longvic - 21300 CHENOYE, FRANCE

5. ПРОИЗВОДИТЕЛ

Laboratoires URG0, 9 rue Petitot – 21 000 DIJON, FRANCE

4. ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА

МУКОЛИТИЧНО СРЕДСТВО ATC: R05CB

5. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Това лекарство променя бронхиалната секреция.

То улеснява прочистването на бронхите чрез кашляне.

Това лекарство се препоръчва за лечение на скорошни дихателни нарушения, включващи затруднения в отхрачването.

То е предназначено за употреба при деца.

• Противопоказания

Не трябва да употребявате това лекарство, ако сте алергични към някоя от неговите съставки.

• Специални предупреждения

Тъй като това лекарство е показано за лечение на заболяване, което изисква мнение на лекар, то не трябва да се дава на деца преди да се потърси лекарски съвет.

В детската възраст до 3 години муколитици се прилагат само по лекарско предписание. Детска възраст – не се прилагат.

• Предпазни мерки при употреба

Не комбинирайте това лекарство, съдържащо Carbocisteine, с други лекарства, подсушават бронхиалната секреция.

Това лекарство трябва да се прилага внимателно при лица с язва на стомаха и



дванадесетопръстника.

5 ml от този сироп съдържа 1.9 g захароза.

АКО ИМАТЕ НЯКАКВИ СЪМНЕНИЯ, МОЛЯ ПОСЪВЕТВАЙТЕ СЕ С ЛЕКУВАЩИЯ ЛЕКАР ИЛИ С ФАРМАЦЕВТ.

СЪХРАНЯВАЙТЕ ТОВА ЛЕКАРСТВО НА МЯСТО, НЕДОСТЪПНО ЗА ДЕЦА .

- **Лекарствени взаимодействия**

ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ВЪЗМОЖНИ ВРЕДНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ НЯКОЛКО ЛЕКАРСТВА, МОЛЯ УВЕДОМЯВАЙТЕ ФАРМАЦЕВТА ИЛИ ЛЕКУВАЩИЯ ЛЕКАР ЗА ВСЯКО ДРУГО ЛЕЧЕНИЕ, КОЕТО ПРОВЕЖДАТЕ.

Този лекарствен продукт съдържа Carbocisteine. Други лекарства може също да съдържат това лекарствено вещество. Внимавайте да не комбинирате тези лекарства, защото може да надхвърлите препоръчваните максимални дози

- **Помощни вещества, които някои пациенти трябва да знаят, за да използват този продукт без рисък.**

Този лекарствен продукт съдържа:

- Захароза. Когато се приема, съгласно препоръките за дозиране, всяка доза от 5 ml сироп набавя до 1.9 g захароза. Неподходящ при хора с вродена непоносимост към фруктозата, глюкозен/галактозен синдром на малабсорбация или захарозно/изомалтазен дефицит.
- Натриев метил паракидроксибензоат. Известно е, че причинява уртикария

8. КАК ДА СЕ ПРИЛАГА ТОВА ЛЕКАРСТВО

- **Дозировка и метод на приложение**

Обичайна доза:

- . **деса над 5-годишна възраст:** 5 ml в мерителна чашка - 3 пъти дневно.
- . **деса под 5-годишна възраст:** 5 ml в мерителна чашка - 2 пъти дневно

- **Продължителност на лечението**

Продължителността на лечение е ограничена до 5 дни !

- **Предозиране**

При случайно предозиране **СПРЕТЕ ЛЕЧЕНИЕТО И НЕЗАБАВНО УВЕДОМЕТЕ ЛЕКАР.**

- **Ако сте пропуснали да вземете лекарството**

Не вземайте двойна доза, заради пропуснатата единична доза.

9. НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Високи дози може да предизвикат стомашно-чревни оплаквания (стомашна болка, гадене, повръщане). В такива случаи се препоръчва намаляване на дозата.

10. СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте при температура под 25°C.

11. СРОК НА ГОДНОСТ

Не употребявайте след изтичане срока на годност, отбелязан върху опаковката.

12. Последна редакция на листовката: 16.07.2001

