

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
дата 30.04.08

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛ

PREZERA 5 mg Film-coated tablets
ПРЕЗЕРА 5 mg филмирани таблетки
Финастерид (Finasteride)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. **Какво представлява ПРЕЗЕРА 5 mg филмирани таблетки и за какво се използва**
2. **Преди да приемете ПРЕЗЕРА 5 mg филмирани таблетки**
3. **Как да приемате ПРЕЗЕРА 5 mg филмирани таблетки**
4. **Възможни нежелани реакции**
5. **Как да съхранявате ПРЕЗЕРА 5 mg филмирани таблетки**
6. **Допълнителна информация**

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРЕЗЕРА 5 mg филмирани таблетки И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Активното вещество в ПРЕЗЕРА 5 mg филмирани таблетки е финастерид, който принадлежи към група лекарства, наречени 5 α -редуктазни инхибитори. Те действат като намаляват размера на простатната жлеза при мъже.

ПРЕЗЕРА 5 mg филмирани таблетки се използва в лечението и контрола на доброкачественото увеличаване на простатата (доброкачествена хиперплазия на простатата - ДХП). Лекарството води до намаляване на увеличената простатна жлеза, подобрява уринарния поток и симптомите причинени от ДХП и намалява риска от остра задръжка на урина и необходимостта от операция.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ПРЕЗЕРА 5 mg филмирани таблетки

Не приемайте ПРЕЗЕРА 5 mg филмирани таблетки:

- ако сте алергични (свъръхчувствителни) към финастерид или към някоя от останалите съставки на това лекарство (виж "Какво съдържа ПРЕЗЕРА 5 mg филмирани таблетки")
- ако сте бременна или има вероятност да забременеете ПРЕЗЕРА 5 mg филмирани таблетки не е показан за употреба при жени. Необходимо е специално внимание при жени, които са бременни или може да забременеят, и при които съществува вероятност да работят с ПРЕЗЕРА 5 mg филмирани таблетки (виж раздел "Бременност и кърмене")

ПРЕЗЕРА 5 mg филмирани таблетки не се препоръчват за употреба при деца.

ПРИ СЪМНЕНИЕ ВИНАГИ СЕ КОНСУЛТИРАЙТЕ С ВАШИЯ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ.



Обърнете специално внимание при употребата на ПРЕЗЕПА 5 mg филмирани таблетки:

- ако Вие имате голямо количество остатъчна урина и/или силно намален уринарен поток. В такъв случай трябва да бъдете внимателно наблюдаван за стесняване на пикочния път.
- ако имате понижена функция на черния дроб. Плазменото ниво на финастериid може да се увеличи при такива пациенти.
- ако Вашата сексуална партньорка е бременна или е възможно да е бременна, трябва да избягвате да я излагате на контакт с Вашата семенна течност, която съдържа много малко количество от лекарството.

Говорете с Вашия лекар, ако някое от горните състояния е валидно за Вас сега или е било валидно в миналото.

Преди започване на лечението с финастериid и по време на лечението трябва да се провежда клиничен преглед (включително ректално изследване) и определяне на простатен-специфичен антigen (PSA) в серума.

Прием на други лекарства

Не са установени значими взаимодействия.

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или насърко сте приемали други лекарства, включително и такива, отпусканi без рецептa.

Бременност и кърмене

ПРЕЗЕПА 5 mg филмирани таблетки е предназначен само за мъже.

Жените, които са бременни или може да забременеят не трябва да докосват счупени или раздробени таблетки ПРЕЗЕПА 5 mg. Ако финастериid се абсорбира през кожата или се погълне през устата от жена, бременна с момче, детето може да се роди с неправилно формирани полови органи. Таблетките са филмирани, което предотвратява контакт с финастериid, при условие че таблетките не са счупени или раздробени.

Когато сексуалната партньорка на пациента е бременна или е възможно да забременее, пациентът трябва или да избягва да я излага на контакт с неговата семенна течност (напр. като използва презерватив) или да прекрати лечението с финастериid.

Шофиране и работа с машини

Няма данни подсказващи, че ПРЕЗЕПА 5 mg филмирани таблетки може по някакъв начин да повлияе на способността за шофиране или работа с машини.

Важна информация относно някои от съставките на ПРЕЗЕПА 5 mg филмирани таблетки
Ако Вашият лекар ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, обадете му се преди да приемете това лекарство.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ПРЕЗЕПА 5 mg филмирани таблетки

Винаги приемайте ПРЕЗЕПА 5 mg филмирани таблетки точно, както Ви е казал Вашия лекар.
Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Обичайната доза е 1 таблетка дневно (еквивалентно на 5 mg финастериid).

Филмираните таблетки могат да се приемат както на гладно, така и с храна. Филмираните таблетки трябва да се погълнат цели и не трябва да се разделят или раздробяват.

Макар, че може да се появи ранно подобрене, за да се оцени дали е постигнат добър отговор, може да е необходимо лечение в продължение на най-малко 6 месеца.

Вашият лекар ще определи продължителността на лечението с ПРЕЗЕПА 5 mg филмирани таблетки. Не прекъсвайте лечението по-рано, защото симптомите може да се появят отново.



Пациенти с увредена чернодробна функция

Няма опит с употребата на ПРЕЗЕПА 5 mg филмирани таблетки при пациенти с ограничена чернодробна функция (виж също “Обърнете специално внимание при употребата на ПРЕЗЕПА 5 mg филмирани таблетки”).

Пациенти с увредена бъбречна функция

Не се налага корекция на дозите. Употребата на ПРЕЗЕПА 5 mg филмирани таблетки при пациенти на хемодиализа не е проучвано досега.

Пациенти в старческа възраст

Не се налага корекция на дозите.

Ако имате чувството, че ефекта на ПРЕЗЕПА 5 mg филмирани таблетки е твърде силен или твърде слаб, говорете с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте приели повече от необходимата доза ПРЕЗЕПА 5 mg филмирани таблетки

Ако сте приели повече ПРЕЗЕПА 5 mg филмирани таблетки от необходимото, или деца са приели случайно лекарство, моля незабавно уведомете Вашия лекар.

Ако сте пропуснали да приемете ПРЕЗЕПА 5 mg филмирани таблетки

Ако забравите да приемете доза от ПРЕЗЕПА 5 mg, можете да я вземете веднага след като си спомните, освен ако вече е време за следващата доза. В такъв случай Вие трябва да продължите с лекарството, както Ви е предписано. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате никакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, ПРЕЗЕПА 5 mg филмирани таблетки може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

За оценка на нежеланите реакции се използва следното описание на честотата:

Много чести:	появяват се при повече от 1 на 10 пациенти
Чести:	появяват се при повече от 1 на 100 пациенти
Нечести:	появяват се при по-малко от 1 на 100 пациенти
Редки:	появяват се при по-малко от 1 на 1 000 пациенти
Много редки:	появяват се при по-малко от 1 на 10 000 пациенти

Най-честите нежелани реакции са импотенция и намалено сексуално желание. Тези реакции нормално се появяват в началото на лечението, но обикновено не са с голяма продължителност при голямата част от пациентите, ако лечението бъде продължено.

Възпаление на кожата/алергични реакции

Чести

Обрив.

Редки

Сърбеж, уртикария (копривна треска).

Реакции на свърхчувствителност, като оток на лицето и устните.

Общи нарушения и нарушения на мястото на приложението

Уморяемост.



Нарушения на възпроизвеждащата система и гърдата

Много чести

Импотенция.

Чести

Понижено сексуално желание, намален обем на спермата, нарушения на еякулацията, напрежение в гърдите/нарастване на гърдите при мъже.

Нечести

Тестикуларни болки.

Много редки

Секреция от гърдите при мъже, възелчета в гърдите.

Финастерид може да промени резултатите от лабораторното изследване на PSA.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНИВАТЕ ПРЕЗЕПА 5 mg филмирани таблетки

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте ПРЕЗЕПА 5 mg филмирани таблетки след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка или блистера. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа ПРЕЗЕПА 5 mg филмирани таблетки

- Активното вещество е финастерид. Всяка филмирана таблетка съдържа 5 mg финастерид.
- Другите съставки са лактоза монохидрат, микрокристална целулоза, натриев нишестен гликолат (тип A), прежелатинизирано нишесте (царевично), повидон K30, магнезиев стеарат, натриев лаурилсулфат, опадрай-бу (хипромелоза (E464), титаниев диоксид (E171), макрогол 6000, макрогол 400, индигокармин алуминиев лак (E132)).

Как изглежда ПРЕЗЕПА 5 mg филмирани таблетки и какво съдържа опаковката

ПРЕЗЕПА 5 mg филмирани таблетки са сини, капсулоподобни таблетки с надпис "FNT5" от едната страна.

ПРЕЗЕПА 5 mg филмирани таблетки се предлагат в картонени кутии от 14, 15, 20, 28, 30, 50, 50 (50 x 1) болнична опаковка, 56, 60, 84, 90, 98 таблетки 100 или 120 филмирани таблетки.

Не всички видоме опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.

Притежател на разрешението за употреба

Тева Фармасютикс България ЕООД

Ул. "Н.В. Гогол" 15, ет. 1

1124 София

България



Производители

TEVA UK Ltd
Brampton Road, Hampden Park,
Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG
Великобритания

Pharmachemie B.V.
Swensweg 5, Postbus 552
2003 RN Haarlem
Холандия

TEVA Santé S.A.
Rue Bellocier, 89107 Sens
Франция

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company
Pallagi út 13, 4042 Debrecen
Унгария

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

Тева Фармасютикълс България ЕООД
ул. "Н.В. Гогол" 15
1124 София
България
Тел. 359 2 489 95 82
Факс: 359 2 489 95 86

Това лекарство е разрешено за употреба в страните членки на ЕЕА под следните търговски имена:

Франция	Finasteride Teva 5 mg, comprimé pelliculé
Австрия	Prezera 5 mg Filmtabletten
Белгия	Finasteride Teva 5 mg filmomhulde tabletten
България	ПРЕЗЕРА 5 mg филмирани таблетки
Кипър	Finasteride 5 mg Teva
Чехия	Finasterid-Teva 5 mg, potahované tablety
Германия	Fina-TEVA 5 mg Filmtabletten
Дания	Finaprost 5 mg Filmovertrukne tabletter
Естония	Finasteride Teva
Гърция	Finasteride Teva 5 mg Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Испания	Finasterida Teva 5 mg comprimidos recubiertos con película EFG
Финландия	Tevaprost 5 mg tabletti kalvopäällysteinen
Унгария	Redukttotal 5 mg filmtabletta
Италия	FINASTERIDE Teva Italia 5 mg compresse rivestite con film
Латвия	FinasterideTeva 5 mg plēvele dengtos tabletēs
Люксембург	Finasteride Teva 5 mg Comprimés pelliculés
Литва	Finasteride Teva 5 mg apvalkotās tabletes
Малта	Finasteride Teva 5 mg Film-coated tablets
Холандия	Finasteride 5 mg Pharmachemie, tabletten
Норвегия	Tevaprost 5 mg tabletter, filmdrasjer



Полша	Finasteryd TEVA
Португалия	Finasterida-Teva
Румъния	Finasteride Teva 5 mg, comprimate filmate
Швеция	Tevaprost 5 mg Tablett
Словакия	Finasterid-Teva 5 mg filmom obalené tablety

Дата на последна редакция на текста
Юли 2008

