

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

Моля, прочетете внимателно тази листовка преди да започнете Вашето лечение. За допълнителна информация се обръщайте към Вашия лекар или фармацевт.

Това лечение е предписано от лекар специално за Вас и не трябва да давате лекарството на други хора. Лекарството може да им навреди, дори и ако имат същите оплаквания като Вас.

ETODIN 200 mg film-coated tablets
ЕТОДИН 200 mg филмирани таблетки

етодолак (etodolac)
Филмирани таблетки

Какво съдържа Etodin?

Всяка филмирана таблетка съдържа 200 mg etodolac.

Помощни вещества: лактозаmonoхидрат, микрокристална целулоза РН 102, аерозил, кроскармелоза натрий, поливинилпиролидон, магнезиев стеарат

Оцветители: Е 171 и Е 172

Лекарствена форма и опаковка

Etodin филмирани таблетки: може да намерите в опаковка от 2 и 20 таблетки.

Как действа Etodin?

Etodin притежава противовъзпалително, аналгетично (облекчава болката) и антипириетично (понижава високата температура) действие.

Etodin подтиска синтезата на простагландините във възпалените тъкани. По този начин намалява и предотвратява чувствителността на болковите рецептори към медиаторите на възпалението, като хистамин, серотонин и гуинин. Etodin подтиска ензима циклооксигеназа (простагландин синтетаза) и предотвратява синтезата на простагландини от арахidonовата киселина. Като допълнение, Etodin притежава урикузурична активност

Приемът на Etodin не се влияе от храна и антиацидни медикаменти.

Как лекува Etodin?

Etodin е показан за симптоматично лечение на:

- ревматични заболявания като ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилит
- артроза с болка и затруднения в движението
- кратковременно и продължително лечение на остеоартрит
- за облекчаване на леки и средни болки (при възпаление на меките тъкани, мускулни болки, зъббол и постоперативни стоматологични интервенции, дизменорея, главоболие)

Как се приема Etodin?

Дозировката и продължителността на лечение се определят от лекуващия лекар. Ако не е предписано друго Etodin се прилага 2 пъти (сутрин и вечер) дневно по 1 таблетка.

При остра болка може да се приема на по-къси интервали.

Максималната дневна доза е 1200 mg. При пациенти с телесно тегло > 60 kg или по-малко, общата дневна доза не трябва да превиши 20 mg/kg.

Не се прилага при деца под 16 годишна възраст.



Не се налага корекция на дозата при възрастни хора.

Кога не трябва да взимате Etodin?

Etodin не трябва да се прилага при пациенти със свръхчувствителност към Etodolac или някое от помощните вещества и при пациенти с анамнестични данни за пептична язва или активна пептична язва. Поради възможност от развитие на кърстосана реакция, той не трябва да се прилага и при пациенти, които развиват астма, ринит или уртикария по време на лечение с аспирин или други нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС). Не се прилага при деца под 16 годишна възраст.

Приложение по време на бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на което и да е лекарство. **Etodin** не се препоръчва по време на бременност.

Какво трябва да знаете преди да започнете да приемате Etodin?

Както другите НСПВС, етодолак може да подтисне тромбоцитната функция. Особено, пациенти получаващи антикоагулантна терапия трябва да се проследяват за гастроинтестинални симптоми и лечението трябва да се прекрати ако се появи кървене. При пациенти със сърдечна недостатъчност, цироза или нефрит, при такива които употребяват диуретици, при пациенти с хронична бъбречна и чернодробна недостатъчност и особено при възрастни хора, бъбречната и чернодробната функция трябва да бъдат проследени в началото на лечението. Не се препоръчва при жени, които правят опити да забременеят, защото приемът на etodolac може да доведе до обратимо потискане на фертилитета.

Лекарства като **Etodin** могат да бъдат свързани с леко повишен риск от сърден инцидент (миокарден инфаркт) или инсулт. Всеки риск е по-вероятен при високи дози и продължително лечение. Не превишавайте препоръчените дози и продължителността на лечението.

Ако имате проблеми със сърцето, прекаран инсулт или мислите, че за Вас може да има риск от появата им (например, ако имате високо кръвно налягане, диабет, повишени стойности на холестерол или сте пушач) трябва да обсъдите лечението с Вашия лекар или фармацевт.

Може ли да приемате Etodin заедно с други медикаменти?

Тъй като **Etodin** се свързва в голяма степен с плазмените протеини, необходима е корекция на дозировката на другите съвместно приложени медикаменти (антикоагуланти), които също имат висока степен на свързване с плазмените протеини.

- **Etodin** може да потенцира ефектите на пероралните антикоагуланти и хепарина, предизвиквайки кървене.
- **Etodin** може да предизвика засилване на хипогликемичните ефекти на сулфамидите.
- Тъй като **Etodin** може да индуцира повишаване на концентрацията на литий в плазмата, по време на съвместно приложение на тези 2 медикамента плазменото ниво на литий трябва да се мониторира.
- **Etodin** може да увеличи хематологичната токсичност на methotrexate.
- **Etodin** може да намали ефективността на диуретиците.
- **Etodin** може да засили действието на следните лекарства:

Той увеличава антиагрегантното действие на ticlopidine върху тромбоцитите. При съвместно приложение трябва да се проследява времето на кърчене.



Когато се прилага съвместно с други нестероидни противовъзпалителни средства, рисъкът от язва и кръвотечение се увеличава.

Влияе ли Etodin на способността за шофиране и работа с машини?

Няма данни Etodin да повлиява способността за шофиране и работа с машини.

Какви нежелани лекарствени реакции може да причини Etodin?

Гастроинтестинални:

Може да се наблюдават гадене, болка в епигастриума, диария, подуване на корема и запек. Тези ефекти обикновено са леки и преходни. Може да предизвика кървене от гастроинтестиналния тракт.

Реакции на свръхчувствителност:

- Дерматологични (кожни обриви, сърбеж)
- Респираторни (астматични пристъпи при пациенти с астма; алергичен ринит; уртикария по време на лечението с аспирин или други нестероидни противовъзпалителни средства).

Чернодробни:

Може да се появят леки и преходни покачвания на серумните трансаминази.

Неврологични:

Може да се наблюдава главоболие, замаяност и лесна уморяемост.

Сърдечно-съдови:

Лекарства като Etodin могат да бъдат свързани с леко повишен риск от сърден инцидент (миокарден инфаркт) или инсулт.

КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С ВАШИЯ ЛЕКАР, АКО ЗАБЕЛЕЖИТЕ НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ!

Как се съхранява Etodin?

ДА НЕ СЕ УПОТРЕБЯВА СЛЕД ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ГОДНОСТ ПОСОЧЕН ВЪРХУ ОПАКОВКАТА

Да се съхранява под 25⁰ С. Да се съхранява в оригиналната опаковка. Да се съхранява на място недостъпно за деца.

Продава се по лекарско предписание.

Посъветвайте се с Вашия лекар преди употреба.

Притежател на разрешението за употреба и вносител

НОБЕЛ ФАРМА ООД

бул. Симеоновско шосе № 24

София 1700, България

Производител

NOBELFARMA ILAC SANAYII ve TICARET A.S.

Sancaklar Koyu 81 100 / DUZCE, Турция

Регистрационен №: 20070003

Дата на последна редакция на листовката: юни 2008 г.

