

Листовка за пациента

ZINACEF 750 mg powder for solution for injection
ZINACEF 1,5 g powder for solution for injection

ЗИНАЦЕФ 750 mg прах за инжекционен разтвор
ЗИНАЦЕФ 1,5 g прах за инжекционен разтвор

цефуроксим (cefuroxime)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да прилагате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.

1. Какво представлява ЗИНАЦЕФ и за какво се използва

ЗИНАЦЕФ съдържа цефуроксим, който принадлежи към група антибиотици, наречени цефалоспорини. Антибиотиците се използват за да унищожат бактериите, които причиняват инфекции.

Вашият лекар Ви е предписал това лекарство защото имате инфекция или е необходимо да Ви предпази от инфекция преди или след операция.

ЗИНАЦЕФ се използва за лечение и профилактика на голям брой бактериални инфекции.

ЗИНАЦЕФ е активен срещу широк спектър често срещани патогени, между които много ампицилин-резистентни или амоксицилин-резистентни бактериални щамове.

Със ЗИНАЦЕФ могат да бъдат лекувани инфекции на дихателната система, ухото, носа, гърлото, отделителната система, половата система, червата, корема, жлъчния мехур, костите, ставите, меките тъкани, кожата, обвивките на мозъка (менингит), както и тежки общи инфекции. ЗИНАЦЕФ може да се прилага и за лечение на гонорея, особено при непоносимост към пеницилин. ЗИНАЦЕФ се използва и за предотвратяване на инфекции при хирургични операции.

Понякога ЗИНАЦЕФ се прилага в комбинация с други антибиотици за лечение или предотвратяване на инфекции.

2. Преди да приемете ЗИНАЦЕФ

Ако отговорът на някой от въпросите по-долу е "да", информирайте Вашия лекар преди да започне приложението на лекарството:

- Имате ли алергия към цефуроксим, други цефалоспорини или пеницилини?
- Бременна ли сте или се опитвате да забременеете?
- Кърмите ли?
- Изследвате ли урината си за захар? ЗИНАЦЕФ може да повлияе на резултатите от тези тестове.

Информирайте Вашия лекар ако приемате противозачатъчни таблетки. Както при други антибиотици може да се наложи да вземате допълнителни контрацептивни мерки.

Информирайте Вашия лекар за всички други лекарства, които приемате, дори за тези, които сте си купили сами без лекарско предписание.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВЕТА
Листовка - Приложение 2
Към РУ №: 11-2596-7, 18.07.08
Одобрено: 17 / 13.05.08



3. Как да приемате ЗИНАЦЕФ

ЗИНАЦЕФ трябва винаги да се прилага от квалифицирано медицинско лице.

Обичайната дозировка на лекарството е:

Възрастни – 750 mg три пъти дневно интравенозно или интрамускулно. При по-тежки инфекции дозата е по-висока – 1,5 g три пъти дневно интравенозно.

В някои случаи лекарството може да бъде добавено към банка за капкова инфузия.

Деца – дозата зависи от възрастта и теглото.

За интрамускулно приложение към ЗИНАЦЕФ 750 mg трябва да се добавят 3 ml вода за инжекции и да се разклати внимателно до получаване на непрозрачна матова суспензия.

За интравенозно приложение ЗИНАЦЕФ 750 mg трябва да се разтвори в най-малко 6 ml, а ЗИНАЦЕФ 1,5 g в 15 ml вода за инжекции.

В случаите, при които лекарството се добавя към банка за капкова инфузия, ЗИНАЦЕФ 1,5 g се разтваря в 15 ml вода за инжекции и към получения разтвор се прибавя съвместим инфузионен разтвор до обем 50 или 100 ml.

Точната доза, която Ви е предписана, зависи от вида на инфекцията, възрастта и здравословното Ви състояние. Вашият лекар ще прецени каква доза е най-подходяща за Вас.

Възможно е при някои инфекции лекарят да Ви прилага ЗИНАЦЕФ (цефуросим натрий) три пъти на ден в продължение на няколко дни, след което да продължите перорален прием на същия антибиотик под формата на таблетки – ЗИНАТ (цефуросим аксетил).

4. Възможни нежелани реакции

ЗИНАЦЕФ не създава проблеми при повечето хора, които го приемат. Но подобно на всяко друго лекарство при някои пациенти продуктът може да предизвика нежелани реакции.

Уведомете Вашия лекар **незабавно**, ако се появи някоя от следните нежелани реакции:

- внезапна поява на хрипове и гръдна болка или тежест в гърдите
- подуване на клепачите, лицето или устните.

Чести нежелани реакции

Те могат да засегнат до 1 на 10 пациенти:

- промени в броя на кръвните клетки или резултатите от чернодробните тестове
- болка или възпаление на мястото на приложение (тромбофлебит).

Нечести нежелани реакции

Те могат да засегнат до 1 на 100 пациенти:

- кожен обрив, уртикария, сърбеж
- лека диария или гадене.

Редки нежелани реакции

Те могат да засегнат до 1 на 1 000 пациенти:

- кандидоза (гъбична инфекция). Тя може да причини сърбеж и парене в областта на половите органи с наличие на гъст, бял секрет, или болезнени бели участъци върху езика или вътрешността на устата.
- по-лесно получаване на синини при удар от обикновено (тромбоцитопения)
- повишена температура.



Много редки нежелани реакции

Те могат да засегнат до 1 на 10 000 пациенти:

- подуване на клепачите, лицето или устните
- тежка диария или гадене, или силни болки в областта на стомаха
- кървене от правото черво
- възпаление на бъбреците
- поради възпаление на кръвоносните съдове в кожата (кожен васкулит) може да настъпи кожна реакция, която да започне с червени петна, подобно на обрива при дребна шарка. Тези петна могат да са сърбящи с парещо или болезнено усещане, като могат да се превърнат в мехури, да кървят, да се лющят или да се разранят.

Информирайте Вашия лекар, ако забележите други нежелани реакции, които не са споменати в тази листовка или ако има нещо, което Ви тревожи, смущава или не разбирате.

5. Как да съхранявате ЗИНАЦЕФ

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.
Съхранявайте ЗИНАЦЕФ при температура под 25°C.
Да се пази от светлина.

След разтваряне ЗИНАЦЕФ може да се използва в рамките на 5 часа, ако се съхранява при температура под 25°C или в рамките на 48 часа, ако се съхранява при температура от +2°C до +8°C (в хладилник).

Не използвайте ЗИНАЦЕФ след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.

6. Допълнителна информация

Какво съдържа ЗИНАЦЕФ

- Активното вещество в ЗИНАЦЕФ е цефуроксим под формата на цефуроксим натрий. Всеки флакон съдържа 750 mg или 1,5 g цефуроксим.

Как изглежда ЗИНАЦЕФ и какво съдържа опаковката

ЗИНАЦЕФ представлява прах за инжекционен разтвор.
ЗИНАЦЕФ се предлага в опаковки, съдържащи 1 флакон.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба: Glaxo Group Ltd., Greenford, Middlesex, UB6 0NN, Великобритания.

Производител: GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A, Via A. Fleming 2, Verona 37135, Италия.

Дата на последно одобрение на листовката:

ZINACEF (ЗИНАЦЕФ) е запазена търговска марка на GlaxoSmithKline group of companies.

