

Zantac⁷⁵ film coated tablets**Зантак⁷⁵ филмирани таблетки**съдържащи 75mg ранитидин (ranitidine) под формата на хидрохлорид.

Моля, преди употреба прочетете внимателно тази листовка.

Какво има в опаковката?**Zantac⁷⁵**Таблетките **Зантак⁷⁵** са с розов цвят и петоъгълна форма.

Картонената кутия съдържа полиетиленови блистери с алуминиево фолио.

Всеки блистер съдържа 6 броя таблетки.

Опаковки от 6 или 12 таблетки.

Какво съдържа Зантак⁷⁵?Ранитидин е лекарство от групата на хистаминовите H₂-блокери.

Всяка таблетка съдържа:

- активно вещество – ранитидин 75mg (под формата на хидрохлорид);
- помощни вещества – микрокристална целулоза, магнезиев стеарат, метил хидроксипропилцелулоза, титанов диоксид, триацетин, синтетичен червен железен оксид.

Как действа Зантак⁷⁵?

Стомашният сок съдържа солна киселина, която подпомага храносмилането. Понякога тази киселина е в по-голямо количество. Излишъкът й предизвиква оплаквания, известни като киселини и нарушения в храносмилането (диспепсия). Обичайните противокиселинни средства съдържат вещества, които само неутрализират киселините. Затова ефектът им е краткотраен и трябва да се приемат при всяко хранене, за да противодействат на стомашния дискомфорт.

За какво се използва Зантак⁷⁵?

Таблетките **Зантак⁷⁵** действат по съвсем различен начин срещу излишъка от солна киселина и нарушеното храносмилане. Вместо да неутрализират киселината, те повлияват първопричината, като предотвратяват отделянето на прекомерно количество киселина. Една таблетка **Зантак⁷⁵** осигурява бърз ефект (проявява се до около половин час) и продължително облекчение (до 12 часа).

Преди да започнете употребата на Зантак⁷⁵

Моля, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да започнете да приемате таблетките:

- Ако сте алергични към ранитидин или към някое от помощните вещества на таблетките **Зантак⁷⁵**;
- Ако Ви е известно, че страдате от пептична язва (стомашна или дуоденална);
- Ако сте бременна, опитвате се да забременеете или кърмите;
- Ако имате бъбречни или чернодробни проблеми;
- Ако Ви е известно, че страдате от рядкото заболяване порфирия.



- Ако сте отслабнали внезапно без специална диета поради диспепсия (нарушено храносмилане);
- Ако сте в средна или напреднала възраст и се оплаквате от внезапна поява или бърза прогресия на вече изявени в миналото проблеми със stomаха;
- Ако страдате от друго заболяване, във връзка, с което приемате други лекарства, предписани от лекар или закупени от аптеката без рецептa.

Как да приемате Зантак⁷⁵?

Възрастни (включително и тези в напреднала възраст) и деца над 16 години.

За предотвратяване на симптомите:

Вземете една таблетка Зантак⁷⁵ с вода 30 минути до 1 час преди консумация на храна и/или напитки, които биха могли да провокират подобни проблеми.

За лечение на симптомите:

Веднага след появата на оплаквания се приема една цяла таблетка Зантак⁷⁵ с малко вода.

При повечето пациенти приемът на една или две таблетки дневно води до облекчаване на симптомите. Въпреки това, за период от 24 часа може да се приемат до 4 таблетки.

Не приемайте повече от 4 таблетки на денонощие.

Зантак⁷⁵ не се препоръчва за деца под 16 години!

При ежедневен прием продължителността на лечебния курс не трябва да надвишава 2 седмици.

Какво трябва да се направи, ако сте приели повече от допустимите дози?

Ако случайно сте приели повече таблетки от препоръченото, потърсете съвета на лекар или фармацевт!

Ако след започване на лечението оплакванията Ви се засилят или не се повлият в рамките на 2 седмици, потърсете консултация с Вашия лекар!

Нежелани лекарствени реакции

При повечето пациенти, приемащи Зантак⁷⁵, не се наблюдават нежелани лекарствени реакции.

Както към всички други лекарства в редки случаи може да се прояви алергия и към Зантак⁷⁵. Ако скоро след като сте започнали да приемате таблетките се появят някои от следните реакции, СПРЕТЕ лекарството и незабавно уведомете лекаря:

- внезапно хриптене или стягане и болки в гръденя кош;
- подпухване на клепачите, лицето, устните, устата или езика;
- неравномерен (на бучки) обрив по кожата някъде по тялото;
- необяснимо висока температура;
- чувство на премаляване, особено когато ставате.

Спрете приема на лекарството и се посъветвайте с лекаря, ако страдате от чести инфекции или неочеквани наранявания.

Нежеланите реакции са редки. Все пак, ако забележите някои от следните нежелани реакции, консултирайте се с лекар колкото е възможно по-скоро.

- обърканост;
- гадене и загуба на апетит, които са по-силни от нормалното, също без жълтеница (жълт цвят на кожата и бялото на очите), тъй като то може да се дължи на хепатит (възпаление/инфекция на черния дроб);
- бавен или неритмичен пулс, замаяност или премаляване;
- замъглено виждане;



- кожни реакции, понякога тежки (червени или морави петна или обриви);
- косопад;
- импотентност;
- силна стомашна болка или промяна на типа на болката;
- диария;
- задух или умора;
- главоболие;
- замаяност;
- болки в ставите или мускулите;
- проблеми с бъбреците (симптомите могат да включват промени в количеството и цвета на урината, която отделяте, гадене, повръщане, обърканост, повишенна температура и обрив);
- чувство на потиснатост;
- халюцинации;
- необичайни движения или потрепвания на мускулите;
- повишенна чувствителност на гърдите и/или уголемяването им при мъжете.

Ако Ви вземат преби от кръв или урина или Ви правят други изследвания, уведомете лекаря, че приемате Зантак⁷⁵, тъй като това лекарство може да повлияе на резултатите от изследванията.

Ако имате други симптоми, които не разбирате, уведомете лекаря или фармацевта.

Как се съхраняват таблетките ЗАНТАК⁷⁵?

Както и всички други лекарства, Зантак⁷⁵ трябва да се съхранява на недостъпно за деца място!

Не приемайте таблетките след изтичане срока на годност, посочен върху блистера и картонената кутия.

Кой произвежда ЗАНТАК⁷⁵?

Производител: Glaxo Wellcome S.A., Испания
 Glaxo Wellcome GmbH, Германия
 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Полша

Притежател на разрешението за употреба:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
 GlaxoSmithKline Export Ltd.
 Brentford, Middlesex,
 TW8 9GS, Великобритания

Допълнителна информация

Как мога да избегна появата на киселини и нарушен храносмилане (диспепсия)?

Различни фактори допринасят за появата на диспептични оплаквания и киселини:

- преяддане;
- неправилно хранене (приемане на големи количества храна; приемане на мазни храни);
- наднормено телесно тегло;
- заседнал начин на живот, с недостатъчно движение;
- тютюнопушене;
- повишенна консумация на алкохол.

В тези случаи се препоръчва смяна на начина на живот – нормализиране на гореизброените фактори. Така и смущенията в храносмилането се намалят.



В тази листовка не е дадена пълната информация за Зантак⁷⁵. Ако след прочитането ѝ възникнат някакви въпроси или не сте сигурни в нещо, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

Запазете листовката, може да поискате да я прочетете отново.

Тази листовка се отнася само за таблетки Зантак⁷⁵.

Зантак⁷⁵ е запазена търговска марка на GlaxoSmithKline Group of companies.

Без лекарско предписание.

Регистрационен № 9700362

Дата на актуализация на текста:

31/03/2008

