

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ТЕНАКСУМ 1mg таблетки Рилменидин (Rilmenidine)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява ТЕНАКСУМ и за какво се използва
2. Преди да приемете ТЕНАКСУМ
3. Как да приемате ТЕНАКСУМ
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ТЕНАКСУМ
6. Допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА
Листовка - Приложение 2
Към РУ №: 11-2403, 02.07.08 г.
Одобрено: 6 / 09.10.07

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТЕНАКСУМ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Това лекарство се препоръчва за лечение на хипертония.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕТЕ ТЕНАКСУМ

Не приемайте ТЕНАКСУМ

- ако сте алергични към рилменидин или към някое от помощните вещества на ТЕНАКСУМ
- ако имате тежки депресивни състояния
- ако страдате от тежка бъбречна недостатъчност

Обърнете специално внимание при употребата на ТЕНАКСУМ

Не прекъсвайте лечението без да се посъветвате с Вашия лекар.

Както при всички антихипертензивни лекарства, лечението трябва да се провежда под редовно лекарско наблюдение.

ТЕНАКСУМ не се препоръчва за употреба при деца.

Употреба на други лекарства

Моля, кажете на Вашия лекар или фармацевт ако вземате или наскоро сте вземали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта и особено:

- MAO-инхибитори
- Трициклични антидепресанти

Прием на ТЕНАКСУМ с храни и напитки

Избягвайте пиенето на алкохол по време на лечението.

Приемайте ТЕНАКСУМ както Ви е предписан от Вашия лекар преди хранене

Бременност и кърмене

- Бременност



ТЕНАКСУМ не се препоръчва при бременни жени.

• Кърмене

ТЕНАКСУМ се излъчва с майчиното мляко и затова използването му по време на кърмене не се препоръчва.

Попитайте Вашия лекар или фармацевт за съвет преди да вземете каквото и да било лекарство.

Шофиране и работа с машини

Съществува незначителен риск от поява на сънливост с ТЕНАКСУМ, както и при комбинация с лекарства, намаляващи вниманието и способността за концентрация.

Важна информация за някои от съставките на ТЕНАКСУМ

Лактоза:

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, обърнете се към него преди да приемете този лекарствен продукт.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ТЕНАКСУМ

Начин и пътища на приложение

Перорална употреба

Дозировка и честота на приложение

Винаги вземайте ТЕНАКСУМ точно както Ви е казал Вашия лекар. Говорете с него или с Вашия фармацевт ако не сте сигурни за нещо. Обичайната дозировка е 1 таблетка на ден. Препоръчително е да приемате лекарството като еднократна доза сутрин.

В случай на незадоволителен резултат след едномесечно лечение, дозата може да се увеличи до 2 таблетки дневно. Препоръчва се да се приема на две дози (по една таблетка сутрин и вечер) преди хранене.

При бъбречна недостатъчност, ако креатининовия клирънс е по-висок от 15 ml/min, дозата по принцип остава същата.

Ако сте приели повече от необходимата доза ТЕНАКСУМ

В случай на предозиране незабавно потърсете Вашия лекар.

Ако сте пропуснали да приемете ТЕНАКСУМ

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате забравената таблетка.

Ако сте спрели приема на ТЕНАКСУМ

Не прекъсвайте лечението без да сте се посъветвали с Вашия лекар.

Ако имате допълнителни въпроси относно употребата на този лекарствен продукт, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Като всяко лекарство ТЕНАКСУМ може да предизвика нежелани лекарствени реакции въпреки, че не всеки ги получава.

Тези реакции настъпват рядко и са леки и преходни при терапевтични дози: отпадналост, ускорен пулс, безсъние, сънливост, стомашни болки, диария, кожен обрив; в изключителни случаи – студени крайници, безпокойство, крампи, гадене, запек и горещи вълни към лицето.

Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна или забележите реакция, неопишана в тази листовка, моля съобщете на Вашия лекар или фармацевт.



5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ТЕНАКСУМ

Да се съхранява при температура под 25°.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте ТЕНАКСУМ след срока на годност, отбелязан на картонената опаковка след Годен до:. Датата на годност отговаря на последния ден от съответния месец.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа ТЕНАКСУМ

- Активното вещество е рилменидин, всяка таблетка съдържа 1 mg рилменидин.
- Другите съставки силициев диоксид колоиден безводен, лактоза, магнезиев стеарат, микрокристална целулоза, парафин, натриев нишестен гликолат, талк, бял пчелен восък.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

Как изглежда ТЕНАКСУМ и какво съдържа опаковката

ТЕНАКСУМ 1mg са бели, двойно изпъкнали таблетки, гравирани с „Н” от двете страни. Таблетките се предлагат в PVC/Алуминиеви опаковки (блистери) с по 30 таблетки.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба

Les Laboratoires Servier
22 rue Garnier
92200 Neuilly sur Seine
Франция

Производители

Les Laboratoires Servier Industrie
905 route de Saran
45520 Gidy
Франция

Местен представител :

Сервие Медикал ЕООД
Тел.: +359 2 921 57 00

Дата на последно одобрение на листовката: 06.2008

