

И. ТЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВА
Листовка - Приложение 2
Към РУ №: 11-2369, 25.06.08
Одобрено 13 / 26.02.08

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

Моля, преди да започнете да приемате това лекарство прочетете внимателно цялата листовка.

- Пазете тази листовка. Може да пожелаете да я прочетете отново.
- Ако имате допълнителни въпроси, моля попитайте Вашия лекар или Вашия фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас и не трябва да го давате на други хора. То може да им навреди дори когато техните оплаквания са същите като Вашите.

В тази листовка:

1. Какво представлява ЗИВОКСИД и за какво се използва
2. Преди да започнете да приемате ЗИВОКСИД
3. Как трябва да се приема ЗИВОКСИД
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхраняване на ЗИВОКСИД
6. Допълнителна информация

ZYVOXID® 600 mg film-coated tablets
ЗИВОКСИД™ 600 mg филмирани таблетки
Linezolid

Името на това лекарство е ЗИВОКСИД. Лекарственото вещество е linezolid (линезолид). Всяка филмирана таблетка съдържа 600 mg от лекарственото вещество.

Помощните вещества са: микрокристална целулоза (E460), царевично нишесте, натриев нишестен гликолат (тип A), хидроксипропилцелулоза (E463) и магнезиев стеарат (E572). Филмовото покритие съдържа макрогол 400, хипромелоза (E464), титаниев диоксид (E171) и карнаубски восък (E903), както и червен железен оксид (E172) за надписите.

Притежател на разрешението за употреба:

Pfizer Enterprises S.A.R.L.
Rond-point du Kirchberg
51, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
G. D. of Luxembourg

Производител:

Pharmacia & Upjohn
7000 Portage Road
Kalamazoo 49001 MI
USA
или
Pfizer Manufacturing Belgium NV
Rijksweg 12, B-2870, Puurs
Belgium

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЗИВОКСИД И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

ЗИВОКСИД се предлага под формата на бели, овални таблетки, съдържащи лекарствено вещество, с надпис в червено "ZYVOXID 600 mg" от едната страна.

ЗИВОКСИД филмирани таблетки се предлагат в шишета или блистери по таблетки в картонена кутия.



- Възможно е на пазара да не се предлагат всички видове опаковки.

Какъв тип лекарство е ЗИВОКСИД

ЗИВОКСИД принадлежи към група лекарства, наречени антибактериални средства.

За какво се използва ЗИВОКСИД

ЗИВОКСИД спира растежа на определени типове бактерии (микроти). Употребява се в лечението на бактериални инфекции като пневмония и някои кожни или подкожни инфекции.

2. ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ЗИВОКСИД

ЗИВОКСИД не трябва да се използва:

- Ако сте получавали алергична реакция към линезолид или някое от помощните вещества в състава на лекарството, описани по-горе.
- Ако приемате лекарства, за които се знае, че са моноаминооксидазни инхибитори, като например фенелзин, изокарбоксазид, селезин, моклобемид (тези лекарства обикновено се използват за лечение на депресия или Паркинсонова болест).
- Ако страдате от неконтролирана хипертония (високо кръвно налягане), феохромоцитом (тумор на надбъбречната жлеза), карциноид (тумор), тиреотоксикоза (повишена функция на щитовидната жлеза), депресия, шизофективни разстройства или други психични заболявания.
- Ако приемате някои от лекарствата, изброени в т. **Прием на други лекарства**.
- Ако кърмите.

Ако отговорът на някои от въпросите по-долу е **ДА**, уведомете Вашия лекар преди да приемете ЗИВОКСИД, тъй като това лекарство може да не е подходящо за Вас.

- Имате ли проблеми с черния дроб или бъбреците? Подложени ли сте на диализа?
- Страдате ли от тромбоцитопения (състояние, при което има по-малко съсираващи клетки, известни като тромбоцити, в кръвта, в следствие на което има повишена склонност към образуване на синини и кървене)?
 - Страдате ли от анемия (намален брой на червените кръвни клетки)?
 - Страдате ли от гранулоцитопения (състояние, при което има намален брой на белите кръвни клетки и е причина да сте по-чувствителни към инфекции)?

Може да имате нужда от някои кръвни тестове по време на лечението, за да се провери състоянието Ви особено ако имате и проблеми с бъбреците, вземате определени лекарства или ако Вашият лекар реши, че е необходимо лечението да продължи повече от 10-14 дни. В зависимост от резултатите от кръвните тестове понякога може да се наложи спиране на лечението със ЗИВОКСИД. Вашият лекар ще го обсъди с Вас и при необходимост ще започне различно лечение.

Употребата на антибактериални лекарства може понякога да предизвика възпаление на дебелото черво, така че ако получите диария по време на лечението, особено с наличие на кръв в изпражненията, кажете на Вашия лекар. Моля, кажете на Вашия лекар, ако сте имали диария преди да приемете ЗИВОКСИД.

Съобщете незабавно на Вашия лекар, ако получите кожен обрив, отоци по лицето и тялото, свиркащо дишане или хрипове по време на лечението с ЗИВОКСИД.

Ако трябва да Ви бъдат направени някакви изследвания, съобщете на лекара или лаборанта, който прави изследванията, че приемате ЗИВОКСИД.

Бременност



ЗИВОКСИД не трябва да се приема по време на бременност освен ако Вашият лекар не Ви е препоръчал друго. Жени в детеродна възраст е необходимо да използват ефикасни противозачатъчни средства. Свържете се незабавно с Вашия лекар, ако забременеете, смятате, че сте забременели или планирате забременяване, докато приемате ЗИВОКСИД.

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да започнете да вземате каквото и да е лекарство, ако сте бременна.

Кърмене

Докато употребявате ЗИВОКСИД, не трябва да кърмите, тъй като е известно, че ЗИВОКСИД се излъчва в майчиното мляко и може да повлияе на бебето. Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да започнете да вземате каквото и да е лекарство, докато кърмите.

Шофиране и работа с машини:

ЗИВОКСИД може да предизвика виене на свят. Не трябва да шофирате, да работите със сложни машини или да се включвате в други потенциално рискови дейности, докато не разберете дали това лекарство не засяга Вашата способност да извършвате тези дейности.

Прием на други лекарства:

Преди да започнете да приемате каквото и да е ново лекарство със ЗИВОКСИД трябва да говорите с Вашия лекар. Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако в момента вземате или насърко сте вземали каквото и да е друго лекарство, даже и без лекарско предписание.

ЗИВОКСИД и някои други лекарства могат да си влияят едно на друго (взаимодействие).

ЗИВОКСИД не трябва да се приема едновременно с някои лекарства, посочени по-горе.

В допълнение, има вероятност понякога ЗИВОКСИД да взаимодейства с някои други лекарства и да предизвика промени в кръвното налягане, температурата, сърдечната честота или други симптоми. Въпреки това лекарят може да реши да Ви дава ЗИВОКСИД, но вероятно ще има нужда да проверява състоянието Ви и кръвното Ви налягане в течение на лечението. Вашият лекар може и да реши, че за Вас е по-подходящо друго лечение.

Приемате ли някое от следните лекарства? Попитайте Вашия лекар или фармацевт, ако не сте сигурни.

- Лекарства против настинка и грип, които съдържат псевдофефедрин или фенилпропаноламин.
- Лекарства за лечение на астма като салбутамол, тербуталин, фенотерол.
- Декстрометорфан (лекарство за лечение на кашлица).
- Антидепресанти от групата на трицикличните или инхибитори на обратния захват на серотонина.
- Лекарства за лечение на внезапни, ости алергични реакции като адреналин (епинефрин).
- Лекарства, които понижават Вашето кръвно налягане като норадреналин (норепинефрин) и допамин.
- Варфарин (противосъсирващо лекарство).

Кажете на Вашия лекар, ако вземате някое от тези или подобни лекарства.

Прием на ЗИВОКСИД с храна и напитки:

Филмирани таблетки ЗИВОКСИД могат да бъдат приемани с или без храна.

ЗИВОКСИД може да взаимодейства с тирамин, вещество което нормално се среща в някои храни и да предизвика повишаване на Вашето кръвно налягане. Затова не се препоръчва



консумацията на много зряло сирене, екстракти от дрожди, соеви екстракти (напр. соев сос) и пиемето на алкохол, особено наливна бира и вино, докато приемате ЗИВОКСИД. Ако получите обезпокоително главоболие след хранене, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

3. КАК ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЕМА ЗИВОКСИД

Винаги приемайте ЗИВОКСИД точно както Вашият лекар Ви е инструктиран. Ако не сте сигурни, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

ЗИВОКСИД може би вече Ви е даван под формата на инфузионен разтвор в началото на лечението. Има отделни листовки за таблетките и за инфузионния разтвор.

Обичайната доза за възрастни (18 години и нагоре) е 1 таблетка (600 mg linezolid) два пъти дневно (на всеки 12 часа), приемана през устата.

Вашият лекар ще определи каква доза е подходяща за Вас.

Вашият лекар може да Ви предпише различна схема на дозиране и/или доза, ако имате проблеми с бъбреците и/или черния дроб.

Ако сте на диализа, трябва да получите ЗИВОКСИД след диализата.

Курсът на лечение обикновено продължава 10 до 14 дни (вкл. дните, през които сте получавали ЗИВОКСИД инфузионен разтвор), но може да достигне и до 28 дни и повече. Продължавайте да приемате ЗИВОКСИД, докато Вашият лекар не Ви каже да спрете.

Безопасността и ефективността при деца и подрастващи (под 18 години) не е установена и, следователно, linezolid не трябва да бъде използван в тази възрастова група.

По време на лечението със ЗИВОКСИД:

Уведомете Вашия лекар, ако по времето на лечение със ЗИВОКСИД развиете някое от следните състояния:

- Развивате ли симптоми на лактатна ацидоза (метаболитно нарушение с повторяще се гадене или повръщане и болки в корема)?
- Имате ли симптоми на нарушение на зрението (промени в способността Ви да четете или в начина, по който възприемате цветовете, замъглено зрение или тъмни петна пред очите)?

Ако все още не сте сигурни за нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако приемете по-голямо от необходимото количество ЗИВОКСИД:

Обадете се незабавно на Вашия лекар или отидете до най-близкото болнично спешно отделение. Вземете опаковката от ЗИВОКСИД с Вас дори ако в нея не са останали таблетки.

Ако забравите да вземете ЗИВОКСИД:

Важно е да вземате Вашите таблетки ЗИВОКСИД редовно по едно и също време всеки ден. Ако забравите да вземете една доза, вземете я веднага щом си спомните освен ако не е дошло време за Вашата следваща доза. В този случай просто продължете със следващата доза по обичайния начин. Не вземайте 2 дози по едно и също време, за да наваксате дозата, която сте пропуснали.

Ефекти при спиране на лечението с ЗИВОКСИД:

Не спирайте да приемате ЗИВОКСИД освен ако Вашият лекар не Ви е казал да направите това.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ



ЗИВОКСИД, както всички лекарства, може да причини някои нежелани лекарствени реакции.

Незабавно информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако по време на лечението със Зивоксид забележите някоя от следните нежелани лекарствени реакции:

- Кожни реакции като зачервена възпалена кожа и на люспи (дерматит), обрив, сърбеж или подуване, особено по лицето и врата. Това може да е признак за алергична реакция и може да е необходимо да се спре приема на Зивоксид;
- Проблеми със зрението като замъглено виждане;
- Диария, особено с кървене. Това може да е признак на възпаление на червата, което може да настъпи при лечение с антибиотици и може да е необходимо да се прекъсне Вашето лечение;
- Повтарящо се гадене или повръщане, коремна болка.

Други нежелани лекарствени реакции включват:

Чести нежелани лекарствени реакции (вероятно да се появят при по-малко от 1 на 10 пациента):

- Гъбични инфекции, особено вагинални и млечница
- Главоболие
- Диария, гадене или повръщане
- Промени в резултатите на някои кръвни тестове, включително тези, които измерват функцията на бъбреците, черния дроб или нивата на кръвната захар
- Промени в броя на определени кръвни клетки, което може да повлияе кръвосъсирването или да доведе до анемия

Нечести нежелани лекарствени реакции (вероятно да се появят при по-малко от 1 на 100 пациента):

- Възпаление на влагалището или гениталната област при жените
- Промени в броя на определени кръвни клетки, които може да повлияят Вашия имунитет
- Безсъние
- Замаяност, усещания като скованост и изтръпване
- Замъглено виждане
- Шум в ушите (тинитус)
- Повищено кръвно налягане, възпаление на вените
- Стомашно разстройство, стомашна болка, запек
- Сухота или възпаление на устата, подуване, възпаление или промяна в цвета на езика
- Кожен обрив
- Често уриниране
- Треска или студени тръпки, болки
- Усещане за умора или жажда
- Възпаление на панкреаса
- Повищено изпотяване
- Промени в протеините, солите или ензимите в кръвта, които измерват бъбренчата или чернодробната функция
- Намаление на броя на кръвните клетки, които се борят с инфекциите

Ако някоя от тези нежелани реакции се окаже трайна или обезпокоителна или ако забележите нежелана реакция, която не е спомената в тази листовка, моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт.

5. СЪХРАНИВАНЕ НА ЗИВОКСИД

Съхранявайте Вашето лекарство при температура под 25°C.



Пазете всички лекарства на място, недостъпно за деца!

Съхранявайте в оригиналната опаковка.

Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.

Не употребявайте след изтичане на срока на годност, отбелязан върху опаковката.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията в тази листовка се отнася само за ЗИВОКСИД таблетки. Тази листовка не съдържа цялата информация за това лекарство. Ако имате някакви въпроси или не сте сигурни за нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дата на последна редакция на листовката:

