

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 11.08.2008

VALSARCLEUS 40mg film coated tablets
ВАЛСАРКЛЕУС 40 mg филмирани таблетки

VALSARCLEUS 80mg film coated tablets
ВАЛСАРКЛЕУС 80 mg филмирани таблетки

VALSARCLEUS 160mg film coated tablets
ВАЛСАРКЛЕУС 160 mg филмирани таблетки

Валсартан

Прочетете внимателно цялото съдържание на листовката преди да приемате това лекарство.

- Пазете тази листовка. Ако е необходимо я прочетете отново.
- Ако имате някакви последващи въпроси, попитайте вашият лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано на вас. Не го предоставяйте на други хора. То може да им навреди, дори и ако техните симптоми са същите както вашите.
- Ако някой от страничните ефекти се прояви сериозно, или ако забележите някакъв страничен ефект, който не е описан в листовката, моля информирайте за това вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво е Валсартан и за какво се използва
2. Преди да вземете Валсартан
3. Как да приемате Валсартан
4. Възможни странични ефекти
5. Как да съхранявате Валсартан
6. Допълнителна информация

1. КАКВО Е ВАЛСАРКЛЕУС И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Валсартан е лекарство от класа наричан ангиотензин II рецепторни антагонисти. Ангиотензин II е вещество в организма на човека, което предизвиква спазъм на съдовете, и така води до увеличаване на кръвното налягане. Валсартан работи посредством блокиране на ефекта на ангиотензин II. В резултат кръвоносните съдове се разпускат и кръвното налягане се понижава.


Валсартан 80mg и 160mg са използвани за лечение на хипертония.

Валсартан е използван за подобряване на преживяемостта и намаляването на последващи сърдечни проблеми след сърден инфаркт (инфаркт на миокарда).

2. ПРЕДИ ДА ВЗЕМЕТЕ ВАЛСАРКЛЕУС

Не вземайте Валсартан :

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към валсартан (активна съставка), соево масло, фъстъчено масло, или някоя от другите съставки на Валсартан
- ако сте в по-напреднала от 3-месечна бременност, виж раздел бременност и кърмене.
- ако кърмите.



- ако имате сериозни чернодробни заболявания (тежко увредена чернодробна функция, цироза, или холестаза).
- ако страдате от сериозно бъбречно заболяване (креатинов клиърънс < 10 mL/min).
- ако сте подложени на диализа.

Обърнете специално внимание обърнете при приемането на Валсарклес :

- ако имате бъбречно заболяване.
- ако сте с понижен натрий и/или с намален обем (вие вземате високи дози диуретици или имате диария или повръщане) може да имате симптоми като силна жажда, сухота в устта или сънливост.
- ако сте приемали калий - задържащи медикаменти, калиеви добавки или заместители на солта, съдържащи калий или други продукти, които увеличават количеството на калия във вашата кръв (в т.ч. хепарин). Може да се наложи да се проверява нивото на калия в кръвта на определени интервали.
- ако страдате от тежко сърдечно заболяване, различно от сърден инфаркт.
- ако страдате от стесняване на бъбрената артерия.
- ако насърко Ви е бил трансплантиран бъбрец.
- ако страдате от заболяване характеризиращо се с прекалено висока продукция на хормона алдостерон (първичен алдостеронов синдром).
- ако страдате от леко до средно-тежко чернодробно заболяване.

Вие трябва да информирате Вашия лекар ако считате, че сте бременни или може да забременеете. Валсарклес не се препоръчва в ранна бременност, и може да предизвика сериозно увреждане на Вашето бебе след 3 месечна бременност, виж раздел Бременност и кърмене.

Лекарят ще трябва да прецени функционирането на вашите бъбреци, във връзка с лечението Ви с Валсарклес .

Приемане на други медикаменти

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, в случай че приемате или сте приемали насърко каквито и да било други лекарства. Това също важи за лекарства получени без рецепт.

Това особено важи ако приемате:

- други лекарства за високо кръвно налягане особено таблетки за отводняване (диуретици).
- литий (медикаменти за някои психиатрични смущения).
- калиеви добавки и лекарства, които увеличават калиевите нива в кръвта (в. т.ч. лекарства съдържащи хепарин и калий задържащи диуретици). Моля попитайте вашия лекар или фармацевт за информация.
- нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС), определен тип болкоуспокояващи.
- лекарство принадлежащо към класа наричан ACE инхибитори, приемани след сърден инфаркт.

Моля забележете, че горе казаното важи също така и за същите лекарства, ако са приемани преди известно време, или ако трябва да бъдат приемани по-късно. Ако започвате лечение с друг медикамент, моля информирайте вашия лекар, че в момента вземате, Валсарклес .

Приемайте валсарклес с храна и вода

Валсарклес може да бъде приеман с храна и напитка. Изпийте чаша вода, когато приемате продукта.

Деца и юноши под 18 годишна възраст:

Ефектите на Валсарклес върху деца и юноши (по-млади от 18 годишна възраст) не са известни. Следователно Валсарклес не трябва да бъде прилаган при деца и юноши.

Старческа възраст (на 75 годишна възраст или по-възрастни)

Ако сте на възраст 75 години, или повече Вие също можете да приемате Валсарклес.



Нарушена бъбречна и чернодробна функция:

Ако страдате от тежко чернодробно или бъбречно заболяване употребата на Валсарклес не се препоръчва.

Дози по-високи от 80 mg не трябва да се прилагат при пациенти с леки до средно-тежки чернодробни заболявания без холестаза.

Намаляване на дозата не се изиска за онези, които страдат от леко или средно по степен бъбречно заболяване.

Бременност и кърмене

Попитайте вашия лекар за съвет преди да приемете какъвто и да било медикамент. Вие трябва да кажете на вашия лекар, ако сте бременна или може да забременеете.

на. Обикновено, лекарят ще Ви препоръча да приемате друг медикамент вместо Валсарклес, тъй като Валсарклес не се препоръчва в ранна бременност, и може да предизвика сериозна вреда на вашето бебе, в случай че се използва след 3-ти месец на бременността. Вашият лекар е нормално да Ви препоръча да спрете да приемате Валсарклес незабавно след като узнаете, че сте бременна. Не приемайте Валсарклес ако кърмите. Кажете на Вашия лекар, че кърмите.

Шофиране и употреба на машини

Няма извършвани проучвания върху ефектите за повлияване способността да се шофира и използват машини. При някои пациенти Валсарклес може да предизвика странични ефекти (съниливост и умора), които могат да повлияят способността да се шофира и работи на машини.

Важна информация, относно някои от съставките на Валсарклес

Този продукт съдържа лактоза, и ако Ви е било казано от вашия лекар, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него преди да приемете този лекарствен продукт. Валсарклес съдържа соево масло. Ако сте алергични към фъстъчено масло или соя, не приемайте този медицински продукт.

3. КАК ДА ПРИЕМАМЕ ВАЛСАРКЛЕУС

Винаги приемайте Валсарклес точно както Ви е предписан от вашия лекар. В случай, че не сте сигурни как да вземате медикамента, трябва да уточните това с Вашия лекар или фармацевт.

След скорошна сърдечен инфаркт: След сърдечен инфаркт, лечението обикновено започва 12 часа след това, обикновено с ниски дози от 20 mg (половинка от 40 mg таблетка) два пъти на ден. В следващите две седмици дозата се увеличава постепенно до 80 mg два пъти на ден. Максималната доза е 160 mg, два пъти на ден (320 mg дневно). Валсарклес може да бъде даван заедно с друг медикамент за сърдечен инфаркт, и Вашият лекар ще реши кое лечение е подходящо за Вас. Крайната доза зависи от това, което Вие като индивидуален пациент можете да понесете.

Хипертония (отнася се само към / Валсарклес 80 mg и 160 mg): Препоръчаната доза е 80 mg един път дневно. Дозата може да бъде увеличена до 160 mg при тези, които не получават задоволителен контрол върху кръвното си налягане, като е възможно вашият лекар да Ви предпише и допълнително лекарство (в т.ч. диуретик).

Максималният ефект, понижаващ кръвното налягане се получава след 4 седмично лечение.

Ако приемате повече Валсарклес отколкото трябва

Ако сте приели твърде много таблетки, или ако някой друг случайно приеме вашия медикамент, свържете се с вашия лекар, фармацевт или болница.

Симптомите на предозиране могат да бъдат: съниливост, подтиснато съзнание, циркулаторен колапс, и/или шок.



Ако забравите да приемете Валсарклеус

Ако сте забравили да приемете медикамента, Вие трябва да го вземете максимално бързо или пропуснете приема, ако е време за следващия прием. Не приемайте двойна доза, за да коригирате пропуснатата доза. Ако сте забравили да приемете повече дози, или мислите че може да сте пропуснали няколко дози, свържете се с вашия лекар.

Ако спрете да приемате Валсарклеус

Прекратяването на лечението с Валсарклеус може да предизвика влошаване на вашето заболяване. Не спирайте да вземате Вашето лекарство, освен ако Вашият лекар ви казва да направите това. Ако имате допълнителни въпроси, по отношение употребата на този продукт, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ

Валсарклеус както всички медикаменти, може да предизвика странични ефекти, въпреки че те не се проявяват при всички.

Честотата на страничните ефекти, изредени по-долу, е определена с помощта на следната установена практика:

много чести:	повече от 1 пациент от 10
чести:	1 от 10 пациента при 100
нечести:	1 от 10 пациента при 1,000
редки:	1 от 10 пациента при 10,000
много редки:	по-малко от 1 пациент при 10,000
неизвестни:	честотата не може да бъде определена въз основа на наличните данни.

Някои симптоми се нуждаят от незабавно медицинско внимание:

Вие трябва да посетите Вашия лекар незабавно, в случай че почувствате някой от симптомите на ангиоедем, като:

- оток на лице, език или гълтка
- затруднение в прегълъщането
- уртикария (обрив) и затруднения при дишане.

Другите странични ефекти включват:

Общи странични ефекти:

- вирусни инфекции
- понижаване на кръвното налягане и замаяност при изправяне

Необичайни странични ефекти:

- сърдечна недостатъчност
- припадък
- секреция на очите придружено със сърбеж, зачеряване и отичане (конюнктивит)
- чувство за световъртеж
- кашлица
- кървене от носа
- диария, стомашна болка
- болка в гърба
- мускулни схвашания, мускулна болка
- възпаление на ставите (артрит)
- увеличени нива на калий в кръвта
- инфекции на горните дихателни пътища
- болезнено гърло и дискомфорт при прегълъщане
- синуит /възпаление на синусите/
- ниско кръвно налягане ²⁾



- изтощеност
- слабост
- задържане на вода
- тъжно настроение(депресия)
- трудно заспиване
- понижен интерес към полова активност

Редки странични ефекти:

- замайване²⁾
- силна пробождаща или пулсираща болка по протежение на единични нерви
- възпаление на кръвносните съдове
- алергична реакция в т.ч. serumna болест (обрив, отток, болки в ставите и оттекли жлези).
- ангиоедем¹⁾
- обрив и сърбеж.

Много рядки странични ефекти:

- нисък брой тромбоцити съпроводени със симптоми като по-лесно кървене при охлуване, в сравнение с нормалното.
- главоболие²⁾
- разстройства на вкуса
- гадене²⁾
- остра бъбречна недостатъчност, нарушена бъбречна функция, отделяне на малко или липса на урина^{1),2)}
- болки в ставите
- стомашна болка (гастрит, възпаление на стомаха)
- хрема
- тежко кървене
- чернодробни проблеми

¹⁾ докладвано по-често при пациенти след сърдечен инфаркт

²⁾ докладвано по-често при пациенти със сърдечна недостатъчност

Ако някой от тези странични ефекти сериозно Ви обепокоят, или ако забележите какъвто и да е страничен ефект, който да не е посочен в тази листовка, моля кажете това на Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАМЕ ВАЛСАРКЛЕУС

Съхранявайте на място, където не може да бъде достигнато и видяно от деца.

Не използвайте Валсарклус след изтичане на срока, който е посочен на кутията, блистера и бутилката като EXP.

Датата на срока на годност се отнася за последния ден от същия месец.

PVC/PE/PVDC-Al блистери: Не съхранявайте над 30°C. Съхранявайте в оригинална опаковка, с оглед предпазването от светлина и влага.

Полиетиленови банки: съхранявайте в оригинална опаковка, с оглед предпазването от светлина и влага.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят с отходните води или битов отпадък. Попитайте Вашия фармацефт как да унищожите медикаментите, които повече не са Ви необходими. Тези мерки ще спомогнат за предпазването на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ



Какво съдържа Валсарклес

- Активната субстанция е валсартан. Всяка филмирана таблетка съдържа 40 mg валсартан.
Всяка филмирана съдържа 80 mg валсартан.
Всяка филмирана таблетка съдържа 160 mg валсартан.
- Другите съставки са: сърцевина на таблетката: лактозаmonoхидрат, микрокристална целулоза, натриева кроскармелоза, повидон K29-K32, талк, магнезиев стеарат, силициев диоксид безводен, таблетна обвивка: поливинилов алкохол, макрогол 3350, талк, лецитин (съдържа соево масло, E322), титанов диоксид (E171), жълт железен оксид (E172).
Валсарклес 80 mg и 160 mg съдържат също така червен железен окид (E172).

Описание на съдържанието на опаковката на Валсарклес

Валсарклес 40 mg: жълти, овални, двойно-изпъкнали, филмирани таблетки, 9 x 4.5 mm, с делителна черта от едната страна и маркирано "V" на другата.
Валсарклес 80 mg: розови, кръгли, двойно-изпъкнали, филмирани таблетки, 8 mm в диаметър, с делителна черта от двете страни и маркирано "V" на едната страна.
Валсарклес 160 mg: жълти, овални, двойно-изпъкнали, филмирани таблетки, 15 x 6.5 mm, с делителна черта от едната страна и маркирано "V" на другата.

Количество на продукта в опаковка

PVC/PE/PVDC/алуминиев блистер/: 7, 14, 28, 56, 98 и 280 таблетки
Полиетиленова банка (PE): 7, 14, 28, 56, 98 и 280 таблетки

Възможно е не всички размери на опаковките да бъдат предлагани.

Притежател на Разрешението за употреба и Производител:

Nucleus ehf.
Naustanesi, 116 Reykjavik,
Исландия

Производител

Actavis Ltd.
B16 Bulebel Industrial Estate
Zejtun ZTN 08
Малта

Този продукт е разрешен в страните членки на ЕИА под следните наименования:

Исландия
Yzerval

Република Чехия
Yosovaltan 40 mg
Yosovaltan 80 mg
Yosovaltan 160 mg

Полша
Yosovaltan

Словакия
Valsarclues 40 mg
Valsarclues 80 mg



Valsarcleus 160 mg

Тази листовка е била последно одобрена на
Юли 2008

