

Листовка за пациента

FORTUM 1 g powder for solution for injection
ФОРТУМ 1 g прах за инжекционен разтвор
цефтазидим (ceftazidime)

Тази листовка се отнася само за Fortum. Моля, прочетете я внимателно. Запазете я, тъй като може да Ви се наложи да я прочетете отново. Ако искате да знаете повече за Вашето заболяване или лекарство, попитайте Вашия лекар.

Наименование на лекарството
Името на лекарството е Fortum (Фортум).

Какво представлява и какво съдържа Fortum
Fortum е под формата на прах за инжекционен разтвор.
Всеки флакон съдържа:

- 1 g от активното вещество цефтазидим (ceftazidime) под формата на цефтазидим пентахидрат (ceftazidime pentahydrate).
- натриев карбонат, безводен като помощно вещество. Съдържанието на натрий е 52 mg.

Кой произвежда лекарството и притежава разрешение за употребата му в България
Fortum се произвежда от GlaxoSmithKline S.p.A, Via A Fleming 2, Verona 37135, Италия.
Притежател на разрешението за употреба е Glaxo Group Ltd., Greenford road, Greenford, Middlesex UB6 0NN, Великобритания, представяван в България от ГлаксоСмитКлайн ЕООД, София 1408, ул. Димитър Манов, бл.10.

Как действа и за какво се използва лекарството

Активното вещество цефтазидим е антибиотик от групата на цефалоспорините. Цефалоспорините действат бактерицидно, т.е. убиват патогените (микроорганизмите, които причиняват инфекции), като подтискат синтеза на клетъчната им стена. Fortum е активен срещу широк спектър патогени. Използва се за лечение на инфекции, причинени от един патоген или смесени инфекции, включително тежки общи инфекции. С Fortum могат да бъдат лекувани заболявания на дихателната система, ухото, носа, гърлото, отделителната система, червата, корема, жлъчния мехур, костите, ставите, меките тъкани, кожата и обвивките на мозъка (менингит). Fortum се използва и за лечението на инфекции, които могат да се появят след хемодиализа или за предотвратяване на инфекции след някои хирургични операции. Понякога Fortum се прилага в комбинация с други антибиотици за лечение или предотвратяване на инфекции.


Какво трябва да имате предвид преди приложение

Това лекарство е подходящо за повечето хора, но има някои хора, които не трябва да го употребяват. Задайте си следващите въпроси, за да разберете дали Fortum е подходящ за Вас.

- Имали ли сте алергична реакция към Fortum, цефтазидим или някой друг антибиотик?
- Бременна ли сте или се опитвате да забременеете?
- Кърмите ли?
- Имате ли заболяване на бъбреците?
- Приемате ли диуретици като фуросемид?
- Приемате ли друг антибиотик, напр. хлорамфеникол или аминогликозидни антибиотици?
- Предписана ли Ви е диета с ниско съдържание на натрий?

Ако отговорът на някой от въпросите е "да", кажете на Вашия лекар за това преди да започне приложението на лекарството. Ако не сте сигурни, посъветвайте се с Вашия лекар.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА
Листовка - Приложение 2
Към РУ №: 11-2824 / 18.08.081
Одобрено: 18 / 03.06.08



Как се прилага Fortum

В опаковката Fortum е под формата на прах, затова преди да бъде приложено, лекарството трябва да се разтвори. Прилага се интравенозно или интрамускулно от квалифицирано медицинско лице. В някои случаи лекарството може да бъде добавено към банка за капкова инфузия.

Дозировка

При повечето инфекции обичайната доза за възрастни е 1 g цефтазидим три пъти дневно или 2 g цефтазидим два пъти дневно. Дозите могат да бъдат по-ниски или по-високи в зависимост от тежестта и вида на инфекцията, теглото, възрастта и бъбречната функция. Продължителността на лечението зависи от вида на инфекцията.

За предотвратяване на инфекция след хирургична операция се прилага 1 g цефтазидим преди операцията. След операцията може да се приложи втора доза от 1 g.

За бебета и деца дозата се определя в зависимост от телесното тегло.

Деца на възраст над 2 месеца - от 30 mg до 100 mg на килограм телесно тегло дневно, разделени в 2 или 3 отделни приема. При деца с тежка инфекция обичайната дозировка е до 150 mg на килограм телесно тегло (до максимална дневна доза 6 g), разделена в 3 отделни приема.

Новородени и бебета на възраст под 2 месеца - от 25 до 60 mg на килограм телесно тегло дневно, разделени в 2 приема.

За пациенти в напреднала възраст общата дневна доза на цефтазидим не трябва да превишава 3 g, особено при пациенти над 80 годишна възраст.

За пациенти с умерени до тежки бъбречни заболявания дозата на Fortum е по-ниска.

За пациенти с бъбречна недостатъчност на продължителна артериовенозна хемодиализа или високоскоростна хемофилтрация дозата е 1 g дневно, разделена на няколко приема.

За пациенти, на които са назначени хемодиализни курсове, определената доза трябва да се повтаря след всеки период, през който пациентът е на хемодиализа. Това се налага, тъй като част от лекарството може да бъде отстранена от тялото по време на диализата и е необходимо да бъде набавена отново.

Fortum може да бъде прилаган при пациенти на перитонеална диализа и продължителна амбулаторна перитонеална диализа. Може да бъде прилаган интравенозно или да бъде включен в диализната течност (обикновено 125-250 mg цефтазидим на 2 литра диализна течност).

За лечение на белодробни инфекции при пациенти с муковисцидоза и нормална бъбречна функция се прилагат високи дози от 100 mg до 150 mg на килограм телесно тегло на ден (до 9 g дневно при възрастни и 6 g дневно при деца), разделени в три приема. В някои случаи, родител на дете с муковисцидоза или възрастен пациент с муковисцидоза може да бъде специално обучен как да прилага Fortum вкъщи.


Лекарството ще Ви бъде прилагано от квалифицирано медицинско лице. Ако считате, че сте приели по-голямо количество от лекарството или че сте пропуснали доза, уведомете Вашия лекар.

Ако лекарят Ви е обучил как самостоятелно да прилагате Fortum и смятате, че приложеното от Вас количество е прекалено голямо, незабавно уведомете Вашия лекар или се обадете на Бърза помощ. Ако пропуснете да приемете доза, приемете следващата веднага след като си спомните и продължете както преди.

Както всички антибиотици, Fortum трябва да се приема според предписанията на лекуващия лекар, докато курсът на лечение приключи.

Нежелани лекарствени реакции

Наред с желаните, лекарството може да причини и нежелани лекарствени реакции. Fortum не създава проблеми при повечето хора, които го приемат. Но подобно на всяко друго лекарство, при някои пациенти продуктът може да доведе до нежелани реакции.



Някои хора могат да имат алергия към лекарството. Уведомете Вашия лекар незабавно, ако се появят някои от следните редки тежки алергични симптоми:

- Внезапна поява на хрипове и тежест в гърдите
- Подуване на клепачите, лицето или устните
- Подуване на кожата или копривна треска
- Кожен обрив, сърбеж, температура
- Колапс

Консултирайте се с лекуващия лекар възможно най-скоро, ако се появи някоя от следните нежелани реакции:

Нечести

- Болка или възпаление на мястото на инжектиране.
- Главоболие, замаяност, мравучкания по крайниците и лош вкус в устата.
- Гадене или повръщане, болка в стомаха.
- Диария.

Редки

- Гъбично възпаление на лигавицата на устата или влагалището.
- Тежка диария, предизвикана от колит (възпаление на дебелото черво).
- Реакция, при която кожата изглежда като попарена. Ако мислите, че при Вас се проявява тази рядка реакция, консултирайте се с Вашия лекар незабавно, особено ако реакцията се разпространи и засегне други части на тялото, включително устата, очите, влагалището или ануса.

Много редки

- Жълтеница. Информирайте Вашия лекар ако забележите, че кожата или очите Ви пожълтяват.

Fortum може да предизвика промени в нормалните стойности на определени кръвни клетки или други съставки на кръвта, или да доведе до други отклонения в кръвните показатели. Ако си правите изследване на кръвта по някаква причина, уведомете медицинското лице, което взема кръвната проба, че приемате Fortum, тъй като това може да повлияе на резултатите Ви. Ако си правите изследване за захар в урината, Fortum може да предизвика фалшиво положителен резултат.

При приложение на прекалено висока доза от лекарството, по-специално при хора с увредена бъбречна функция, Fortum може да предизвика треперене, гърчове и понякога кома. Ако след приложение на Fortum не се чувствате добре или чувствате необичаен дискомфорт, съобщете за това на Вашия лекар възможно най-бързо.

Как се съхранява лекарството

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Съхранявайте неотворените флакони с Fortum на стайна температура под 25°C.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, на място, защитено от светлина.

Препоръчва се продуктът да бъде приложен веднага след разтваряне.

Ако това не е възможно, да се съхранява при стайна температура под 25°C за не повече от 18 часа или при температура от 2°C до 8°C за не повече от 7 дни.

Да не се използва след датата на изтичане на срока на годност, посочена върху опаковката.

Запомнете!

Това лекарство е единствено за Вас. Само лекар може да Ви го предпише. Никога не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, дори ако симптомите им са същите или подобни на Вашите.

Тази листовка не дава пълна информация за лекарството. Ако имате въпроси или не разбирате нещо, посъветвайте се с Вашия лекар.

Fortum (Фортум) е запазена търговска марка на GlaxoSmithKline Group of companies.

Дата на последна редакция на листовката:

