

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВОТА
Листовка - Приложение 2
Към РУ №: 11-2923 / 04.09.08
Одобрено: 21/29.07.08

Листовка за пациента

Mastu S rectal ointment

Масту S ректална маз

Буфексамак/Бисмутов субгалат/Титанов диоксид/Лидокаинов хидрохлорид
Bufexamac/Bismuth subgallate/Titanium dioxide/Lidocaine hydrochloride

Прочетете внимателно цялата листовка тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.
- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте вашия фармацевт.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт

В тази листовка ще намерите:

1. Какво представлява Масту S ректална маз и за какво се използва
2. Преди да използвате Масту S ректална маз
3. Как да използвате Масту S ректална маз
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Масту S ректална маз
6. Допълнителна информация

Какво представлява Масту S ректална маз и за какво се използва


Фармакотерапевтична група: Вещества за лечение на хемороиди и анални фисури за локално приложение. Локални анестетици. Лидокаин.

Масту S ректална маз съдържа 4 активни вещества: буфексамак, бисмутов субгалат, титанов диоксид и лидокаинов хидрохлорид.

Показания

Масту S се използва при хемороидална болест първа и втора степен, болестно променени външни хемороиди, остри анални фисури, остра и хронична анална екзема, възпалителни процеси в или около ануса и правото черво (проктит).

Преди да използвате Масту S ректална маз



Не прилагайте Масту S, ако сте с:

- Доказана свръхчувствителност към някоя от съставките на този продукт (виж. Състав)
- Специфични кожни заболявания в областта на приложение (сифилис, туберкулоза).

Тъй като при пациенти с история на контактни алергии и atopичен дерматит (наследствено възпалително заболяване на кожата) съществува по-голям риск от поява на алергични реакции, те трябва да използват Масту S само след консултация с лекар.

Какво трябва да знаете, ако сте бременна или кърмите

Няма данни от клинични изследвания за приложението на Масту S при бременни и кърмещи жени. Поради това, трябва да се прецени много внимателно очакваната полза спрямо потенциалните рискове.

Какво трябва да се има предвид при употребата от деца

Няма данни от клиничната практика за приложението на Масту S при деца и юноши.

Предупреждения и предпазни мерки при употреба

Ланолинът може да предизвика локални кожни реакции (напр. контактен дерматит).

При едновременна употреба на Масту S с презерватив е възможно намаляване на устойчивостта на презерватива към скъсване и неговата надеждност.

Лекарствени взаимодействия

До момента не са известни лекарствени взаимодействия с други лекарствени продукти.

Как да използвате Масту S ректална маз

Дозировка и начин на приложение, продължителност на лечението


Дадените по-долу инструкции се прилагат, ако лекарят не ви е предписал друго лечение. Моля спазвайте тези инструкции и/или инструкциите на Вашия лекар, за да бъде лечението с Масту S ефективно и безопасно.

Колко често трябва да използвате Масту S

а) За външна употреба: Ректалната маз се нанася върху засегнатите участъци на ануса и леко се втрива, два пъти дневно. Преди нанасянето на мазта, аналната област се почиства с топла вода и кърпа (без сапун).

б) За локална употреба (в ануса и/или правото черво): Нанасяйте Масту S в правото черво два пъти дневно, по възможност след изхождане по голяма нужда. Използвайте апликатора поставен в опаковката, за да вкарате мазта в правото черво.

Колко време трябва да се използва Масту S



Масту S трябва да се използва докато премине остро дразнене и възпаление. Препоръчва се лечението да продължи още 8-10 дни, за да бъде успешно. Ако е необходимо по продължително лечение, трябва да се използва продукт, който не съдържа локален анестетик.

Ако сте използвали по-голямо количество Масту S, отколкото е необходимо
Винаги прилагайте Масту S така както е описано в „Дозировка и начин на приложение”. Ако не се постигне достатъчно обезболяване, не повишавайте дозата по ваше решение, а се консултирайте с Вашия лекар.

Ако имате допълнителни въпроси относно употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Възможни нежелани реакции

Какви нежелани реакции може да изпитате докато употребявате Масту S и какви мерки трябва да предприемете в случай на появата им

Свръхчувствителност към някоя от съставките на това лекарство. Такива реакции се проявяват обикновено под формата на локално дразнене (зачервяване, парене, сърбеж), което може в редки случаи да обхване и нетретирани директно кожни участъци, като предизвиква кожни отоци, преминаващи впоследствие в мехурчета, които се пукат и обелват на люспици, както и получаване на белези. В редки случаи тези симптоми са силно изразени и могат да обхванат обширни кожни участъци.

Какви мерки трябва да предприемете в случай на поява на нежелани реакции

Ако някоя от изброените в тази листовка нежелани реакции стане сериозна или ако забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля информирайте лекуващия Ви лекар или фармацевт.

Срок на годност

Срокът на годност е отпечатан върху кутията и тубата. Да не се използва след изтичане на срока на годност. Датата на изтичане на срока на годност се отнася за последния ден на отбелязания месец.

Как да съхранявате Масту S ректална маз


Да се съхранява при температура под 25°C.

Да се съхранява на място недостъпно за деца.

Допълнителна информация

Какво съдържа опаковката на Масту S ректална маз

Състав:



Активни вещества:

1 g ректална маз съдържа: 50 mg буфексамак, 50 mg бисмутов субгалат, 50 mg титанов диоксид, 5 mg лидокаинов хидрохлорид.

Помощни вещества:

Изопропил палмитат, течен парафин, полиетилен, сорбитан сесквиолеат, сорбитол, пречистена вода, ланолин.

Данни за опаковката

Оригинална опаковка с апликатор, съдържаща 20 g ректална маз.

Производител и притежател на разрешението за употреба

STADA Arzneimittel AG,

Stadastrasse 2 – 18,

61118 Bad Vilbel,

Германия

Tel.: +49 6101 603-0

Fax: +49 6101 603-259

Дата на последната редакция на листовката:

Ноември 2006

