

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ОДОБРЕНО!
ДАТА 01 - 09.08

**Alvesco 40, 80 and 160 micrograms, pressurised inhalation, solution
(Ciclesonide)**

**Алвеско 40, 80 и 160 микрограма, разтвор под налягане за инхалации
(Циклезонид)**

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка информацията е подредена в следния ред:

1. Какво представлява Алвеско и за какво се използва
2. Преди да приемете Алвеско (Тази точка съдържа важна информация относно Вашата безопасност)
3. Как да приемате Алвеско
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхранение на Алвеско
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА АЛВЕСКО И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Какво представлява Алвеско:

Алвеско представлява бистър и безцветен аерозолен спрей, който да вдишвате в белите си дробове през устата. Това е профилактично лекарство (кортикостероид), което трябва да се приема всеки ден, и което става активно само след като бъде инхалирано в белите Ви дробове.

Активно вещество в това лекарство е циклезонид. (За помощните вещества, вж. точка 6).

За какво се използва Алвеско:

Лекарството се предписва за контрол на персистираща астма при възрастни и юноши (на 12-годишна възраст и повече).

То Ви помага да дишате по-лесно чрез намаляване на признаките на астмата и чрез понижаване вероятността за астматични пристъпи. Ефектът се проявява след определен период от време и по тази причина лекарството трябва да се приема всеки ден, дори, когато се чувствате добре.

Това лекарство не е подходящо за употреба при остро настъпил пристъп на задух. За бързо облекчаване на такъв пристъп използвайте само Вашия инхалатор за бърза бронходилатация.


2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ АЛВЕСКО

Не приемайте Алвеско

ако сте алергични (свръхчувствителни) към циклезонид или към някоя от останалите съставки (вж. точка 6).

Обърнете специално внимание при употребата на Алвеско

- **Преди началото на лечението с това лекарство, моля, информирайте Вашия лекар, ако:**
някога в миналото сте били лекувани или в момента се лекувате от: бедrodна туберкулоза (ТБК), гъбичкови, вирусни или бактериални инфекции.



Ако не сте сигурни, консултирайте се с Вашия лекар. Важно е да е сигурно, че Алвеско е правилното лекарство за Вас.

По време на лечението с Алвеско трябва незабавно да се свържете с Вашия лекар, ако:

- дишането силно се затрудни и признаците Ви, кашлицата, задухът, свиренето в гърдите, стягането в гърдите, засилените белодробни шумове (хрипове) или други признания, показващи стеснение на бронхите, се влошат

(Трябва да използвате Вашия инхалатор за бърза бронходилатация, който обикновено води бързо до подобрене на състоянието.)

- се събуждате нощем от признаците.
- не получавате подобрене след употребата на Вашия инхалатор за бърза бронходилатация.

Вашият лекар ще прецени какво лечение Ви е необходимо в бъдеще.

Специфични групи пациенти

Пациентите с тежка астма имат рисък за остри астматични пристъпи. При такива пациенти лекарят ще провежда редовно подробни контролни прегледи, включващи и функционално изследване на дишането.

Пациенти, които вече приемат кортикоид като таблетки:

Алвеско може да се използва като заместител на Вашите таблетки, или за да се постигне намаляване на броя на таблетките, които трябва да приемате. Моля следвайте внимателно съветите на Вашия лекар.

- Започва се след около седмица от началото на инхалациите с Алвеско.
- Броят на таблетките, които приемате, ще бъде внимателно намален в продължение на определен период от време.
- По време на този период е възможно понякога да почувствате общо неразположение.
- Въпреки това, е важно да продължите както с инхалациите с Алвеско, така и с бавното намаляване на броя на таблетките, които приемате.
- Ако се появят сериозни признаци като гадене (чувство за болест), повръщане, диария или повищена температура, свържете се с Вашия лекар.
- При този процес е възможно понякога да се проявят някои малки алергии като ринит (възпаление на носа) или екзема (сърбеж и зачеряване на кожата).
- Ако сте преминали на лечение с таблетки, за известно време при Вас ще има рисък от намалена дейност на надбъбреците, което се дължи на таблетките кортикоид, които приемате. Признанията на намалена дейност на надбъбреците (напр. замаяност, припадане, гадене, загуба на апетит, промени в настроението, намаляване на окосмяването по тялото, невъзможност за справяне със стреса, слабост, главоболие, проблеми с паметта, алергии, нетипични желания за храна и нарушена регулация на кръвната захар) могат да продължат известно време.
- Възможно е да се наложи да се консултирате със специалист, който да определи точно колко е потисната дейността на надбъбреците.
- Вашият лекар редовно ще следи дейността на надбъбреците Ви.
- В периоди на стрес (напр. ако Ви предстои хирургична операция, влошаване на пристъпите на астмата) е възможно да имате нужда от повече таблетки кортикоид. В такива случаи трябва да носите със себе си предупредителна карта за стероидно лечение и това да е упоменато/посочено в нея.

Пациенти с чернодробно или бъбречно заболяване

Ако страдате от тежко чернодробно заболяване, Вашият лекар ще Ви преглежда по- внимателно за евентуални нежелани лекарствени реакции, дължащи се на нарушение на нормалната продукция на стероиди.

Деца под 12-годишна възраст:

Това лекарство не се препоръчва за употреба при деца под 12-годишна възраст, поради липса на информация за възможни нежелани лекарствени реакции.

Прием на други лекарства

Моля, преди да използвате Алвеско, информирайте Вашия лекар, ако се съблъсквате със гъбичкови или вирусни инфекции с лекарства, съдържащи:



- кетоконазол,
- итраконазол,
- ритонавир,
- нелфинавир.

Те могат да засилят ефекта на Алвеско и така не могат напълно да се изключат нежелани лекарствени реакции.

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или нас скоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпусканни без рецепт.

Прием на това лекарство с храни и напитки

Няма взаимодействие на Алвеско с храни и напитки.

Бременност и кърмене

Информирайте Вашия лекар, ако сте бременна, искате да забременеете или кърмите.

- Понеже няма достатъчно информация за ефектите на Алвеско при бременни жени, Вашият лекар ще обсъди с Вас рисковете и ползите от приложението на Алвеско.
- Циклезонид (активната съставка на Алвеско) може да се приема по време на бременност само, ако очакваните ползи за майката оправдават възможните рискове за развиващото се бебе. Ако Вашият лекар прецени, че можете да продължите да приемате Алвеско, трябва да се използва възможно най-ниската доза циклезонид за поддържане на контрола върху астмата
- При деца на майки, които са приемали кортикоステроиди по време на бременността, следва да се следи внимателно надбъбречната дейност.
- Информирайте Вашия лекар, ако искате да използвате Алвеско докато кърмите.
- Не е известно дали инхалаторният циклезонид преминава в кърмата при хора.
- По тази причина предписането на Алвеско на жени, които кърмят, трябва да става само, ако след внимателното обмисляне очакваната полза за майката е по-голяма от възможния риск за детето.

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини

Алвеско и съставките му не повлияват или повлияват пренебрежимо способността за шофиране и работа с машини.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ АЛВЕСКО

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

- Ако сте започнали току-що да приемате това лекарство вместо или заедно с таблетки кортикоสเตроид, вижте точка 2 *Пациенти, които вече приемат кортикоสเตроид като таблетки.*

Какво количество Алвеско трябва да се приема всеки ден?

Вашият лекар трябва да Ви е казал какво количество от лекарството трябва да приемате всеки ден. Това ще зависи от вашите индивидуални нужди.

- Препоръчваната доза Алвеско е 160 микрограма веднъж дневно, което при повечето пациенти осигурява контрол на астмата.
- При някои пациенти намалена доза от 80 микрограма веднъж дневно може да е достатъчна за поддържане на ефективен контрол на астмата.
- При пациенти, които имат тежко влошаване на астматичните симптоми, може да се наложи увеличаване на дозата на Алвеско за кратък период от време. Дозата може да бъде увеличена до



640 микрограма на ден, доставени като 320 микрограма два пъти дневно, но няма данни, потвърждаващи наличието на допълнителен терапевтичен ефект след 3 месеца прилагане на тези по-високи дози.

Ако е необходимо, Вашият лекар може също да Ви предпише и таблетки кортикостероид и/или антибиотик (в случай на инфекция).

- Вашият лекар ще коригира дозата Ви до минималната, необходима за контрол на астмата.
- Трябва да започнете да усещате подобрене на симптомите (хрипове, стягане в гърдите и кашлица) в рамките на 24 часа.

Кога трябва да използвам мой инхалатор Алвеско?

При повечето случаи или сутрин, или вечер – като едно или две впръсквания_веднъж дневно. Следвайте много внимателно инструкциите на Вашия лекар. Важно е да приемате Алвеско всеки ден, дори когато се чувствате по-добре.

Ако забележите, че е необходимо да използвате Вашия инхалатор за бърза бронходилатация по-често от 2-3 пъти на седмица, трябва да се свържете с Вашия лекар и той да преразгледа дозировката на лекарството Ви.

Как да използвам мой инхалатор Алвеско?

Важно е в началото лекарят, медицинската сестра или фармацевтът да Ви покажат как да използвате Вашия инхалатор Алвеско. Добрата техника на приложение ще осигури до белите Ви дробове да достига правилното количество. Моля използвайте инструкциите в настоящата листовка като помагало.

Ако искате, първите няколко пъти можете да се упражнявате пред огледало, докато добиете увереност, че използвате правилно Вашия инхалатор Алвеско. Внимавайте лекарството да не излиза отгоре или отстрани от устата Ви.

Ако инхалаторът Ви е нов или не е бил използван в продължение на една седмица или повече, трябва да се провери преди употреба. Махнете капачето на мундшрука и натиснете металния флакон три пъти надолу в инхалатора така, че да се отделят три пръскания във въздуха настрани от Вас.

Не е необходимо преди употреба да разклащате Вашия инхалатор Алвеско. Лекарството от самото начало е под формата на много прецизен разтвор, така че да Ви се осигури правилната доза с всяко впръскване.

По време на инхалация можете да седите или да сте прави.

Следвайте внимателно тези инструкции и се ръководете от картинките.



1. Махнете капачето от мундшрука и проверете дали мундшукът е чист и сух, както отвътре, така и отвън.



2. Дръжте инхалатора обрнат надолу (дъното на металния флакон да е нагоре), като показалецът е на дъното на металния флакон, а палецът – под мундшрута.
3. Издишайте колкото Ви е удобно. Моля избягвайте да дишате през инхалатора.



4. Поставете мундшрута в устата си и го обхванете **плътно** с устни.
5. Веднага, щом започнете да вдишвате през устата, с показалеца натиснете дъното на инхалатора така, че да се отдели едно впърскване от лекарството, докато още вдишвате бавно и дълбоко. Моля, внимавайте впърсканото лекарство да не излиза отгоре или отстрани от устата Ви.



6. Задръжте дишането си, извадете инхалатора от устата си и махнете пръста си от дъното на инхалатора. Задръжте дишането си за около 10 секунди или колкото Ви е удобно. Бавно издишайте през устата. Избягвайте да дишате в инхалатора.

Важно е да не бързате при изпълнение на стъпки 3 до 6.



7. Ако сте инструктирани да приемете още едно впърскване, изчакайте около половина минута и повторете стъпки 3 до 6.



8. След употреба винаги поставяйте капачето на мундшука, за да го предпазите от замърсяване. При поставянето го притиснете силно, докато щракне на мястото си.



9. С оглед на хигиената

- моля почиствайте редовно мундшука със суха кърпа, както отвън, така и отвътре.
- като използвате сухо, нагънато парче плат, избършете предната част на малкия отвор, от където излиза лекарството.
- не използвайте вода или други течности.

Правилната техника осигурява постъпването на правилното количество Алвеско в белите Ви дробове при всяко използване на инхалатора. Вашият лекар ще проверява редовно техниката Ви на инхалиране, за да се осигури лечението Ви да постигне най-добър ефект.

Когато металната опаковка е напълно празна, Вие няма да усещате или чувате излизане на задвижващия газ.

Ако след употреба на инхалатора Алвеско почувствате задух или стягане в гърдите:

- не приемайте повече впръсквания.
- използвайте Вашия инхалатор за бърза бронходилатация, за да подпомогнете дишането си.
- свържете се незабавно с Вашия лекар.

Ако се затруднявате да използвате инхалатора, Вашият лекар може да Ви препоръча да използвате разпръскащо устройство. Разпръскащо устройство, което е подходящо за инхалатора Алвеско, се нарича AeroChamber Plus™. Ако използвате устройството AeroChamber Plus™, моля следвайте дадените за него инструкции. Вашият лекар или фармацевт ще са в състояние да Ви дадат съвет за това устройство.

Ако сте приели повече от необходимата доза Алвеско

Няма нужда от специфично лечение, ако сте използвали повече Алвеско, но трябва да предупредите Вашия лекар. Ако високи дози се прилагат за продължително време, не може да се изключи потискане на надбъречната дейност в някаква степен и може да се наложи контролиране на надбъречната дейност.

Ако сте пропуснали да приемете Алвеско

Ако сте пропуснали да приемете Алвеско, просто приемете следващата обичайна доза, когато ѝ е времето. Не вземайте двоен брой впръсквания, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако спрете приема на Алвеско

Дори ако се чувствате по-добре, не трябва да спирате да използвате инхалатора Алвеско.

Трябва незабавно да уведомите Вашия лекар, ако спрете да използвате това лекарство.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Алвеско може да предизвика нежелани реакции, независимо че не всеки ги получава.



Обикновено нежеланите лекарствени реакции, наблюдавани при употребата на Алвеско, са леки. В повечето случаи можете да продължите лечението. Нежелани лекарствени реакции, които може да получите, са:

Много редки нежелани реакции (при по-малко от 1 на 10 000 лекувани пациенти):

Реакции на свръхчувствителност от бърз или забавен тип като оток на устните, езика и гърлото (ангиоедема). Пациентите, които получат тези симптоми, трябва да спрат да използват лекарството и незабавно да потърсят медицинска помощ.

Нечести нежелани реакции (при по-малко от 1 на 100 лекувани пациенти):

- дрезгавост, кашлица след инхалиране, засилване на хриповете след инхалиране
- лош вкус, парене, възпаление, раздразване, сухота в устата или гърлото
- кожен обрив и/или екзема, която води до зачервяване и сърбеж.

Алвеско може да засегне нормалната продукция на кортикоステроиди в тялото Ви. Това обикновено се наблюдава при пациенти, приемащи високи дози в продължение на дълго време. Тези редки нежелани реакции могат да включват:

- намалена скорост на растежа при юноши
- изъняване на костите
- помътняване на лещите на очите (катаракта), водещо до замъглено зрение
- загуба на зрение поради неестествено високо налягане в окото (глаукома)
- лунообразно лице, наддаване на тегло в горната част на тялото и изъняване на ръцете и краката (Кушингайдни белези или синдром на Кушинг).

Ръстът на юношите, които приемат лечение в продължение на дълго време, трябва да се проверява редовно от лекаря им. Ако скоростта на растежа е забавена, Вашият лекар ще коригира лечението Ви, ако е възможно, с най-ниската доза, при която се поддържа ефективен контрол на астмата.

Таблетките кортикостероид могат да доведат до повече нежелани реакции в сравнение с кортикоидните инхалатори като Алвеско. Ако сте приемали стероидни таблетки преди или по време на употребата на Алвеско, рисъкът за нежелани реакции от таблетките може да се запази за известно време. Периодичният контрол от страна на Вашия лекар ще гарантира, че приемате правилната за Вас доза Алвеско. Периодичният контрол също така ще разкрие рано евентуални нежелани реакции и ще намалят шанса те да се влошат.

Моля запомнете:

Очакваните ползи от Вашето лекарство обикновено са по-големи от рисковете за поява на някоя нежелана лекарствена реакция.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА АЛВЕСКО

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Опаковката съдържа течност под налягане. Да не се съхранява над 50°C.

Опаковката не трябва да бъде пробивана, чупена или изгаряна, дори ако изглежда празна.

Подобно на повечето лекарства за инхалиране в опаковки под налягане, терапевтичният ефект на този лекарствен продукт може да намалее, ако опаковката е студена. Въпреки това Алвеско отделя една и съща доза в интервала от минус 10°C до плюс 40°C.

Не използвайте Вашия инхалатор след срока на годност, отбелаян върху етикета и картонената опаковка след "Годен до:". Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.



Ако Вашият лекар реши да преустанови лечението или ако инхалаторът е празен, върнете инхалатора на Вашия фармацевт за безопасно изхвърляне. Това е важно, тъй като е възможно следи от лекарството да останат в контейнера, дори ако той Ви изглежда празен.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Алвеско

- Активната съставка е циклезонид. При всяко натискане се отделя едно дозирано впръскване (излизащата от мундшука доза), съдържащо 40, 80 или 160 микрограма циклезонид.
- Останалите съставки са етанол, безводен и пропелант (HFA-134a Норфлуран)

Как изглежда Алвеско и какво съдържа опаковката

Алвеско представлява бистра безцветна течност в алуминиева опаковка под налягане, която освобождава през мундшука точно премерена доза циклезонид под формата на спрей.

Видове опаковки:

Инхалатор с 30 дозирани впръсквания.

Инхалатор с 60 дозирани впръсквания.

Инхалатор с 120 дозирани впръсквания.

Всяка големина на опаковката съдържа достатъчно количество за 30, 60 или 120 дозирани впръсквания. В зависимост от броя дозирани впръсквания/ден, препоръчан Ви от Вашия лекар:

- инхалаторът с 30 дозирани впръсквания съдържа достатъчно лекарство за две до четири седмици.
- инхалаторът с 60 дозирани впръсквания съдържа достатъчно лекарство за един до два месеца.
- инхалаторът с 120 дозирани впръсквания съдържа достатъчно лекарство за два до четири месеца.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба във всяка страна.

Притежател на разрешението за употреба

Nycomed GmbH

Byk-Gulden-Str 2

D-78467 Konstanz, Германия

Производител

Nycomed GmbH

Byk-Gulden-Str 2

D-78467 Konstanz, Германия

Plant: Robert-Bosch-Str. 8, D-78224 Singen, Германия

Име на продукта в референтната страна

United Kingdom	UK/H/0699/001	Alvesco 40/80/160 Inhaler
----------------	---------------	---------------------------

Име на продукта в засегнатите страни

Austria	UK/H/0699/001	Alvesco 40/80/160 Mikrogramm Dosieraerosol
Belgium	UK/H/0699/001	Alvesco 40/80/160 microgram, aërosol, oplossing
Bulgaria	UK/H/0699/001	Алвеско 40, 80 и 160 микрограма, разтвор под налягане за инхалации
Cyprus	UK/H/0699/001	Alvesco 40/80/160 micrograms Inhaler
Denmark	UK/H/0699/001	Alvesco



Estonia	UK/H/0699/001	Alvesco 40/80/160 micrograms, pressurised inhalation, solution
Finland	UK/H/0699/001	Alvesco 40/80/160 mikrog/annos inhalaatiosumute, liuos
France	UK/H/0699/001	Alvesco 40/80/160 microgrammes, dose solution pour inhalation en flacon pressurisé
Germany	UK/H/0699/001	Alvesco 40/80/160 Mikrogramm Druckgasinhalation, Lösung
Hungary	UK/H/0699/001	Alvesco 40/80/160 mikrogramm, pressurised inhalation solution
Iceland	UK/H/0699/001	Alvesco 40/80/160 innúdalyf
Ireland	UK/H/0699/001	Alvesco 40/80/160 micrograms pressurised inhalation solution
Italy	UK/H/0699/001	Alvesco
Latvia	UK/H/0699/001	Alvesco 40/80/160 inhalators
Lithuania	UK/H/0699/001	Alvesco 40/80/160 microgramu suslegtas inhaliacinis tirpalas
Luxembourg	UK/H/0699/001	Alvesco 40/80/160 Aérosol doseur
Malta	UK/H/0699/001	Alvesco 40/80/160 Inhaler
Netherlands	UK/H/0699/001	Alvesco 40/80/160 Inhalator
Norway	UK/H/0699/001	Alvesco 40/80/160 micrograms/dose inhalasjonsaerosol, oppløsing
Poland	UK/H/0699/001	Alvesco 40/80/160 micrograms pressurised inhalation, solution
Portugal	UK/H/0699/001	Alvesco 40/80/160 Inalador
Slovak Republic	UK/H/0699/001	Alvesco 40/80/160 Inhalátor
Slovenia	UK/H/0699/001	Alvesco 40/80/160 µg inhalacijska raztopina pod tlakom
Spain	UK/H/0699/001	Alvesco 40/80/160 mcg solución para inhalación en envase a presión
Sweden	UK/H/0699/001	Alvesco 40/80/160 microgram/dos inhalationsspray, lösning



ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

ОДОБРЕНО!
ДАТА 01.09.08

Картонена опаковка – Alvesco (40 микрограма активно вещество в дозова единица)

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Алвеско 40 микрограма, разтвор под налягане за инхалации
(Циклезонид)

Alvesco 40 micrograms, pressurised inhalation, solution
(Ciclesonide)

2. ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО/ИТЕ ВЕЩЕСТВО/А

1 дозирано впръскване (доставена доза от мундшрука) съдържа 40 микрограма циклезонид.

3. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Помощни вещества:

Норфлуран (HFA-134a); Етанол, безводен.

4. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Разтвор под налягане за инхалации

30 дозирани впръсквания

[REDACTED]

5. НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ/ИЩА НА ВЪВЕЖДАНЕ

Само за инхалаторно приложение.

6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7. ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Внимание: Контейнер под налягане. Да не се пробива, чупи или изгаря дори, когато е напълно празен. Да не се излага на температура над 50°C.

8. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да не се излага на температура над 50°C.



10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

Да не се пробива, чупи или изгаря дори, когато е напълно празен.

11. ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Притежател на разрешението за употреба:
Nycomed GmbH
D-78467 Konstanz, Германия

12. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Регистрационен №

13. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида №

14. НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

По лекарско предписание.

15. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Преди употреба прочетете листовката.

16. ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Alvesco 40

17. Друга информация

Alvesco е запазена търговска марка на Nycomed GmbH.



МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ МАЛКИТЕ ЕДНОЧРЕДНИ ОПАКОВКИ

ИАЛ

ЕДНОЧРЕДНО!

ДАТА

Контейнер (Етикет на металния флакон) – Alvesco (40 микрограма активно вещество в дозова единица)

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ И ПЪТИЩА НА ВЪВЕЖДАНЕ

Алвеско 40 микрограма, разтвор под налягане за инхалации
(Циклезонид)

2. НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Само за инхалаторно приложение.

3. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

4. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида №

5. СЪДЪРЖАНИЕ КАТО МАСА, ОБЕМ ИЛИ ЕДИНИЦИ

30 дозирани впръсквания



6. ДРУГО

1 дозирано впръскване (доставена доза от мундшука) съдържа 40 микрограма циклезонид.
Преди употреба прочетете листовката.

Внимание: Контейнер под налягане. Да не се пробива, чупи или изгаря дори, когато е напълно празен. Да не се излага на температура над 50°C.

