

# Листовка: Информация за потребителя

## АЛЕРГЕНИ ОТ ИНДУСТРИАЛНИ ПРАХОВЕ ЗА ДИАГНОСТИКА (ALLERGENS FROM INDUSTRIAL DUST FOR DIAGNOSIS)

Уважаеми пациенти,

Прочетете внимателно цялата листовка тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Ако имате никакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекуващ лекар.

### ИМЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПОДГРУПАТА\*

- E 19. Дървопреработвателен прах 1:50
- E 20. Мелничарски прах 1:20
- E 21. Библиотечен прах 1:20
- E 23. Тютюн 1:20
- E 25. Книговезки прах 1:20

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към РУ №:	11-2928, 04.09.08
Одобрено: 6/30.07.2008	

### ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Инжекционен разтвор за интрафермално приложение, разлят по 5 ml във флакони.

#### 1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ АЛЕРГЕНИТЕ ОТ ИНДУСТРИАЛНИ ПРАХОВЕ ЗА ДИАГНОСТИКА И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВАТ

Алергените от индустриски прахове за диагностика представляват водно-солеви протеинови екстракти от различни индустриски прахове. Тяхното действие се основава на специфичното взаимодействие между приложения алерген и фиксираните върху кожните мастоцити хомологни IgE антитела, вследствие на което настъпва дегранулация на мастоцитите с отделяне на медиатори, напр. хистамин, и развитие на алергична реакция от I тип, проявяваща се с развитието на папула и еритема.

Този лекарствен продукт се използва само за диагностика на IgE медирирана алергия към индустриски прахове.

#### 2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ АЛЕРГЕНИТЕ ЗА ДИАГНОСТИКА СЕ СЪОБРАЗЕТЕ СЪС СЛЕДНОТО:

##### • ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОЖНО-АЛЕРГИЧНИ ПРОБИ С АЛЕРГЕНИ

###### Локални противопоказания

- Остри и хронични екземи.
- Вторични възпалителни или дегенеративни изменения на кожата.
- Усилен дермографизъм, генерализирана уртикария.

\* Алергените продукти от индустриски прахове се предлагат в диагностична концентрация, която представлява разреждане на обемна част от основния разтвор на алергения екстракт с определен брой обемни части на разреждащ разтвор на Соса I, предизвикваща у сенсибилизиирани към съответния алерген индивиди появата на положителна кожно-алергична реакция съизмерима с тази, предизвикана от прилагането на хистаминов стандарт -0,1 mg хистамин хидрохлорид/ml т. e. притежава обща алергенна активност 1000 биологични единици (БУ/ml).



- Нарушения на кръвоснабдяването на кожата.

#### **Общи противопоказания**

- Реакция от страна на шоковия орган, преди всичко от страна на дихателната система, конюнктивата и по-рядко от страната на стомашно-чревния тракт, паренхимните органи и други системи.
- Тежки форми на белодробен емфизем, кардиална астма, стари фибропродуктивни форми на белодробна туберкулоза, активни или съмнително активни туберкулозни огнища.
- Тежка коронарна склероза, прекаран инфаркт на миокарда, сърдечна декомпенсация.
- Тежка тиреотоксикоза, декомпенсиран и склонен към ацидоза захарен диабет.
- Бъбречна недостатъчност, прекарани възпалителни заболявания на паренхимните органи в срок 6-12 месеца.
- Злокачествени заболявания
- Бременност.

- **СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА**

Алергените се прилагат само от лице с медицинско образование и специална алергологична подготовка.

Алергените от индустриски прахове са предназначени само за интрадермални кожно-алерични преби и не бива да се използува за кожно-алергични преби чрез prick тест.

Кожно-алергични преби с алергени не се правят рутинно на деца под 3 годишна възраст.

Пациентите трябва да са инструктирани да не се чешат на мястото на теста.

Алергенните продукти на различни фирми не са взаимозаменими

- **ПРИЕМ НА ДРУГИ ЛЕКАРСТВА**

Моля информирайте Вашия лекар, ако приемате или насконо сте приемали антихистаминови или глюкокортикоидни лекарства. Кожно-алергичните преби с алергени се извършват не по-малко от 5-7 дни след спиране на лечението с тези продукти.

- **УПОТРЕБА НА АЛЕРГЕНТЕ ОТ БАКТЕРИИ ЗА ДИАГНОСТИКА С ХРАНИ И НАПИТКИ**

Употребата на каквите и да било храни и напитки не повлиява извършването на кожно-алергични преби с алергени.

- **БРЕМЕННОСТ И КЪРМЕНЕ**

По време на бременност не се провежда рутинна, специфична диагностика на алергичните заболявания.

Няма опасност от извършването на интрадермални кожно-алергични преби по време на кърмене.

- **ШОФИРАНЕ И РАБОТА С МАШИНИ**

Извършването на кожно-алергични преби с алергени чрез интрадермален тест не оказва въздействие върху способността за шофиране и работа с машини.



### **3. КАК СЕ ИЗПОЛЗВАТ АЛЕРГЕНИТЕ ЗА ДИАГНОСТИКА**

- **ДОЗИРОВКА**  
по 0,05 ml
- **НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ**

#### **- Техника на изпитването чрез интрадермален кожно-алергичен тест**

Интрадермалният кожно-алергичен тест се извършва на воларната (вътрешната) повърхност на предмишница. За извършването на теста, кожата не трябва предварително да бъде третирана. След почистването на кожата със спирт се изчаква най-малко 2 минути за нормализиране на местното кръвообращение преди началото на теста.

От флакона със стерилна игла и спринцовка от 1 ml се изтегля 0,1 ml от алергена. Внимателно се отстранява проникналият въздух в спринцовката. С така подгответената спринцовка се въвежда строго вътрекожно 0,05 ml от алергена, вследствие на което се получава добре оформено кабарче.

Успоредно с алергените за диагностика задължително се правят и две контроли:

- **Отрицателна контрола** - разтвор на Соса (разреждащия разтвор);
- **Положителна контрола** - хистамин хидрохлорид 0,1 mg/ml в разтвор на Соса.

Разстоянието между две кожни преби не трябва да бъде по-малко от 3-3,5 см, за да се избегне смесването на получените кожни реакции.

За всеки алерген за диагностика и всяка от контролите се използува отделна спринцовка и игла.

След завършване на теста спринцовката с останалото количество от алергена в нея се изхвърля.

Отчитането на реакциите, получени с интрадермалния кожно-алергичен тест се извършва след 15 - 20 мин. по размера на папулата и еритемата, предварително очертани с химикалка.

Това става като се измерва най-големия диаметър на папулата /A/ и перпендикулярния на него /Б/. Средният диаметър на папулата /Дп/ се определя по формулата:

$$Дп = \frac{A + B}{2}$$

След това по същия начин се определя и средният диаметър на еритемата (Де).

Резултатът от кожно-алергичната проба представлява дроб с числител средният диаметър на папулата (Дп) в mm и знаменател - средният диаметър на еритемата (Де) в mm.

За положителна се приема всяка реакция със среден диаметър на папулата и еритемата над 7/7 mm.

- **ПРЕДОЗИРАНЕ**

При предозиране на алергенните продукти по време или непосредствено след манипулацията може да се получат местни или общи алергични реакции.



#### **4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ**

Както всички лекарства, алергените от индустриални прахове за диагностика могат да предизвикат нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

По време или непосредствено след извършването на кожно-алергичните тестове с алергени при силно чувствителни пациенти може да се развие абнормна положителна кожно-алергична реакция, проявяваща се с болка, зачервяване на мястото на теста, отпадналост, а в отделни случаи - засилване или зачестяване на проявите на алергичното заболяване (задух, хрема и др.). Много рядко вследствие на кожно-алергичните тестове с алергени може да се развие анафилактичен шок (цианоза; слаб, ускорен или бавен пулс; силно понижаване на кръвното налягане; загуба на съзнание).

При настъпване на нежелана реакция трябва да се реагира незабавно съгласно процедурите за третиране на нежелани алергични реакции:

##### ***При анафилактичен шок:***

- Избръсва се остатъкът от алергена (при изпитване чрез убождане).
- Поставя се стегната превързка (турникет).
- Болният се поставя в легнало положение.
- Инжектира се Epinephrine (Adrenalin) 0,1% подкожно. Дозата варира според теглото на индивида от 0,3 до 0,5 ml. С 0,1 - 0,2 ml се инфильтрира около и под мястото на въвеждане на алергена. Останалото количество се инжектира подкожно на другата ръка
- В случай на много тежък или бързо развиващ се шок 0,3 - 0,5 ml Epinephrine (Adrenalin) 0,1% се инжектира i.m. или i.v. При венозно приложение дозата е 0,3 ml (предварително разреден до 1:10000). Въвежда се много бавно (за 15-20 мин. по възможност с перфузор). Адреналинът (една ампула в 500 ml физиологичен разтвор) може да се приложи и капково със скорост 1 ml/мин.

При деца Epinephrine (Adrenalin) 0,1% се дозира по 0,01 ml на кг телесно тегло, но единократната доза не трябва да надвишава 0,3 ml. Инжектира се подкожно най-малко на две места.

В зависимост от общото състояние и кръвното налягане 0,3 - 0,5 ml Epinephrine (Adrenalin) 0,1% се поставя подкожно през 15-30 мин.

- Успоредно се прави венозно Methylprednisolon 1 - 2 mg/kg (80 -120 mg). Непосредствено след това се влива още толкова в 500 ml разтвор на глюкоза (5 g/l) или натриев хлорид (9 g/l). Вливането продължава до стабилизиране на кръвното налягане и изчезване на всички симптоми.
- При възможност се дава кислород с маска или катетър.
- Поддържа се проходимостта на дихателните пътища.

При първа възможност болният се транспортира до отделение за интензивно лечение.

##### ***При изразени системни реакции (бронхоспазъм) се назначават:***

- Антихистаминови препарати парентерално или перорално.
- Кортикоステроиди парентерално (i.m. или i.v.) - 1 mg/kg или перорално.
- Инхалаторни селективни бета-агонисти.
- Ксантини парентерално (i.v.). След това перорално (при бронхоспазъм).



**При силни локални алергични реакции:**

- Поставя се стегната превръзка (турникет).
- Намазване на кожата с антихистаминови или кортикоステроидни унгвенти.
- Перорално назначаване на един или два антихистаминови препарата за 2-3 дни.

При поява на нежелани реакции съобщете в Бул Био - НЦЗПБ ЕООД,  
София 1504, бул. "Янко Сакъзов" № 26, тел. 946 07 87; 846 81 55.

**5. КАК СЕ СЪХРАНЯВАТ АЛЕРГЕННИТЕ ОТ БАКТЕРИИ ЗА ДИАГНОСТИКА**

Съхранявайте на място, недостъпно за деца!

**СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ**

Алергените за диагностика съхраняват на тъмно в хладилник при температура от 2 до 8 °C.

Да не се допуска замръзване на алергените!

Замръзвалите алергени са негодни за употреба!

Алергените от индустриални прахове за диагностика са годни 1 година от датата на първото пробождане на флакона в рамките на посочения срок на годност от 2 години

Да не се използват след датата на която изтича срокът на годност, посочен върху етикета на първичната опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден на посочения месец.

В края на работния ден неизползвания продукт и отпадъчните материали при извършване на изпитванията трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

**6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

Алергените от индустриални прахове за диагностика са инжекционни разтвори за интрадермално приложение, разлят по 5 ml във флакони

Те имат следния **СЪСТАВ**:

***Активно вещество***

- Една доза (0,05 ml) Е 19. **Дървопреработвателен прах** съдържа:  
1 обемна част от основния разтвор на алергения екстракт от **дървопреработвателен прах** и 49 обемни части разреждащ разтвор на Соса I.
- Една доза (0,05 ml) Е 20. **Мелничарски прах** съдържа:  
1 обемна част от основния разтвор на алергения екстракт от **мелничарски прах** и 19 обемни части разреждащ разтвор на Соса I.
- Една доза (0,05 ml) Е 21. **Библиотечен прах** съдържа:  
1 обемна част от основния разтвор на алергения екстракт от **библиотечен прах** в 19 обемни части разреждащ разтвор на Соса I.
- Една доза (0,05 ml) Е 23. **Тютюн** съдържа:  
1 обемна част от основния разтвор на алергения екстракт от **тютюн** и 19 обемни части разреждащ разтвор на Соса I.



- Една доза (0,05 ml) Е 25. Книговезки прах съдържа:

1 обемна част от основния разтвор на алергенния екстракт от *книговезки прах* и 19 обемни части разреждащ разтвор на Соса I.

**Помощи вещества**

Всички алергени продукти от група "Алергени от индустритални прахове за диагностика" съдържат в доза 0,05 ml:

<i>Натриев хлорид</i>	250,00 µg
<i>Двунатриев фосфат додекахидрат</i>	71,50 µg
<i>Калиев дихидрогенфосфат</i>	17,50 µg
<i>Фенол</i>	200,00 µg
<i>Формалдехид</i>	10,00 µg
<i>Човешки серумен албумин</i>	10,00 µg
<i>Вода за инжекции</i>	до 0,05 ml

Алергените са разляти по 5 ml във флакони от стъкло. Флаконите са затворени с каучукови тапи и обкатени с алуминиеви капачки. Флаконите с алергенните продукти за диагностика са облепени с етикети с червен цвят, носещи обозначения: според изискванията относно данните върху опаковките на лекарствените продукти съгласно Наредба 38/13. 09. 2007 г.

**ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА И ПРОИЗВОДИТЕЛ**

Бул Био - НЦЗПБ ЕООД  
София 1504, бул. "Я. Сакъзов" № 26, България  
тел. 944 61 91            факс. 943 30 75

*Дата на последното одобрение на листовката - 06 2008 г.*

