

Листовка за пациента

ZOVIRAX tablets 200 mg
ЗОВИРАКС таблетки 200 mg

ацикловир (aciclovir)

ИЗПЪЛНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗОВАНИЕ НА ЛЕКАРСТВОТА	
Листовка - Приложение 2	
Към РУ №: 2945	15.09.08
Одобрено: 21 / 29.07.08	

Моля, прочетете внимателно тази листовка преди да започнете да приемате лекарството или да го давате на някого, за когото се грижите. Тя съдържа важна информация за лечението. Ако имате някакви въпроси, посъветвайте се с Вашия лекар.

Пазете листовката, тъй като може да ви се наложи да я прочетете отново.

ЗАПОМНЕТЕ: Това лекарство е само за Вас. Само лекар може да Ви го предпише. Никога не го давайте на други хора. То може да им навреди, дори ако техните симптоми са същите или подобни на Вашите.

Какво представлява Zovirax

Zovirax е под формата на таблетки. Активното вещество е ацикловир (aciclovir) и принадлежи към групата на противовирусните лекарства. Всяка таблетка съдържа 200 mg ацикловир и следните помощни вещества: лактоза монохидрат, микрокристална целулоза, натриев нишестен гликолат, повидон, магнезиев стеарат. В една опаковка се съдържат 25 таблетки.

Кой произвежда таблетките Zovirax и кой притежава разрешението за употребата им в България

Zovirax таблетки се произвежда от GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. с адрес: Grunwaldzka Street 189, Poznan, Полша. Притежател на разрешението за употреба е ГлаксоСмитКлайн ЕООД, ул. Димитър Манов бл.10, 1408 София, България.

За какво е предназначено лекарството Zovirax

Zovirax е противовирусно лекарство. Прилага се за лечение на инфекции, причинени от херпес симплекс вирус, включително първичен и рецидивиращ генитален херпес. Понякога лекарите предписват това лекарство и за други цели или при дозировки, различни от описаните по-долу (виж *Допълнителна информация*)

Кой може да приема таблетки Zovirax

Преди да започнете да приемате таблетки Zovirax, задайте си следните въпроси:

- Бременна ли сте или се опитвате да забременеете?
- Кърмите ли?
- Имали ли сте в миналото алергични реакции към ацикловир, валацикловир или към някоя от останалите съставки, изброени по-горе?
- Страдате ли от бъбречно или чернодробно заболяване?
- Приемате ли в момента лекарствата пробенецид, циметидин или микофенолат мофетил?

Ако отговорът на някой от тези въпроси е "Да" (или не сте сигурни дали те се отнасят до вас) и ако не сте ги обсъждали с лекаря си, уведомете Вашия лекар преди да започнете приема на лекарството.

Как се приемат таблетките Zovirax

Важно е да приемате лекарството в точно определеното време. Трябва да го приемате по начина, указан от Вашия лекар.

- Обичайната дозировка за възрастни е една таблетка пет пъти дневно на около 4-часови интервали, но лекарят може да променя тази дозировка.
- Приемайте таблетките най-малко пет дни.



- Погълъщайте таблетките цели с малко вода.
- Ако забравите да приемете една доза, не се тревожете. Приемете таблетката веднага след като си спомните и продължете със следващите дози в точно определеното време.
- Ако приемете твърде голямо количество от лекарството или ако някой друг го е погълнал по погрешка, незабавно уведомете лекаря.

Докато приемате това лекарство, непременно пийте много течности.

Ако Ви/детето Ви имате увредена бъбречна функция, Вашият лекар може да Ви посъветва да приемате по-малка доза от обичайната (по-малко количество таблетки) Zovirax.

Употреба на Zovirax по време на бременност и кърмене

Бременност: Лекарят може да назначи прием на Zovirax по време на бременност само ако е преценил, че възможните ползи от лечението на майката надвишават потенциалните рискове за плода. Необходимо е повишено внимание при приложение на лекарството при бременни жени.

Кърмене: Установено е, че активното вещество ацикловир преминава в кърмата. Необходимо е лекарят да прецени дали да предприше Zovirax на кърмачки и дали в този случай се налага спиране на кърменето.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Такива ефекти не са описани. Не са провеждани проучвания за изследване на ефектите на ZOVIRAX върху способността за шофиране и работата с машини.

Причинява ли Zovirax нежелани лекарствени реакции

Както всички лекарства, Zovirax може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Някои пациенти са наблюдавали следните нежелани реакции, докато са приемали Zovirax:

Чести нежелани реакции (при между 1 на всеки 10 и 1 на всеки 100 пациенти):

- главоболие, замаяност, гадене, повръщане, диария и коремни болки,
- сърбеж, обриви (включително фоточувствителност),
- умора, повишена температура.

Нечести нежелани реакции (при между 1 на всеки 100 и 1 на всеки 1 000 пациенти):

- уртикария, косопад. Този вид косопад се свързва с широк спектър болестни процеси и лекарства, връзката му с терапията с ацикловир е несигурна.

Редки нежелани реакции (при между 1 на всеки 1 000 и 1 на всеки 10 000 пациенти):

- алергична реакция,
- затруднено дишане,
- повишаване на стойностите на билирубина и на чернодробните ензими,
- ангиоедем,
- повишаване на стойностите на уреята и креатинина в кръвта.

Уведомете незабавно Вашия лекар, ако при Вас се появи някой от следните симптоми на алергична реакция: внезапно трудно дишане с хриптене, стягане на гърдния кош, колапс, подуване на клепачите, лицето, устните или на друго място от тялото, кожен обрив. **Не прилагайте повече таблетки от лекарството, освен ако лекарят не реши друго.**

Много редки нежелани реакции (при по-малко от 1 на всеки 10 000 пациенти):

- анемия (намаляване на броя на червените кръвни клетки и (или) на хемоглобина), левкопения (намаляване на броя на белите кръвни клетки), тромбоцитопения (намаляване на броя на клетките тромбоцити в кръвта),



- възбуда, обърканост, тремор (треперене), атаксия (нарушения в координацията), дизартрия (затруднение на говора), халюцинации, гърчове, сънливост, кома (безсъзнание). Тези реакции обикновено са обратими и са съобщавани при пациенти с бъбречно увреждане или при лица в напреднала възраст.
- хепатит (възпаление на черния дроб), жълтеница (пожълтяване на кожата и (или) на бялото на очите),
- болка в хълбока (в областта на бъбрека),
- остра бъбречна недостатъчност.

Ако забележите някоя от гореописаните реакции, уведомете Вашия лекар възможно най-бързо.

Ако забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Употребата на Zovirax може да даде отражения на резултатите от изследванията на кръвта и урината Ви. Ако трябва да ви се правят такива изследвания, уведомете Вашия лекар, че приемате Zovirax.

Как да съхранявате Zovirax таблетки

- Съхранявайте лекарството на място, недостъпно за деца.
- Съхранявайте Zovirax на сухо място, при температура под 25°C.
- Не приемайте лекарството след датата на изтичането на срока на годност, отбелязана върху опаковката.

Допълнителна информация

Zovirax таблетки 200 mg може да се прилага и в следните случаи по преценка на лекуващия лекар:

- За потискане рецидивите на инфекции, причинени от *Herpes Simplex Virus*, при пациенти със запазен имунитет. Обичайната дозировка за възрастни е една таблетка четири пъти дневно на около 6-часови интервали, но лекарят може да променя тази дозировка.
- За лечение на *varicella* и *herpes zoster*, причинени от *Varicella Zoster Virus*. Обичайната дозировка за възрастни е по 4 таблетки пет пъти дневно на около 4-часови интервали в продължение на 7 дни. За лечение на *varicella* при деца над 6 години може да се приложи доза от 4 таблетки 4 пъти дневно; при деца между 2 и 6 години - по 2 таблетки 4 пъти дневно; а при деца под 2 години - по 1 таблетка 4 пъти дневно.
- За лечение на тежък имунен дефицит се препоръчва прием на доза от по 4 таблетки 4 пъти дневно на около 6-часови интервали.

Последната редакция на тази листовка е от март 2008 г.

