

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА ...29.03.05г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

Какво трябва да знаете за Isoprinosine®?

Isoprinosine 500 mg / Изопринозин таблетки 500 мг.

Тази листовка Ви дава полезна информация за приложението на Isoprinosine®. Прочетете я внимателно преди употреба. Ако имате въпроси се обърнете към Вашия лекар или фармацевт.

Какво представляват таблетките Isoprinosine®?

- Всяка бяла (до белезникава) таблетка Isoprinosine® съдържа 500 mg лекарствено вещество Inosine pranobex .
- Всяка таблетка Isoprinosine® съдържа и следните помощни вещества: манитол, скорбяла, повидон, магнезиев стеарат.
- Isoprinosine® помага на имунната система да се справи с вирусните заболявания. Isoprinosine® осъществява и директен антивирусен ефект.
- Isoprinosine® се предлага в блистери в опаковка по 50 таблетки. Таблетките се продават по рецепт.

Кой е притежател на разрешението за употреба на Isoprinosine®?

Ewopharma AG , Vordergasse 43, CH-8200 Schaffhausen, Switzerland

За какво се използват таблетките Isoprinosine® ?

Isoprinosine® е показан при лечение или повлияване на потиснатия илиувреден клетъчен имунитет и на клиничната симптоматика при вирусни инфекции, например:

- грип
- херпес симплекс
- херпес зостер
- афтозен стоматит
- папилома вирус (кондиломата акумината)
- вирусни хепатити
- Epstein-Barr-вирусни инфекции
- цитомегаловирусна инфекция
- подостър склерозиращ паненицефалит
- рубеола
- морбили
- заушки



Преди да вземете таблетките Isoprinosine®

- Информирайте Вашия лекар, ако имате бъбречни проблеми, подагра или високо ниво на пикочната киселина в кръвта.
- Не вземайте тези таблетки, ако сте алергични към някои от съставките на Isoprinosine®.
- Таблетките може да се употребяват *след*, но *не едновременно* с имуносупресивни средства, тъй като може да се осъществи фармакокинетично влияние върху желаните лечебни ефекти на Isoprinosine® и/или на другия лекарствен продукт/ продукти.
- Isoprinosine® трябва да се използва с предпазливост при лечение с ксантиноксидазни инхибитори или урикузурични средства, вкл. диуретици.
- Isoprinosine® не трябва да се прилага по време на бременност и кърмене без съвет от лекаря.
- Isoprinosine® не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

Употреба на таблетките Isoprinosine®

Как да употребявате таблетките Isoprinosine®?

Тъй като Isoprinosine® е утвърден за голям брой индикации, моля спазвайте инструкциите на Вашия лекар кога и колко дълго да приемате таблетките. Обичайната доза е :

- 50 мг/кг телесно тегло дневно, максимум 4 г на ден (или 2 таблетки, приемани 3-4 пъти дневно за възрастни и хора в напреднала възраст)
- Деца: препоръчителната доза е 50 мг/кг телесно тегло (1таблетка на 10 кг)
- Таблетката може да се стрива и да се разтваря в течности (чай, мляко, плодови сокове).
- Прочетете внимателно листовката и ако не сте сигурни за нещо, попитайте Вашия лекар .

Какво трябва да направите, ако сте погълнали твърде много таблетки Isoprinosine®?

- Потърсете лекар.

Какво трябва да направите, ако забравите да вземете таблетките Isoprinosine® навреме?

- Вземете ги в момената, в който се сетите и продължете по предвидения дозов режим.



След приема на таблетките

- Както при други лекарствени продукти, таблетките Isoprinosine[®] могат да причинят нежелани реакции, но те са редки и обикновено са с умерен и краткотраен характер. Най-често срещана нежелана реакция е повишеното ниво на никочната киселина в кръвта и урината, което се възвръща до нормалните стойности след спиране на лечението.

Редки нежелани реакции :

Стомашно-чревни: Гадене, повръщане, дискомфорт в стомашната област

Чернодробни: Повишаване на трансаминазите, алкалната фосфатаза или нивата на азотните тела в кръвта.

Кожни: Сърбеж, зачеряване на кожата

Нервна система: Главоболие, световъртеж, умора, неразположение

Други: Ставни болки

По-рядко срещани нежелани реакции:

Стомашно-чревни: Диария, запек

Нервна система: Безпокойство, безсъние или сънливост

Урологични: Полиурия (увеличен обем на урина в даден период)

- Ако чувствате или наблюдавате нещо необичайно, което не можете да си обяснете, уведомете Вашия лекар възможно най-скоро.

Съхранение на таблетките Isoprinosine[®]

- Да се съхраняват на места, недостъпни за деца.
- Да се съхраняват в оригиналната опаковка, на сухо място при температура под 25°C .
- Да не се използват след изтичане срока на годност, отбелязан върху опаковката.
- Ако Вашият лекар прекрати лечението Ви с Isoprinosine[®], не забравяйте да върнете неизползваните таблетки на Вашия фармацевт. Пазете ги само, ако лекарят ви каже да го направите.

Помнете, това лечение е за Вас като пациент. Само лекар може да Ви го предпише. Не позволявайте други да приемат таблетки Isoprinosine[®], дори техните симптоми да изглеждат подобни на Вашите.

Дата на последна редакция: Април 2003 г.

