

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 23-09-03

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

Моля, прочетете внимателно тази листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Ако имате допълнителни въпроси, обърнете се към лекуващия лекар или фармацевт

IMEX® - ИМЕКС

Какво представлява Имекс?

Маз за прилагане върху кожата в туба от 5 и 20 g.

1 g маз съдържа Tetracycline hydrochloride 30 mg.

Помощни вещества: бял вазелин, средно-верижни триглицериди, титанов оксид (E 171) и железен оксид (E 172).

Акне е упорито кожно заболяване, което се причинява от бактерии (*Propionibacterium acnes*) в съчетание с увеличена мастна секреция и начало главно в пубертетна възраст. Това е последвано от запушване на мастните жлези, поради увеличена продукция на роговите клетки (т. нар. комедони).

Антибиотика тетрациклин в Имекс потиска белтъчната синтеза на бактериите, в резултат на което намалява концентрацията на факторите, задълбочаващи възпалителния процес. По този начин Имекс преодолява възпалението и предпазва от запушване на мастните жлези.

За какво се използва Имекс?

За лечение на всички видове акне, особено формите, свързани с възпаление.

Кога не трябва да използвате Имекс?

Имекс не трябва да се използва от пациенти със свръхчувствителност към тетрациклин или други съставки на продукта.

Какво трябва да имате предвид по време на бременност и кърмене?

Независимо, че няма данни за ембриотоксичен ефект, Имекс следва да се прилага при бременност и кърмене само след лекарско предписание.

Въздействие върху способността за шофиране и работа с машини

Няма въздействие върху способността за шофиране и работа с машини .

Кои други продукти оказват влияние върху ефекта на Имекс или могат да бъдат повлияни при съвместна употреба?

Няма установени лекарствени взаимодействия.



Как да използвате Имекс и колко често?

Вашият лекар ще Ви предпише да нанасяте върху засегнатите места на кожата в тънък слой 1-3 пъти дневно чрез леко втряване под формата на масаж. Успешното лечение изисква време и търпение, тъй като обикновено продължава няколко месеца. Вашият лекар трябва да определи продължителността на лечението. Подобрене на симптомите може да се очаква още в началото на лечението. Най-силно изразено е след 3-4 седмици. Следвайте указанията на вашия лекар и не прекъсвайте предварително лечението, ако не видите бърз ефект.

След прилагане остава видимо оцветен с цвета на кожата филм, което е белег, че е нанесено достатъчно количество от продукта. Слабото оцветяване от Имекс прави по-незабележими комедоните и гнойните пъпки.

Всяко зацепване на облеклото, което може да се получи при употребата на Имекс може да бъде отстранено при изпиране.

Какви нежелани реакции може да предизвика Имекс?

Imex® се понася обикновено добре, дори при по-продължително приложение. Локално дразнещо действие върху кожата (зачеряване, сърбеж, парене) може да се очаква само в много редки случаи.

Предупреждение

Поради съдържащия се в продукта тетрациклин, може да се получи леко жълто оцветяване на кожата, което свети при обльчване с ултравиолетови лъчи. Този козметичен ефект може да се отстрани при използване на кисели сапуни.

Специални условия на съхранение

Да се съхранява при температура под 25° С.

Да се съхранява на места, недостъпни за деца!

Срок на годност

Срокът на годност е 2 години.

Да не се използва след изтичане срока на годност, отбелаязан върху опаковката!

Производител и притежател на разрешението за употреба

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Germany

Медицинско представителство в България:

Либра АД, София

Дата на последна редакция на листовката

Април 2003

