

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА ... 31.01.03

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

Ipolipid

(Gemfibrozil)

Моля, прочетете внимателно тази листовка преди да започнете приема на този лекарствен продукт. Пазете тази листовка на сигурно място; можете да поискате да я прочетете отново. Листовката съдържа само обобщение на наличната за този лекарствен продукт информация. Ако не сте сигури за нещо, или имате някакви въпроси, моля, попитайте вашия лекар или фармацевт. Вашият лекар назначава този лекарствен продукт на Вас. Не го давайте на някой друг, той може да навреди на него или ная, дори ако техните симптоми са същите като вашите.

Тази листовка ви казва какво е Ipolipid и за какво се ползва. Тя ви дава някои важни факти, които да имате предвид преди да започнете приема Ipolipid, и ви информира как да вземате Ipolipid. Листовката ви казва за възможните нежелани лекарствени реакции на Ipolipid и как да го съхранявате.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ЗА ПРОДУКТА

Наименованите на вашия лекарствен продукт е Ipolipid (Иполипид) и капсулите съдържат gemfibrozil като лекарствено вещество. Капсулите съдържат също натриев нишестен гликолат, прешелатинирано царевично нишесте, силиконов диоксид, и магнезиев стеарат. Обвивката на капсулата съдържа желатин, амарант, FD&C синьо 1, и титаниев диоксид. Капсулите се доставят във блистери от алуминиево-поливинилхлоридно фолио в опаковки, съдържащи 50 броя капсули.

Притежател на разрешението за употреба и производител на Ipolipid е: Medochemie Ltd, p.o box 51409, Limassol, CY-3505, Cyprus.

КАКВО Е IPOLIPID И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Всяка капсула Ipolipid съдържа 300mg gemfibrozil и се взема през устата. Gemfibrozil е един от групата лекарствени продукти, наречени регулиращи мазнините лекарствени продукти. Твърде много мазнини (липиди) в кръвта ви увеличава риска от сърдечно заболяване, но не всички видове мазнини имат един и същ ефект. Някои от тях са добри за вас и ви пазят от сърдечно заболяване, те са познати като HDL холестерол. Някои са лоши за вас; те се наричат LDL холестерол и триглицериди. Твърде много мазнини, или от лошия вид мазнини в кръвта ви се нарича хиперлипидемия. Gemfibrozil се използва за лечение на състоянията с повече, или с лош вид от мазнини в кръвта ви, хиперлипидемии. Той също



употребява за предпазване от сърдечни заболявания на мъже на възраст между 40 и 55 години с хиперлипидемия, които не са отговорили на диета и упражнения. Той прави това чрез намаление на лошите мазнини (LDL холестерол, триглицериди) и увеличение на количеството на добри мазнини (HDL холестерол) в кръвта ви. Вашият лекар е способен да ви обясни и разкаже повече.

ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ С IPOLIPID

Не започвайте приема на Ipolipid преди да кажете на лекаря или фармацевта си ако:

- Сте бременна, смятате да забременеете, или кърмите;
- Имате проблеми с дишането, хрипове, отоци по лицето, устата или устните, или тежък кожен обрив след вземане на gemfibrozil или някое от помощните вещества на лекарствения продукт;
- Имате чернодробно заболяване, бъбречно заболяване, жълчни камъни, или други проблеми с жълчния тракт;
- Пиеете много алкохол;
- Сте под 16 годишна възраст.

Ако отговорите с ДА на някой от горните въпроси, консултирайте се с лекаря си преди приема на Ipolipid.

Вие ще трябва да кажете на лекаря си за всеки от другите лекарствени продукти, които вземате, или сте приемал насокоро. Не забравяйте да му кажете за лекарствените продукти, които купувате без рецепт. Много е важно да кажете на лекаря си, ако вземате:

- Лекарствени продукти, разреждащи кръвта, като варфарин;
- Други лекарствени продукти за лечение на мазнините в кръвта (регулиращи липидите лекарствени продукти)
- Лекарствени продукти, използвани за намаляване на кръвното налягане - β-блокери, тиазидни диуретици, метилдопа
- Съдържащи естрогени лекарствени продукти
- Лекарствени продукти, използвани за контрол на кръвната захар при захарен диабет..

По време на лечението с Ipolipid, ще трябва да казвате на лекаря или фармацевта си преди да започнете всяко ново лекарство. Това включва и всеки лекарствен продукт, който купувате без рецепт.

КАК ДА ВЗЕМАТЕ IPOLIPID

Капсулите Ipolipid са само за възрастни. Не трябва да ги вземат деца (под 16 години).

Капсулите Ipolipid трябва да се погълнат цели с чаша вода.



Вашият лекарят ще ви каже кога и как да вземате лекарството си. Винаги следвайте назначенията на лекаря ви. Инструкциите трябва да са на листовката. Винаги четете листовката. Ако не сте сигурен, или обръкан, попитайте лекаря или фармацевта ви.

Броят на капсулите, които вземате зависи от реакцията ви на лекарството. Обичайната доза за възрастни и пациенти в старческа възраст е 900mg дневно, еднократно, обикновено вечер половин час преди хранене.

Преди да започнете прием на Ipolipid, обикновено лекарят ви ще опита да лекува всяко съпътстващо заболяване, като заболяване на щитовидната жлеза или диабет, и ще ви даде някои съвети във връзка с диетата, упражненията, тютюнопушенето, пиемето, и вероятно намалението на телесното тегло. Вие ще трябва да продължите да спазвате тези съвети, докато вземате Ipolipid. Ако ли не, няма да можете да получите пълната полза от лекарствения продукт.

Лекарят ви ще иска периодично да го посещавате, докато приемате лекарството, вероятно по-често през първите три месеца. Това е, за да бъде сигурен за добия ефект, който лекарството оказва върху мазнините в кръвта ви. Лекарят ви може да ви прави рутинни кръвни преби, вероятно до една година.

Не спирайте приема на капсулите, без да информирате вашия лекар.

Ако забравите да приемете капсула, вземете една когато си спомните, стига да не е време за следващата доза. Не вземайте две дози едновременно.

Ако сте взели твърде много капсули, трябва да се консултирате с лекаря веднага. Ако това не е възможно, трябва да отидете веднага в най-близката болница. Винаги носете опаковката на лекарството с вас, така че персонала да знае какво сте приели.

СЛЕД ЛЕЧЕНЕ С IPOLIPID

Подобно на всички лекарствени продукти, понякога Ipolipid може да доведе до нежелани лекарствени реакции. Те се наричат странични ефекти.

Най-често съобщавани нежелани лекарствени реакции:

- Коремна болка, диария, гадене, повръщане, метеоризъм (газове);
- Кожен обрив, често надигнат или сърбящ обрив;
- Главоболие, замаяност, замъглено видждане;
- Загуба на интерес за, или трудности при правене на секс (импотентност).

По-серииозни нежелани лекарствени реакции появявящи се рядко:



- Оток на лицето и езика (ангиоедем), алергични реакции, причиняващи трудности с дишането, изискват незабавна консултация с лекар
- Пожълтяване на кожата и/или очните ябълки (жълтеница)
- Възпаление на панкреаса, водещо до силна коремна болка (панкреатит)
- Аритмична съдечна дейност (палипитации)
- Мускулна слабост, умора, или болка
- Силна мускулна болка и загуба на мускулна тъкан (рабдомиолиза и миалгия)
- Нарушение за чувството за вкус
- Болка в крайниците
- Промяна в цвета на кожата или обрив след излагане на слънце.

При някои хора, приемащи gemfibrozil, може да се прояви следното, въпреки че не е сигурно, че gemfibrozil причинява тези ефекти:

- Сухота в устата, загуба на апетит, лошо храносмилане
- Запек
- болка в кръста, оточни или болезнени стави, мускулни крампи
- замаяност / чувство за зашеметяване, нарушения в съня, загуба на чувствителността и изтръгване, шум в ушите
- анемия, необичайно кървене и контузии
- умора, чувство за общо неразположение, слабост, пребледняване
- простуда, кашлица, инфекции на уринарния тракт и други инфекции.

Ако получите някоя от тези нежелани реакции трябва незабавно да спрете приема на gemfibrozil и веднага да кажете на лекаря си или фармацевта.

Не се беспокойте от този списък с нежелани реакции; вие може да не ги имате.

Ако имате никакви други нежелани лекарствени реакции, които смятате свързани с Ipolipid, кажете на лекаря или фармацевта.

КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ВАШЕТО ЛЕКАРСТВО

Трябва да съхранявате лекарството си на места, където деца няма да могат да го видят или достигнат. Пазете лекарствения продукт в оригиналната му опаковка.

Съхранявайте лекарствения продукт на сухо място, далеч от светлина, на температура под 25°C.

Не го използвайте след изтичане на срока на годност. Той е означен на картонената кутия. Има го също на всеки блистер с капсули.



Ако лекарят ви каже да спрете приема на Ipolipid, върнете неизползваната част от лекарството на фармацевта си. Запазете лекарството само, ако лекарят ви е казал.

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Пълната информация за Ipolipid не е в тази листовка. Ако искате да знаете повече или имате някакви въпроси, попитайте вашия лекар или фармацевт.

ЗАПОМНЕТЕ, че лекарят ви е назначил това лекарство на ВАС. Никога не го давайте на някой друг.

Дата на последна редакция: Юни 2002

Ipolipid е търговска марка

Информацията в тази листовка е само за Ipolipid

