

ЛЪНДОН
11-3165, 15.10.08
Одобрено: 22/16.09.08

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

УРГОКОР КОРИСИД 32 mg лечебен пластир

Салицилова киселина

URGOCOR CORICIDE 32 mg medicated plaster

Salicylic acid

Прочетете внимателно цялата листовка тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват след 10 дни.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява УРГОКОР КОРИСИД и за какво се използва
2. Преди да използвате УРГОКОР КОРИСИД
3. Как да използвате УРГОКОР КОРИСИД
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате УРГОКОР КОРИСИД
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА УРГОКОР КОРИСИД И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

УРГОКОР КОРИСИД представлява самозалепващ се пластир, предназначен за локално приложение за премахване на мозоли и мозолести образувания при възрастни.

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРГОКОР КОРИСИД

Не използвайте УРГОКОР КОРИСИД


- ако сте алергични (свърхчувствителни) към салицилова киселина, салицилати или към някоя от останалите съставки на УРГОКОР КОРИСИД.
- ако мястото, което ще се третира е наранено, инфектирано или възпалено.

Обърнете специално внимание при употребата на УРГОКОР КОРИСИД

Преди да използвате това лекарство, уведомете Вашия лекар, ако имате артерити, тежки циркулаторни нарушения, диабет и невропатия.

Този продукт е разяждащ и не трябва да се прилага върху кожата около мястото, което се третира. Поставайте пластира така, че мозолестото образувание да се покрие с активната зелена част и тя да не е в контакт със здрава кожа. Преустановете използването при появата на болка.

Консултирайте се с Вашия лекар, ако лечението е неуспешно (10 дни без никакво подобрение) или мозолите или мозолестите образувания се появят отново. Удачно е да се открие причината и да се лекуват последствията (ортопедични мерки за корекция на опорно-двигателната система, смяна на обувките и пр.).



Прием и употреба на други лекарства

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Употреба на УРГОКОР КОРИСИД с храни и напитки

При правилна употреба на УРГОКОР КОРИСИД, не се очаква повлияване от храни и напитки, тъй като продуктът се прилага и действа локално.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство. Поради това, че не е установена безопасността на УРГОКОР КОРИСИД, не се препоръчва употребата му от бременни жени и кърмачки.

Шофиране и работа с машини

Не се очаква повлияване на способността за шофиране и работа с машини, тъй като УРГОКОР КОРИСИД се прилага и действа локално.

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРГОКОР КОРИСИД

Винаги използвайте УРГОКОР КОРИСИД точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

УРГОКОР КОРИСИД е предназначен за външна употреба. Прилага се веднъж дневно в продължение на 8 последователни дни.

Краката с измиват ежедневно с топла вода и се подсушават внимателно. Пластирът се поставя така, че да покрие мазолестите образувания с активната си зелена част, като се внимава тя да не е в контакт със здравата кожа.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, УРГОКОР КОРИСИД може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

При приложение върху здрава кожа УРГОКОР КОРИСИД може да предизвика раздразване на кожата. В такива случаи приложението на пластира трябва да се прекъсне, докато раздразнението премине.


В редки случаи е възможно приложението на УРГОКОР КОРИСИД да предизвика алергични реакции от типа на контактен дерматит.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ УРГОКОР КОРИСИД

Да се съхранява под 30°C.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.



Не използвайте УРГОКОР КОРИСИД след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа УРГОКОР КОРИСИД

- Активното вещество е: салицилова киселина.
- Другите съставки са: пчелен восък, бял, наситени полиглицолизирани глицериди, силициев диоксид, хидрофобен колоиден, меден хлорофил.

Как изглежда УРГОКОР КОРИСИД и какво съдържа опаковката

УРГОКОР КОРИСИД е самозалепващ се пластир с фиксиран в центъра диск от пенополиетилен, съдържащ оцветена в зелено салицилатна маса. Пластирът е опакован индивидуално в хартиено пликче. Една картонена кутия съдържа 12 пластира.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба:

АРИШОП ФАРМА АД
София 1271
бул. Рожен 24
България
Тел.: (+ 359 2) 810 3949
Факс: (+ 359 2) 810 3993

Производител:

LABORATOIRES URGO
Avenue de Strasbourg
Zone Excellence 2000
21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR
Франция

Дата на последно одобрение на листовката Август 2008

