

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

ТАЙФИМ Vi 0,5 ml Инжекционен разтвор
TYPHIM Vi 0,5 ml solution for injection
Полизахаридна ваксина срещу коремен тиф
Typhoid polysaccharide vaccine

КЪМ РУ №

3127, 09.10.08

Одобрено:

03.10.2008

Моля, прочетете внимателно тази листовка, преди ваксинацията.

- Запазете тази листовка. Възможно е да е необходимо да я прочетете отново;
- Внимателно следвайте указанията на Вашия лекар или медицинска сестра. Ако Ви трябва допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или медицинска сестра.

СЪСТАВ

Лекарственото вещество е:

Полизахариди на *Salmonella typhi*

(щам Ty 2)..... (25 микрограма за една доза от 0,5 ml)

Допълнителни вещества: Фенол и буфериран разтвор, съдържащ натриев хлорид, динатриев фосфат дихидрат, натриев дихидроген фосфат дихидрат и вода за инжекции.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

SANOFI PASTEUR SA- 2 avenue Pont Pasteur- F-69007 Lyon- Франция

ПРОИЗВОДИТЕЛ

SANOFI PASTEUR SA - 2, avenue Pont Pasteur - 69007 LYON - Франция

SANOFI-AVENTIS Zrt. - 1225 Budapest - Campona u. 1. (Harbor park) - Унгария

1. КАКВО Е ТАЙФИМ Vi И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?

ТАЙФИМ Vi е представена под формата на предварително напълнена спринцовка съдържаща 0,5 ml от ваксината.

Този лекарствен продукт е ваксина, препоръчана за профилактика на коремен тиф при възрастни и деца над 2 годишна възраст.

ТАЙФИМ Vi е специално предназначена за лица пътуващи за ендемични зони, преселници, здравен персонал и военен персонал.

2. ПРЕДИ УПОТРЕБАТА НА ТАЙФИМ Vi

Не използвайте ТАЙФИМ Vi ако Вие или Вашето дете:

- имате алергия към някоя от съставките на ваксината.
- има/те температура, остро заболяване или хронично заболяване в стадий на обостряне (в тези случаи ваксинацията трябва да бъде отложена)



Вземете специални предпазни мерки при употребата на ТАЙФИМ Vi:

- Тази ваксина не трябва да се инжектира вътресъдово: уверете се, че иглата не е проникнала в кръвоносен съд.
- Ваксината осигурява защита срещу бактерия, причиняваща коремен тиф (*Salmonella typhi*), но не срещу сходни бактерии (*Salmonella paratyphi* A или B).
- Тази ваксина не е показана за деца под две годишна възраст, тъй като не е достатъчно ефективна за тази възраст.

Бременност - кърмене

Поради сериозността на заболяването, и в случай на висок риск от заразяване с коремен тиф, бременността не е причина да се отмени ваксинацията.

По време на бременност този лекарствен продукт трябва да се използва само по препоръка на лекар.

Тази ваксина може да бъде прилагана по време на кърмене.

Преди употребата на лекарствен продукт потърсете съвет от Вашия лекар или фармацевт.

Приемане на ваксината с други лекарства:

ТАЙФИМ Vi може да бъде прилагана заедно с други ваксини (ваксини срещу хепатит А, жълта треска, дифтерия, тетанус, полиомиелит, бяс, менингит А + С и хепатит В) по време на ваксинацията

МОЛЯ, ИНФОРМИРАЙТЕ ВАШИЯ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ АКО ПРИЕМАТЕ ИЛИ НА СКОРО СТЕ ПРИЕМАЛИ ДРУГИ ЛЕКАРСТВА, ДОРИ И ТЕ ДА НЕ СА ПО ПРЕДПИСАНИЕ

3. КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ТАЙФИМ Vi

Приложение:

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ВЪЗРАСТНИ И ДЕЦА НАД 2 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ.

Защитата се осигурява от една инжекция.

Реваксинацията трябва да се извършва на всеки 3 години ако лицето продължава да бъде изложено на риск.

Имунизационната схема е еднаква за възрастни и за деца.

Метод и начин на приложение:

За интрамускулно или подкожно приложение.

Всеки неизползван продукт или отпадъчен материал трябва да бъде изхвърлен в съответствие с местните изисквания

4. ВЪЗМОЖНИ СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ

Като всеки лекарствен продукт, ТАЙФИМ Vi може да има странични ефекти при някои лица.

Съобщаваните реакции след ваксинация са обикновено умерени и бързо преходни.



- локални реакции на мястото на инжектиране (болка, подуване, зачервяване).
 - Рядко системни реакции (повишена температура, умора, главоболие, неразположение, ставни и мускулни болки, гадене, коремни болки)
 - Много рядко: Алергични реакции (сърбеж, обрив, уртикария).
- Съобщавани са изолирани случаи на серумни нарушения и сериозни алергични реакции (анафилактични реакции).

СЪОБЩАВАЙТЕ НА ВАШИЯ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ ЗА ВСИЧКИ НЕЖЕЛАНИ ИЛИ СМУЩАВАЩИ ВИ РЕАКЦИИ, КОИТО МОЖЕ ДА НЕ СА СПОМЕНАТИ В ТАЗИ ЛИСТОВКА.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА ТАЙФИМ Vi

Да се съхранява на места, недостъпни за деца.

Да се съхранява от в хладилник (от 2⁰С до 8⁰С).

Да не се замразява.

Да не се използва след изтичане срока на годност, обозначен върху етикета и опаковката.

Дата на последната редакция: 09/2008

