

## ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

**Прочетете внимателно листовката преди да започнете лечение с лекарствения продукт.**

- Запазете листовката. Може отново да я прочетете.
- Ако имате допълнителни въпроси, моля обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.
- Този продукт е предписан лично за Вас и не бива да го давате на други хора. Той може да им навреди, дори и симптомите да са същите, като вашите.

### **В тази листовка:**

1. Какво е Весел Дие Ф<sup>®</sup> и за какво се използва
2. Преди да започнете лечение с Весел Дие Ф<sup>®</sup>
3. Как се приема Весел Дие Ф<sup>®</sup>
4. Възможни нежелани лекарствени реакции
5. Съхранение на Весел Дие Ф<sup>®</sup>
6. Допълнителна информация

### **ВЕСЕЛ ДИЕ Ф<sup>®</sup> (Сулодексид)**

#### *250 LSU капсули*

Активното вещество е Сулодексид 250 LSU

Помощните вещества са: натриев лаурил саркозинат, силиконов преципитат, триглицериди, желатин, глицерол, натриев етил пара-хидроксibenзоат, натриев пропил пара-хидроксibenзоат, титаниев диоксид E171, червен железен оксид E 172.

#### *600 LSU/2 ml разтвор инжекционен*

Активното вещество е Сулодексид 600 LSU

Помощните вещества са: натриев хлорид, вода за приготвяне на инжекционен разтвор

### **Притежател на Разрешението за Употреба**

ALFA WASSERMANN S.p.A.

Via Enrico Fermi, 1; 65020 - ALANNO (PE) -Италия

### **Производители**

#### *Капсули*

Производство на меки капсули: R.P. SCHERER S.p.A. – Aprilia (Latina) - Италия

Първична опаковка и контрол:

ALFA WASSERMANN S.p.A. – Via Enrico Fermi, 1- Alanno (PE) – Италия

Вторична опаковка и контрол:

"ЦСЦ Фармасютикъл България" ЕООД, ул. "Асен Йорданов"10, гр. София 1592, България

#### *Ампули*

ALFA WASSERMANN S.p.A. – Via Enrico Fermi, 1- Alanno (PE) - Италия

"ЦСЦ Фармасютикъл България" ЕООД, ул. "Асен Йорданов"10, гр. София 1592, България



## 1. КАКВО Е ВЕСЕЛ ДУЕ Ф<sup>®</sup> И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

### Лекарствена форма и съдържание

ВЕСЕЛ ДУЕ Ф<sup>®</sup> 250 LSU капсули са червени овални меки капсули, съдържащи бяло-сива суспензия. Всяка мека капсула съдържа доза от 250 LSU сулодексид.

ВЕСЕЛ ДУЕ Ф<sup>®</sup> 250 LSU капсули са в опаковки от 50 капсули, разделени в два блистера от по 25 капсули всеки. Блистерите са поставени в картонена кутия.

ВЕСЕЛ ДУЕ Ф<sup>®</sup> 600 LSU инжекционен разтвор е прозрачна светло-жълта течност от 2 ml в жълти стъклени ампули. Всяка ампула съдържа доза от 600 LSU сулодексид.

ВЕСЕЛ ДУЕ Ф<sup>®</sup> 600 LSU е в опаковки по 10 ампули, поставени в полистиренова форма и в картонена кутия.

### Фармакотерапевтична група

ВЕСЕЛ ДУЕ Ф<sup>®</sup> е антитромботичен агент действащ на много нива. Лекарят Ви е предписал това лекарство за лечение и превенция на съдови заболявания. ВЕСЕЛ ДУЕ Ф<sup>®</sup> притежава двойно инхибиращо действие върху 2 от факторите на кръвта, отговорни за образуването на тромби и за увеличаване на патологичните условия, като тези, които Ви засягат в момента. В допълнение, ВЕСЕЛ ДУЕ Ф<sup>®</sup> има способността да ускорява активирането на ендогенно-фибринолитичната система, която след като веднъж е формирана, разрушава тромбите. ВЕСЕЛ ДУЕ Ф<sup>®</sup> също така предпазва стените на съдовете и подобрява циркулирането на кръвта, което е нарушено при съдови заболявания.

### Терапевтични показания

ВЕСЕЛ ДУЕ Ф<sup>®</sup> е показан за профилактика на артериални и венозно-съдови заболявания с потенциален риск от тромбоза.

## 2. ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ЛЕЧЕНИЕ С ВЕСЕЛ ДУЕ Ф<sup>®</sup>

### Не приемайте ВЕСЕЛ ДУЕ Ф<sup>®</sup>:

- ако имате свръхчувствителност към продукта, към хепарин или хепарин-подобни лекарствени вещества, както и към някое от помощните вещества на ВЕСЕЛ ДУЕ Ф<sup>®</sup>
- ако имате хеморагична диатеза или вероятност да развиете хеморагични нарушения

### Бъдете много внимателни с ВЕСЕЛ ДУЕ Ф<sup>®</sup>:

ако сте провеждате антикоагулантно лечение. В този случай е препоръчително периодично да провеявате показателите на кръвосъсирването.

### Бременност и кърмене

Като предпазна мярка по време на бременност или кърмене не се препоръчва употребата на ВЕСЕЛ ДУЕ Ф<sup>®</sup>, въпреки че при проведените проучвания за фетотоксичност не са били доказани ембрио-токсични ефекти.

### Шофиране и работа с машини

ВЕСЕЛ ДУЕ Ф<sup>®</sup> не оказва влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

### Приемане на други лекарствени средства:

*Листовка за пациента*



Моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарствени средства, дори тези без прескрибция.

ВЕСЕЛ ДУЕ Ф<sup>®</sup> може да увеличи противосъсирващия ефект на хепарин и пероралните антикоагуланти, ако са приемани едновременно.

### 3. КАК СЕ ПРИЕМА ВЕСЕЛ ДУЕ Ф<sup>®</sup>

Обичайната доза е:

*Капсули:* 1-2 капсули два пъти дневно; да не се приемат с храна.

*Ампули:* 1 ампула дневно интрамускулно или интравенозно.

Обикновено се препоръчва лечението да започне с инжекционен разтвор и след 15-20 дни да продължи с капсули за период от около 30-40 дни. Целият курс на лечение трябва да се повтори най-малко два пъти годишно.

В зависимост от преценката на лекуващия лекар дозировката може да се променя по отношение на количеството и честотата на приложение.

**Ако приемете повече ВЕСЕЛ ДУЕ Ф<sup>®</sup>, то тогава трябва:**

Лекарственото средство винаги трябва да се приема според предписанието на лекаря. В случай, че сте приели повече ВЕСЕЛ ДУЕ Ф<sup>®</sup> се препоръчва да информирате лекаря си.

**Ако забравите да вземете ВЕСЕЛ ДУЕ Ф<sup>®</sup>:**

Ако сте забравили да вземете лекарственото средство, то трябва да вземете дозировката възможно най-бързо. Ако един ден сте пропуснали да вземете лекарството, следващия ден вземете обичайната доза. Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатите дози.

### 4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарствени продукти, така и ВЕСЕЛ ДУЕ Ф<sup>®</sup> може да има нежелани лекарствени реакции. Все пак, при предписаната дозировка, възможността от поява на нежелани лекарствени реакции е много малка.

При лечение с ампули нежеланите лекарствени реакции обикновено се ограничават в мястото на инжектиране и може да включват болка, усещане за парене и хематоми.

При приемане на капсули редките прояви на нежелани лекарствени реакции обикновено са съсредоточени в гастро-интестиналния тракт и могат да включват гадене, повръщане, диария, диспепсия и болка в епигастриума.

Съобщени са редки случаи на главоболие, виене на свят и обриви на кожата при приемане на меки капсули или ампули.

В случай, че проявите някоя от тези нежелани лекарствени реакции, информирайте лекаря си.

Моля, информирайте лекаря или фармацевта си, ако забележите лекарствени реакции, неупоменати в тази листовка за пациента.

### 5. СЪХРАНЕНИЕ НА ВЕСЕЛ ДУЕ Ф<sup>®</sup>

*Да се съхранява на място, недостъпно за деца.*

*Да се съхранява при температура под +30°C.*

*Да не се използва след датата, отпечатана на кутията.*

*Последна редакция на текста Септември 2008 г.*

*Листовка за пациента*

