

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ	
Имигран Спринт 50 mg диспергиращи се таблетки Imigran Sprint 50 mg dispersible tablets	
sumatriptan (sumatriptan)	3100 08.10.08
EMRУ № Одобрено: 22/10.09.08	

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано на Вас. Не го преостъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите както Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Имигран Спринт и за какво се използва
2. Преди да приемете Имигран Спринт
3. Как да приемате Имигран Спринт
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Имигран Спринт
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ИМИГРАН СПРИНТ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Имигран Спринт диспергиращи се таблетки се използва за овладяване на мигренозния пристъп. Препоръчва се таблетките да се приемат при поява на симптоми на мигренозен пристъп, а не предварително за предотвратяване на пристъпа.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ИМИГРАН СПРИНТ

Не приемайте Имигран Спринт

- ако сте свръхчувствителни (алергични) към Имигран Спринт, суматриптан или някоя от останалите съставки на лекарството.

Ако не сте сигурни, моля, попитайте лекуващия лекар.

Обърнете специално внимание при употребата на Имигран Спринт

Ако отговорът на някой от следните въпроси е "да", съобщете за това на Вашия лекар, преди да започнете приема на лекарството, тъй като то може да не е подходящо за Вас:

- Бременна ли сте или се опитвате да забременеете?
- Кърмите ли? Не бива да кърмите 12 часа след прием на Имигран Спринт.
- Това главоболие по-различно ли е от обичайните ви пристъпи на мигрена?
- Приемате ли други лекарства за мигрена, които съдържат ерготамин или дихидроерготамин? Ако приемате такива лекарства, не трябва да употребявате Имигран Спринт таблетки по същото време.
- Приемате ли или сте приемали през последните две седмици някакви лекарства за лечение на депресия, особено такива, съдържащи инхибитори наmonoаминоксидазата?

Едновременният прием на Имигран Спринт и лекарства - инхибитори наmonoаминоксидазата не е препоръчителен.

- Приемате ли лекарства за лечение на депресия от групите на т.нар. селективни инхибитори на обратния транспорт на серотонин (SSRI) или инхибитори на обратния транспорт на серотонин и норадреналин (SNRI)?
- Имате ли алергия към сулфонамиди? Ако сте алергичен към някое антибактериално лекарство, но не знаете със сигурност дали то принадлежи към групата на сулфонамидите, консултирайте се с Вашия лекар.
- Страдате ли от исхемичен колит?
- Страдате ли от неочеквани пристъпи на задух или болка, или стягане в гръденя кош (които могат да обхванат челюстта или горната част на мишниците)?
- Имали ли сте някога сърдечни пристъпи?
- Страдате ли от високо кръвно налягане?
- Имате ли никакво сърдечно заболяване; страдате ли от стенокардия?
- Прекарали ли сте инсулт?
- Страдате ли от болест на Рейно (заболяване на периферните съдове, проявяващо се с болка по задната страна на краката, изстиване, изтръпване или сковане на ръцете и краката)?
- Информирани ли сте, че при Вас рискът от развитие на сърдечно заболяване е повишен?
Приема се, че повишен риск от сърдечно заболяване има при мъже над 40 годишна възраст, жени в менопауза, диабетици, пушачи, хора с висок холестерол в кръвта или наднормено тегло. Възможно е също така да имате повишен риск от сърдечно заболяване, ако някои от кръвните ви родственици са страдали от сърдечно заболяване.
- Страдате ли от чернодробно заболяване? Ако възнамерявате да провеждате някакви изследвания на кръвта, това лекарство може да повлияе на резултатите.
- Страдате ли от заболяване на бъбреците?
- Имали ли сте припадъци или гърчове в миналото? Казвали ли са Ви, че сте предразположени (склонни) към припадъци или гърчове?
- Под 18 години ли сте?
- Над 65 години ли сте?

Ако приемате Имигран Спринт прекалено често това може да утежни главоболието Ви. Ако това се случи, Вашият лекар може да Ви препоръча да преустановите лечението с Имигран Спринт.

Прием на други лекарства

Непременно уведомете Вашия лекар за всички други лекарства, които приемате в момента, дори за тези, които сте си купили сами, без лекарско предписание (вкл. билки, хранителни добавки, напр. витамини, желязо или калций).

Шофиране и работа с машини

Внимавайте, ако шофирате или работите с машини, тъй като мигрената или лечението с Имигран Спринт могат да Ви направят сънливи.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ИМИГРАН СПРИНТ

Винаги приемайте Имигран Спринт точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Таблетките трябва да се приемат веднага след поява на симптомите на мигрена, но те могат да се приемат и по всяко време в хода на мигренозния пристъп. Не приемайте таблетките когато нямате симптоми с цел предотвратяване на мигренозен пристъп.



Това лекарство не трябва да се прилага при деца (под 18 години) и при пациенти в напреднала възраст (над 65 години).

Препоръчителната доза Имигран Спринт при възрастни е 50 mg (1 таблетка от 50 mg). При необходимост, при някои пациенти може да се приложи доза от 100 mg. Ако симптомите се възобновят, могат да се приемат още таблетки. Не приемайте обаче повече от 300 mg за 24 часа (т.е. повече от 6 таблетки от по 50 mg).

Ако след първоначално приемата доза не последва никакво облекчение, не приемайте повече таблетки за този пристъп.

Вие може същевременно да приемете таблетките, които обикновено облекчават болката Ви, ако сте сигурни, че не съдържат ерготамин или дихидроерготамин.

След прием на Имигран Спринт трябва да изчакате поне шест часа преди приемането на всякакви лекарства, съдържащи ерготамин или дихидроерготамин. Ако сте приели някакви лекарства, съдържащи ерготамин или дихидроерготамин, трябва да изчакате поне 24 часа преди да приемете Имигран Спринт.

При малък брой пациенти мигренозното главоболие започва да намалява 30 минути след приема на Имигран Спринт таблетки 50 mg. Повечето хора чувстват облекчение на мигрената до два часа след приемането на таблетките.

Погльщайте таблетката цяла, с малко вода. Пациентите, които се затрудняват с проглатването на таблетката, могат да я диспергират в малко количество вода преди прием. Имигран Спринт таблетки, диспергирани във вода имат горчив вкус.

Ако сте приели повече от необходимата доза Имигран Спринт

Важно е да се придържате към препоръчената доза. Незабавно се консултирайте с лекар, ако случайно погълнете по голяма доза от максималната дневна доза (300 mg).

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Имигран Спринт може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Някои хора са алергични към лекарства. СПРЕТЕ приема на лекарството и съобщете незабавно на лекуващия лекар, ако скоро след приема на Имигран Спринт забележите някой от следните признаки:

- Внезапно свиркащо дишане или болка/стягане в гръден кош.
- Подуване на клепачите, лицето, устните или езика.
- Гърчове/припадъци.
- Обрив по кожата или "копривна треска" някъде по тялото.
- Болка ниско в корема и/или тежко кървене от правото черво.

Някои хора могат да имат необичайни усещания, включително за намалена чувствителност, мравучкане, топлина или студ, както и болка, тежест или стягане в някоя част от тялото, включително в гръден кош и гърлото след прием на Имигран Спринт.

Тези симптоми може да са силно проявени, но обикновено преминават бързо. Уведомете незабавно лекуващия лекар, ако симптомите не изчезнат или се засилят. Това може да бъде признак на сърдечен пристъп. Не приемайте повече таблетки от лекарството преди да се консултирате с лекуващия лекар.

Може да се появи някой от следните симптоми:

- Лесна уморяемост или съниливост
- Виене на свят
- Необичайно бавен или бърз пулс, или сърцебиене
- Задух
- Чувство на слабост
- Краткотрайно зачервяване на лицето
- Гадене или повръщане
- Зрителни нарушения
- Загуба на нормалния цвят на пръстите на ръцете и краката
- Треперене или тремор
- Неконтролирани движения.

При појава на някой от гореизброените симптоми не трябва да спирате приема на лекарството, но кажете на Вашия лекар при следващата си среща с него. Обаче, ако имате постоянно обезцветяване на ръцете или краката, спрете приема на лекарството и уведомете незабавно Вашия лекар.

Съобщете на Вашия лекар, че приемате Имигран Спринт в случай, че Ви е назначил лабораторни изследвания за функцията на черния дроб, тъй като те могат да бъдат повлияни от приема на лекарството.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ИМИГРАН СПРИНТ

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Имигран Спринт след срока на годност, отбелаян върху опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да не се съхранява над 30°C.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Имигран Спринт

- Активната съставка е суматриптан 50 mg под формата на сукцинатна сол (sumatriptan succinate).

- Другите съставки са: безводен калциев хидрогенфосфат, микрокристална целулоза, натриев хидрогенкарбонат, кроскармелоза натрий, магнезиев стеарат и Опадрай розово YS-1-1441-G.

Как изглежда Имигран Спринт и какво съдържа опаковката

Имигран Спринт диспергиращи се таблетки се предлагат в блистерни опаковки, съдържащи 2 или 4 таблетки.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Производител

Glaxo Operations UK Limited
(trading as Glaxo Wellcome
Operations)
Priory Street
Ware
Herts SG12 0DJ
Великобритания

**Притежател на разрешението
за употреба**

Glaxo Group Ltd
Greenford Road
Greenford
Middlesex UB6 0NN
Великобритания

или

GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
ul. Grunwaldzka 189
60-322 Poznan
Полша

Имигран Спринт е запазена търговска марка на GlaxoSmithKline group of companies.

Дата на последно одобрение на листовката:

