

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

IMIGRAN™ film-coated tablets

ИМИГРАН филмирани таблетки

sumatriptan

Тази листовка се отнася само за *Imigran* таблетки. Моля прочетете я внимателно преди да започнете приема на лекарство. Тя Ви информира за най-важното относно *Imigran* таблетки.
За повече информация или съвет се обърнете към лекуващия Ви лекар.

Наименование на лекарството

Името на Вашето лекарство е *Imigran* (Имигран) филмирани таблетки.

Какво съдържа лекарство

Imigran таблетки съдържа активната съставка sumatriptan (суматриптан), под формат на сукцинатова сол. Има два вида таблетки, съдържащи съответно 50 мг или 100 мг sumatriptan. Помощните съставки, необходими за направата на лекарствената форма са: лактоза, микрокристална целулоза, натриева кроскармелоза, магнезиев стеарат, метилхидрокси-пропилцелулоза, титаниев диоксид и триацетин.

Как действа *Imigran* таблетки

Приема се, че главоболието при мигрена се причинява от силно разширяване на кръвоносните съдове в главата. *Imigran* стеснява тези съдове и облекчава симптомите на мигрената.

Кой произвежда и кой притежава разрешението за употреба на лекарството

Imigran се произвежда от GlaxoWellcome Operations, Ware, Hertfordshire, SG12 0DJ, UK или Glaxo Wellcome S.A., Poznan, Poland. Притежател на разрешението за употребата му е Glaxo Group Ltd., Greenford, Middlesex, UK, представляван в България от Glaxo Wellcome Export Ltd. с адрес: София 1408, кв. Иван Вазов, ул. Димитър Манов, блок 10.

За какво се използват *Imigran* таблетки

Imigran таблетки се използва за овладяване на мигренозния пристъп.

ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ЛЕКАРСТВОТО ...

Преди да започнете приема проверете дали употребата на *Imigran* е правилна във Вашия случай и дали *Imigran* е лекарство, подходящо за Вас.

Ако отговорът на някой от следните въпроси е "Да", съобщете за това на Вашия лекар, преди да приемате лекарството:

- Това главоболие по-различно ли е от обичайните Ви пристъпи на мигрена?
- Информиран(а) ли сте, че имате алергия към *Imigran*, sumatriptan или някои други съставки на *Imigran* таблетки?
- Имате ли алергия към сулфонамиди? Ако сте алергичен към някой антибиотик, но не знаете със сигурност, дали той принадлежи към групата на сулфонамидите, консултирайте се с Вашия лекар!
- Страдате ли от неочеквани пристъпи на задух или болка и стягане в гръденния кош (които могат да обхванат челюстта или горната част на мишниците)?
- Имали ли сте някога сърдечни пристъпи?
- Страдате ли от високо кръвно налягане?
- Имате ли някакво сърдечно заболяване; страдате ли от стенокардия?
- Информиран(а) ли сте, че при Вас рискът от развитие на сърдечно заболяване е повишен? Приема се, че повишен риск от сърдечно заболяване има при: мъже над 40 годишна възраст, жени в менопауза; диабетици, пушачи, хора с висок холестерол в кръвта или наднормено тегло. Възможно е също така да имате повишен риск от сърдечно заболяване, ако някои от кръвните Ви родственици са страдали от сърдечно заболяване.
- Страдате ли от чернодробно заболяване? Ако възнамерявате да провеждате някакви изследвания на кръвта, това лекарство може да повлияе на резултатите.
- Страдате ли от заболяване на бъбреците?
- Страдате ли от епилепсия?

- Бременна ли сте или планирате ли скорошна бременност?
- Кърмите ли?
- Над 65 години ли сте?
- Приемате ли някакви лекарства за Вашата мигрена, които съдържат ерготамин или дихидроерготамин? Ако сте приели някакви лекарства, съдържащи тези препарати, трябва да изчакате поне 24 часа преди приемането на Imigran.
- Приемате ли някакви лекарства за лечение на депресия, особено такива, съдържащи инхибитори на моноамин оксидазата?

Непременно уведомете лекаря за всички други лекарства, които приемате в момента, дори за тези, които сте си купили сами, без лекарско предписание.

Внимавайте, ако шофирате или работите с техника, тъй като Вашата мигрена или лечението с Imigran могат да Ви направят сънилив(а)!

Как да приемате Imigran таблети

Приемайте лекарството така, както Ви е предписал лекарят.

Таблетките трябва да се приемат веднага след поява на симптомите на мигрена, но те могат да се приемат и по всяко време в хода на мигренозния пристъп.

За 30 минути до един час след приемането на една таблетка, повечето хора чувстват облекчение на мигрената. Ако симптомите се възстановят, могат да се приемат още таблетки. Не приемайте обаче повече от 300 mg за 24 часа.

Ако първият прием не Ви е донесъл никакво облекчение, не приемайте повече таблетки за този пристъп. Вие може същевременно да приемете таблетките, които обикновено облекчават болката Ви, ако сте сигурни, че не съдържат ерготамин или дихидроерготамин.

Трябва да изчакате поне шест часа, преди приемането на всякакви препарати, съдържащи ерготамин или дихидроерготамин.

Погълнете всяка таблетка цяла, с малко вода.

Какво да направите, ако приемете повече от предписаното

Важно е да се придържате към препоръчаната доза. Ако случайно погълнете твърде много таблетки, незабавно се консултирайте с лекар!

СЛЕД ПРИЕМАНЕ НА ВАШЕТО ЛЕКАРСТВО ...

Повечето хора, приемащи това лекарство не срещат проблеми с поносимостта. Както при всички медикаменти, е възможно да се появят нежелани лекарствени реакции (странични ефекти).

Някои хора са алергични към лекарства. СПРЕТЕ приемането на лекарството и съобщете незабавно на Вашия лекуваш лекар, ако скоро след приемане на Imigran таблетки, забележите някой от следните признания:

- Внезапно свиркащо дишане и болка или стягане в гръденния кош.
- Подуване на клепачите, лицето, устните, устата или езика.
- Обрив по кожата или "копривна треска" някъде по тялото.

Някои хора могат да усетят болка или чувство на мравучкане, топлина, краткотрайно зачервяване на лицето, тежест или натиск в някоя част от тялото, включително гръденния кош и гърлото, след прием на Imigran. Тези симптоми обикновено преминават бързо. Рядко при прием на Imigran могат да се появят зрителни нарушения като замъглено виждане, двойно виждане или отслабено зрение. Изключително рядко се описва загуба на зрението, която обикновено преминава. Зрителни нарушения могат да се проявят също така в следствие на самия мигренозен пристъп.

Ако гореизброените симптомите продължават съобщете незабавно на Вашия лекар.

Не приемайте други лекарства, освен по изрично предписание на лекарят. Той може да реши да преустанови или промени Вашето лечение.

Вие трябва да уведомите веднага Вашия лекар, ако получите припадък или колапс.

Няма нужда да спирате Вашето лекарство, но съобщете на Вашия лекар при следващата си среща с него, ако усетите някои от следните симптоми:

- Лесна уморяемост или съниливост.
- Световъртеж или чувство на олекване на главата.
- Необичайно бавен или бърз пулс или сърцебиене.
- Чувство на слабост.

- Чувство на неразположение и повръщане.

Ако забележите някакви други признания, които не разбираете, съобщете ги на Вашия лекар.

Съхраняване на Вашето лекарство

Съхранявайте Imigran таблетки при температура под 30°C.

Съхранявайте Imigran, както и всяко друго лекарство, на недостъпно за деца място.

Не използвайте лекарството след посочения на опаковката срок на годност.

ЗАПОМНЕТЕ!

Това лекарство е само за Вас. Никога не го преотстъпвайте на друг човек. То може да му навреди, дори ако неговите симитоми са същите или подобни на Вашите.

Допълнителна информация

Тази листовка не съдържа цялата информация за Imigran. Ако имате някакви въпроси или не сте сигурни за нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Може да Ви се наложи да прочетете тази листовка отново, затова не я изхвърляйте докато не употребите или изхвърлите лекарството в опаковката.

Imigran е запазена търговска марка на Glaxo Wellcome.

Издание № 1 / 24. 11. 1994

(Нежелани лекарствени реакции - включени данни от PSUR/ 07.2000, КХП № 12)