

| | |
|------------------------------------|--|
| ИЗПЪЛНИТЕЛНА АСТРЕНДА НО ЛЕКАРСТВА | |
| Листовка - Приложение 2 | |
| Към РУ №: 11-3053, 29.09.09 | |
| Одобрено: 19/17.06.08 | |

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

Casodex® 50 mg film-coated tablets
Казодекс 50 mg филмирани таблетки

Bicalutamide (бикалутамид)

Информацията в тази листовка се отнася само за Вашето лекарство Казодекс 50 mg. Моля, прочетете я внимателно. Тя Ви дава важна информация, но не може да даде отговор на всеки въпрос. Ако имате някакви въпроси или не сте сигурни за нещо, попитайте лекуващия си лекар или фармацевт.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ЗА КАЗОДЕКС

Името на вашето лекарство е Казодекс 50 mg. Всяка таблетка съдържа 50 mg от активната съставка бикалутамид.

Всяка таблетка съдържа няколко неактивни съставки, които спомагат за произвеждането ѝ. Те са лактоза, магнезиев стеарат, хипромелоза, макрогол 300, повидон, натриев нишестен гликолат и титанов диоксид.
Казодекс се произвежда в блистерни опаковки от 28 таблетки.

Казодекс 50 mg спада към групата лекарствени продукти наречени антиандрогени. Това означава, че той възпрепятства някои действия на андрогените (мъжки полови хормони) в организма.

КОЙ Е ПРОИЗВЕЛ ВАШЕТО ЛЕКАРСТВО

Притежателят на разрешението за употреба е:

AstraZeneca Pharmaceuticals AB

S-151 85 Södertälje

Швеция

Производителят на Казодекс е:

AstraZeneca UK Ltd

Macclesfield

Cheshire

SK 10 4TG, Великобритания

AstraZeneca GmbH

Otto-Hahn-Strasse

68723 Plankstadt

Германия

Казодекс се използва за лечение на рак на простата.

ПРЕДИ ДА ВЗЕМЕТЕ ВАШЕТО ЛЕКАРСТВО

Казодекс не трябва да бъде взиман от деца и жени.



Не взимайте Казодекс ако преди това сте имали алергия към него.

Имате ли проблеми с черния дроб? Ако е така споделете с вашия лекар.

Вземате ли някакви други лекарства, включително такива, които сте си купили сами? Особено ако взимате перорални антикоагуланти (противосъсирващи), някои антихистамини (терфенадин или астемизол) цизаприд (за храносмилателни проблеми) циклоспорин (подтискане на имунната система) или блокери на калциевите канали (за лечение на високо кръвно налягане и някои сърдечни състояния) съобщете го на лекаря си.

Преди да използвате Казодекс консултирайте се с лекаря си ако взимате каквото и да е друго лекарство, предписано или не.

Ако отидете в болница, информирайте медицинския състав, че взимате Казодекс.

Малко вероятно е Вашето лекарство да засегне способността Ви за шофиране и работа с машини. Въпреки това някои хора могат понякога да се почувстват сънливи след прием на Казодекс. Ако това ви се случи е необходимо повишено внимание.

ВЗИМАНЕ НА ЛЕКАРСТВОТО

Следвайте инструкциите на лекаря Ви за това как и кога да взимате лекарството си. Също така прочетете етикета. Ако сте несигурни Вашият фармацевт също може да помогне.

Обичайната доза на Казодекс е една таблетка дневно. Прегълтнете таблетката цяла с чаша вода. Опитайте се да взимате таблетката по едно и също време всеки ден.

Ако забравите да вземете лекарството си, вземете таблетка, когато си спомните, а следващата доза след обичайното за това време. Не взимайте две дози едновременно. Ако сте обезпокоени попитайте лекаря или фармацевта за съвет.

Ако сте взели по-висока от нормалната доза, свържете се с лекаря си. В случай на предозиране незабавно се свържете с най-близката болница.

Дори ако се чувствате добре не спирайте приема на таблетките, докато лекаря не Ви каже.

СЛЕД ВЗИМАНЕ НА ЛЕКАРСТВОТО

Като всички лекарства Казодекс може да има нежелани реакции.

Свържете се с лекаря си или потърсете незабавно медицинска помощ ако изпитате някое от следните:

Нечести нежелани ефекти (1 до 10 на всеки 1000 пациента може да ги изпитат)



- сериозен задух или внезапно влошаване на задуха, възможно с кашлица и треска. Някои пациенти взимащи Казодекс получават белодробно възпаление наречено интерстициална белодробна болест.
- силен сърбеж на кожата (с уртикария) или оток на лицето, устните, езика и /или гърлото, което може да доведе до трудност в прегълъщането.
- жълта кожа и очи (жълтеница) Това може да са симптоми на нарушение на чернодробната функция

Кажете на лекаря си ако Ви обезпокои някой от следните нежелани реакции:

Много чести нежелани реакции:

- болезнени или увеличени гърди
- топли вълни

Чести нежелани реакции:

- гадене
- диария
- сърбеж
- слабост

Редки нежелани реакции:

- повръщане
- суха кожа
- гръден болка и сърцебиене

Понякога Казодекс може да бъде свързан с промени в кръвта, които да наложат извършването на кръвни изследвания от Вашия лекар.

Не се тревожете от този списък на нежеланите реакции. Вие можете да нямаете никой от тях.

Ако забележите някакви нежелани реакции неспоменати в листовката, моля информирайте Вашия лекар или фармацевт.

КАК ТРЯБВА ДА СЪХРАНЯВАМ КАЗОДЕКС

- Проверете срока на годност на опаковката и не използвайте лекарството след тази дата.
- Съхранявайте таблетките в опаковката, в която са закупени.
- Съхранявайте таблетките на безопасно място, където децата не могат да ги видят или стигнат. Вашите таблетки могат да им навредят.
- Трябва да съхранявате таблетките при температура под 30°C.
- Ако лекувания лекар реши да прекрати вашето лечение, изхвърлете таблетките по подходящ начин.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ



Тази листовка не съдържа пълната информация за Казодекс Ако имате някакви въпроси или не сте сигурна за нещо питайте лекаря или фармацевта си.

Запомнете. Това лекарство е за Вас. Само лекар може да Ви го предпише. Никога не го давайте на някой друг. То може да му навреди, дори ако той има същите симптоми като Вас.

Дата на последна редакция: юли 2007

Casodex е търговска марка, собственост на AstraZeneca group of companies

© AstraZeneca 2003-2007

