

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ**Миртазапин Ауробиндо 15 mg таблетки, диспергиращи се в устата****Миртазапин Ауробиндо 30 mg таблетки, диспергиращи се в устата****Миртазапин Ауробиндо 45 mg таблетки, диспергиращи се в устата****(Миртазапин)**

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да прилагате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява миртазапин и за какво се използва
2. Преди да приемете миртазапин
3. Как да приемате миртазапин
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате миртазапин
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МИРТАЗАПИН И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Миртазапин принадлежи към група лекарствени средства, които се наричат антидепресанти. Миртазапин лекува депресивно заболяване (тежки депресивни епизоди).

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕТЕ МИРТАЗАПИН**Не приемайте Миртазапин**

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към миртазапин или към някоя от останалите съставки на Миртазапин Ауробиндо – таблетки, диспергиращи се в устата.

Обърнете специално внимание при употребата на Миртазапин

- ако имате гърчове (епилепсия). Ако при Вас се появят гърчове или ако гърчовете Ви станат по-чести, спрете приема на миртазапин и незабавно се свържете с Вашия лекар;

- ако страдате от чернодробно заболяване, включително жълтеница (пожълтяване на кожата и бялото на очите, причинено от чернодробни проблеми или проблеми с кръвта). Ако развиете жълтеница, спрете приема на миртазапин и незабавно се свържете с Вашия лекар;

- ако имате бъбречно заболяване;

- ако страдате от сърдечно заболяване, наскоро сте прекарали инфаркт на миокарда или ако кръвното Ви налягане е твърде ниско;

- ако страдате от шизофрения. Ако психотичните симптоми, като например параноидни мисли, станат по-чести или по-тежки, веднага се свържете с Вашия лекар;

- ако страдате от маниакална депресия (сменящи се епизоди на чувство за приповдигнатост/свръхактивност и депресивно настроение). Ако започнете да се

чувствате приповдигнато или сте превъзбудени, спрете приема на миртазапин и незабавно се свържете с Вашия лекар;

- ако страдате от диабет (може да се наложи Вашият лекар да прецизира дозата на инсулина или на другите антидиабетни лекарства);

- ако имате очно заболяване, като например повишено вътреочно налягане (глаукома);

- ако имате трудности при отделянето на урина (уриниране), които биха могли да се дължат на увеличена простата;

- ако развиете симптоми като чувство за вътрешно безпокойство и неспособност да стоите или седите на едно място, които обикновено са свързани и с неприятно чувство (акатизия).

Вероятността за такива прояви е най-голяма през първите няколко седмици от лечението. Увеличаването на дозата на миртазапин може да влоши тези усещания и чувства (вижте точка 'Възможни нежелани лекарствени реакции').

Употреба при деца и юноши под 18-годишна възраст

Миртазапин обикновено не трябва да се прилага при деца и юноши под 18-годишна възраст. Трябва да знаете също така, че при пациенти под 18-годишна възраст има повишен риск от проява на нежелани лекарствени реакции, например опити за самоубийство, мисли за самоубийство и враждебност (предимно агресия, поведение на отрицание и гняв), когато взимат този клас лекарствени средства. Въпреки това Вашият лекар може да предпише миртазапин на пациенти под 18-годишна възраст, защото е решил, че това ще бъде в тяхна полза. Ако Вашият лекар е предписал миртазапин на пациент под 18-годишна възраст и Вие желаете да обсъдите това, моля, посетете отново лекаря си. Трябва да информирате Вашия лекар в случай, че някои от изброените по-горе симптоми се появи или се влоши, когато миртазапин се приема от пациент на възраст под 18 години. В допълнение, все още не е установена безопасността в дългосрочен план по отношение на растежа, съзряването и когнитивното и поведенческо развитие в тази възрастова група.

Мисли за самоубийство и влошаване на депресията Ви

Ако сте в депресия, понякога може да ви минават мисли да се нараните или самоубиете, които могат да станат натрапчиви, когато първоначално започнете да вземате антидепресанти. Нужно е известно време, докато тези лекарства подействат. Обикновено ефектът им се усеща след около две седмици, но понякога може да отнеме и повече време.

Много вероятно е да разсъждавате по този начин:

- ако и преди това са ви минавали мисли за самоубийство или самонараняване;

- **Ако сте в млада възраст.**

Данните от клиничните изпитвания показват повишен риск от суицидно поведение при лица на възраст под 25 години с психиатрични състояния, които са лекувани с антидепресанти.

Ако ви минават мисли за самоубийство или самонараняване, независимо по кое време, незабавно трябва да се свържете с Вашия лекар или да отидете в болница.

Може да Ви бъде от помощ, ако кажете на някой роднина или близък приятел, че се чувствате депресирани, и да ги помолите да прочетат тази листовка. Може да ги помолите да Ви кажат дали те смятат, че депресията или безпокойството Ви се влошават и дали са разтревожени от промени, настъпили в поведението Ви.

Ако някое от гореописаните състояния е валидно и за Вашия случай, говорете с Вашия лекар възможно най-бързо, преди да започнете да приемате миртазапин;

- ако проявите признаци на инфекция, например безпричинно висока температура, зачервено и възпалено гърло и ранички в устата. **Спрете приема на миртазапин и незабавно се консултирайте с Вашия лекар за провеждане на кръвно изследване.** В редки случаи изброените симптоми могат да са признаци на нарушение на производството на кръвни клетки в костния мозък. Макар и рядко, тези симптоми най-често се появяват след 4-6-седмично лечение;

- ако проявите комбинация от симптоми като безпричинно висока температура, потене, повишена сърдечна честота, диария, (неконтролирани) мускулни съкращения, втрисане, свръхоживени рефлексии, безпокойство, промени в настроението и безсъзнание. В много редки случаи тези реакции могат да са признаци на серотонинов синдром. **Спрете приема на миртазапин и незабавно се свържете с Вашия лекар.**

Пациентите в старческа възраст може да са по-чувствителни към нежеланите реакции на антидепресантите, към които принадлежи миртазапин.

Моля, консултирайте се с Вашия лекар дори ако тези твърдения са били верни за Вас през някакъв минал период.

Употреба на други лекарства

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Взаимодействие означава, че лекарствени продукти, които се приемат по едно и също време могат да си повлияят взаимно на лечебните ефекти или на нежеланите лекарствени реакции.

Други антидепресанти

Не взимайте миртазапин, докато приемате инхибитори на моноаминооксидазата (MAO инхибитори), както и две седмици след спирането на MAO инхибитори. Примери за MAO инхибитори са моклобемид, транилципромин (и двете от които са антидепресанти) и селегилин (използва се при болест на Паркинсон).

- В много редки случаи миртазапин, приеман самостоятелно или комбинацията от миртазапин с антидепресанти от типа на инхибитори на обратното поемане на серотонина (SSRI) и венлафаксин могат да доведат до т.нар. серотонинов синдром. Някои от симптомите на този синдром са: безпричинно висока температура, потене, повишена сърдечна честота, диария, (неконтролирани) мускулни съкращения, втрисане, свръхоживени рефлексии, безпокойство, промени в настроението и безсъзнание. Ако проявите комбинация от такива симптоми, незабавно се обадете на Вашия лекар. Ако приемате миртазапин едновременно с тези лекарствени продукти, е необходимо внимателно да се коригира дозата и да сте поставени под строго наблюдение.

- Комбинация от миртазапин и антидепресант, наречен нефазодон. Тя може да доведе до повишено количество на миртазапин в кръвта Ви. Информирайте Вашия лекар, ако ползвате това лекарство. Може да се налага намаляване на дозата на миртазапин или при прекратяване на приема на нефазодон – отново да се увеличи дозата на миртазапин.

Други лекарства

Информирайте Вашия лекар, ако ползвате някое от следните лекарства:

- лекарства за тревожност или безсъние: Миртазапин може да повиши сънливостта, причинявана от бензодиазепини;
- лекарства против инфекции, например еритромицин, (използван за лечение на бактериални инфекции), лекарства за лечение на гъбични инфекции (например

кетоконазол), инхибитори на HIV протеазите (използвани за лечение на HIV/СПИН) и лекарства за стомашна язва, напр. циметидин.

В комбинация с миртазапин тези лекарства могат да доведат до увеличаване на количеството на миртазапин в кръвта Ви. Информирайте Вашия лекар, ако приемате тези лекарства. Може да се налага намаляване на дозата на миртазапин или при прекратяване на приема на другите лекарства – отново да се увеличи дозата на миртазапин;

- лекарства за епилепсия, например карбамазепин и фенитоин, и лекарства против туберкулоза, например рифампицин.

В комбинация с миртазапин тези лекарства могат да доведат до намаляване на количеството на миртазапин в кръвта Ви. Информирайте Вашия лекар, ако приемате тези лекарства. Може да се наложи увеличаване на дозата на миртазапин или при прекратяване на приема на другите лекарства – отново да се намали дозата на миртазапин;

- лекарства, които пречат на съсирването на кръвта, например варфарин.

Миртазапин може да доведе до повишаване на ефектите на варфарина върху кръвта. Информирайте Вашия лекар, ако приемате това лекарство. В случай на комбинации е препоръчително кръвта Ви да се следи внимателно от лекар.

Моля, имайте предвид, че посочените лекарства може да са Ви познати под други имена, като често това са техните търговски наименования. В този раздел са посочени само активните вещества или терапевтичната група на лекарствата, а не тяхното търговско наименование. Винаги проверявайте внимателно опаковката и листовката с информация на лекарството, което вече приемате, за да разберете кое е активното вещество и към коя терапевтична група принадлежи това лекарство.

Употреба на Миртазапин с храни и напитки

Може да Ви се доспи, ако пиете алкохол, докато приемате тези таблетки. Затова трябва да избягвате приема на алкохол, докато употребявате миртазапин.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Бременност

Няма достатъчно данни за употребата на миртазапин по време на бременност при хора, за да се правят каквито и да е заключения относно възможните рискове. Затова не трябва да употребявате миртазапин по време на бременност, освен ако не Ви е посъветвал Вашият лекар.

Кърмене

Не е известно дали миртазапин преминава в майчината кърма. Затова не трябва да употребявате миртазапин по време на кърмене. С Вашия лекар заедно ще решите дали трябва да продължите/спрете кърменето, или трябва да продължите/спрете лечението с миртазапин.

Шофиране и работа с машини

Миртазапин може да наруши концентрацията или бдителността Ви. Когато за пръв път започнете да приемате това лекарство, трябва да се уверите, че способностите Ви не са нарушени, преди да направите опит да шофирате или да работите с машини.

Важна информация относно някои от съставките на Миртазапин Ауробиндо

Миртазапин Ауробиндо съдържа аспартам, който е източник на фенилаланин. Това може да представлява опасност за пациенти с фенилкетонурия.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ МИРТАЗАПИН

Винаги приемайте миртазапин точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Обичайната доза е:

Възрастни:

Взимайте 15 или 30 mg веднъж дневно като начална доза, за предпочитане късно вечер. Ако е необходимо, Вашият лекар постепенно ще увеличи тази доза, докато се достигне доза, от която се повлиявате най-добре. Взимайте от 15 до 45 mg веднъж дневно като поддържаща доза.

Напреднала и старческа възраст:

Указанията за дозиране са същите, както при възрастни. При пациенти в старческа и напреднала възраст трябва да се внимава при повишаване на дозата, като това трябва да става под лекарско наблюдение.

Деца и юноши под 18-годишна възраст:

Миртазапин не трябва да се прилага при деца и юноши под 18-годишна възраст. Вижте също и точка 2, „Употреба при деца и юноши под 18-годишна възраст”.

Дозиране при пациенти с бъбречни и чернодробни нарушения:

Ако имате увредена бъбречна или чернодробна функция, в някои случаи лекарят може да Ви предпише по-ниска доза.

Миртазапин Ауробиндо таблетки, диспергиращи се в устата трябва да се приемат през устата. Таблетката се разгражда бързо в устата и след това може да се преглътне. Трябва да подпомогнете поглъщането ѝ, като изпиете чаша вода.

Винаги приемайте таблетката(ите) по едно и също време, за предпочитане веднъж на ден, късно вечер, когато си лягате, или ако Вашият лекар Ви е казал, да разпределите дневната доза, като приемете едната част сутрин, а другата част - вечер. По-голямата част от дозата трябва да се приема вечер.


Таблетките трябва да се приемат по следния начин:

За да се предотврати счупването на таблетката, много важно е да избутате таблетката извън от гнездото ѝ (Фигура А).


Всяка лента съдържа шест гнезда за таблетки, които са отделени една от друга чрез перфорации. Отделете по перфорациите едно гнездо с таблетка (Фигура 1). Трябва внимателно да отстраните покривното фолио. Започнете от края, който е маркиран със стрелка (фигура 2 и 3).

Таблетката трябва да се извади от обвивката със сухи ръце и да се постави на езика (Фигура 4). Таблетката ще се разгражда, след което може да се преглътне с вода.


Фиг. А.



Фиг. 1.



Фиг. 2.



Фиг. 3.



Фиг. 4.



Вашия лекар ще Ви каже колко дълго трябва да продължите приема на това лекарство. Може да минат 2 - 4 седмици, преди да забележите подобряване на състоянието си. Някои хора дори може да се почувстват по-зле в началото на лечението. Ако до един месец не се почувствате по-добре, трябва да поговорите с Вашия лекар. Лечението трябва да продължи 4-6 месеца след като симптомите Ви изчезнат. Лечението трябва да се спре постепенно, за да се избегнат нежелани реакции (вижте точка „Ако спрете да приемате миртазапин“).

Ако сте приели повече от необходимата доза Миртазапин

Ако сте приели повече от необходимата доза Миртазапин, свържете се незабавно с Вашия лекар или фармацевт.

Най-вероятните признаци на предозиране на миртазапин са сънливост, дезориентация, и учестена сърдечна дейност.

Ако сте пропуснали да приемете Миртазапин

Никога не вземайте двойна доза Миртазапин, за да компенсирате пропуснатата доза, а постъпете по следния начин:

Ако е трябвало да вземете една доза вечерта, и на следващата сутрин се сетите, че не сте я взели, не бива да вземате пропуснатата доза. Това може да доведе до замаяност и сънливост през деня. В такъв случай трябва да продължите с обичайната си доза вечерта.

Ако обикновено приемате дозата два пъти на ден (веднъж сутрин след закуска и веднъж вечер, преди лягане) и сте пропуснали единия или и двата приема, постъпете по следния начин:

- Ако сте забравили да вземете сутрешната доза, трябва да я вземете по същото време с вечерната доза.
- Ако сте забравили да вземете вечерната доза, не трябва да я вземете следващата сутрин. Трябва да продължите с обичайните си сутрешни и вечерни дози.

- Ако сте забравили да вземете и двете дози, не трябва да ги вземете следващата сутрин. Трябва да продължите както обикновено, с обичайните си сутрешни и вечерни дози.

Ако сте спрели приема на Миртазапин

Спирайте приема на миртазапин само след като сте се консултирали с Вашия лекар. Не спирайте рязко и внезапно приема на миртазапин, дори и депресията ви да се е разсеяла. Ако спрете внезапно приема на миртазапин, може да се почувствате зле, замаяни, с безпокойство и тревожност, и да получите главоболие. Тези симптоми могат да се избегнат чрез постепенно спиране. Вашия лекар ще Ви каже как постепенно да намалите дозата.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Миртазапин може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Някои нежелани реакции е по-вероятно да се появяват, отколкото други такива. Възможните нежелани реакции на миртазапин са изброени по-долу и могат да се дефинират като:

- *Чести* (засягащи 1 до 10 на 100 пациенти)
- *Нечести* (засягащи 1 до 10 на 1 000 пациенти)
- *редки* (засягащи 1 до 10 на 10 000 пациенти)
- *Много редки* (засягащи под 1 на 10 000 пациенти, включително и единични съобщения)

Нарушения на кръвоносната и лимфна система:

Нечести: Намаляване на количеството на белите кръвни клетки, съпроводено с повишена възприемчивост към инфекции с внезапно повишаване на температурата, силно възпалено гърло и ранички в устата; намален брой на червените кръвни клетки, което причинява блед вид, умора и замаяност; намален брой на тромбоцитите, което е съпроводено с кръвонасядания (синини) и повишена склонност към кървене (вижте "Бъдете особено внимателни при прилагане на Миртазапин")

Нарушения на метаболизма и храненето:

Чести: Повишен апетит и повишаване на телесната маса

Психични (умствени) нарушения:

Редки: Кошмари/ярки сънища, чувство на приповдигнатост или емоционална приповдигнатост (мания), чувство на безпокойство, обърканост, халюцинации, тревожност, безсъние (инсомния) и чувство, че не можете да стоите в покой (психомоторна възбуда)

Нарушения на нервната система:

Чести: Безсъние (което може да понижи бдителността) обикновено се появява през първите седмици на лечение; замаяност и главоболие

Редки: Конвулсии (гърчове), треперене, внезапно свиване на мускулите, чувство на мравучкане и иглички, неспокойност в краката и припадане.

Много редки: Комбинацията от симптоми като например безпричинно висока температура, потене, повишена сърдечна честота, диария, (неконтролирани) мускулни

съкращения, втрисане, свръхожигени рефлекс, безпокойство, промени в настроението и безсъзнание (серотонинов синдром), ненормални усещания в устата.

Нарушения на кръвоносните съдове:

Редки: Внезапно понижаване на кръвното налягане при изправяне от седнало или легнало положение, понякога свързано със замаяност.

Нарушения на стомаха и червата:

Нечести: Гадене

Редки: Сухост в устата, диария и повръщане.

Много редки: Чувство на изтръпване в устата, подуване на устата

Нарушения на черния дроб и жлъчката:

Редки: Увеличаване на стойностите на чернодробните ензими в кръвта (увеличаване на стойностите на серумните трансаминази)

Нарушения на кожата и съединителната тъкан:

Редки: Обрив или кожно изриване.

Нарушения на скелетните мускули, сухожилията и костите:

Редки: Болки в мускулите и ставите.

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение:

Чести: Подувания (типично по глезените и ходилата), причинени от задържане на течности

Редки: Умора.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ МИРТАЗАПИН АУРОБИНДО

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Миртазапин Ауробиндо след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка и блистерите след съкращението EXP. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Този лекарствен продукт не изисква особени условия за съхранение.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Миртазапин Ауробиндо

Активната съставка е миртазапин. Всяка таблетка, диспергираща се в устата съдържа 15 mg, 30 mg или 45 mg миртазапин.

Останалите съставки са: кросповидон (тип В), манитол (E421), микрокристална целулоза, аспартам (E951), силициев диоксид колоиден безводен, магнезиев стеарат, ягодово-гуаранов аромат [малтодекстрин, пропилен гликол, изкуствен аромат, оцетна киселина] и ментов аромат [изкуствен аромат, царевица скорбяла].

Как изглежда Миртазапин Ауробиндо и какво съдържа опаковката

Таблетка, диспергираща се в устата.

Миртазапин Ауробиндо 15 mg таблетки, диспергиращи се в устата:

Бели, кръгли таблетки, диспергиращи се в устата, на едната страна на които е отпечатано числото "36", а от другата страна - буквата 'A', с релефен объл ръб.

Миртазапин Ауробиндо 30 mg таблетки, диспергиращи се в устата:

Бели, кръгли таблетки, диспергиращи се в устата, на едната страна на които е отпечатано числото "37", а от другата им страна - буквата 'A', с релефен объл ръб.

Миртазапин Ауробиндо 45 mg таблетки, диспергиращи се в устата:

Бели, кръгли таблетки, диспергиращи се в устата, на едната страна на които е отпечатано числото "38", а от другата им страна - буквата 'A', с релефен объл ръб.

Миртазапин Ауробиндо таблетки, диспергиращи се в устата се предлагат в полиамиден/ алуминиев/ PVC / хартиен /полиестерен/ алуминиево перфориран блистер с еднократни дози в опаковки по 6, 18, 30, 48, 90 и 96 таблетки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Aurobindo Pharma Limited
Ares, Odyssey Business Park
West End Road
South Ruislip HA4 6QD
Обединеното кралство
тел.: ++ 44 20 8845 8811
факс: ++ 44 20 8845 8795

Производител

Milpharm Limited
Ares, Odyssey Business Park
West End Road
South Ruislip HA4 6QD
Обединеното кралство
тел.: ++ 44 20 8845 8811
факс: ++ 44 20 8845 8795

Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в страните-членки на ЕЕО под следните имена

Австрия:	Mirtazapin Aurobindo 15 mg/ 30 mg/ 45 mg Schmelztabletten
Белгия:	Mirtazapine Aurobindo 15 mg/ 30 mg/ 45 mg orodispergeerbare tabletten
Кипър:	Mirtazapin Aurobindo 15 mg/ 30 mg/ 45 mg δισκία διασπειρόμενο στο στόμα
Чешка република:	Mirtazapin Aurobindo 15 mg/ 30 mg/ 45 mg dispergovatelne tablety
Дания:	Mirtazapin "Aurobindo"
Естония:	Mirtazapin Aurobindo 15 mg/ 30 mg/ 45 mg suus disperseeruvad tabletid
Финландия:	Mirtazapin Aurobindo 15 mg/ 30 mg/ 45 mg tabletti, suussa hajoava
Франция:	MIRTAZAPINE AUROBINDO PHARMA 15 mg/ 30 mg/ 45 mg, comprimés orodispersible
Германия:	Mirtazapin Aurobindo 15 mg/ 30 mg/ 45 mg Schmelztabletten
Гърция:	Mirtazapin Aurobindo 15 mg/ 30 mg/ 45 mg δισκία διασπειρόμενο στο στόμα
Унгария:	Mirtazapine Aurobindo 15 mg/ 30 mg/ 45 mg szájban diszpergálódó tableta
Ирландия:	Mirtazapine Aurobindo 15 mg/ 30 mg/ 45 mg orodispersible tablets
Италия:	Mirtazapina Aurobindo 15 mg/ 30 mg/ 45 mg compresse orodispersibili

Латвия: Mirtazapin Aurobindo 15 mg/ 30 mg/ 45 mg mutē disperģējamās tabletes
Литва: Mirtazapin Aurobindo 15 mg/ 30 mg/ 45 mg burnoje disperguojamosios tabletės
Холандия: Mirtazapine Aurobindo 15mg/30mg/45mg orodispergeerbare tabletten
Норвегия: Mirtazapin Aurobindo 15 mg/ 30 mg/ 45 mg smeltetabletter
Польша: Mirtazapine Aurobindo
Португалия: Mirtazapina Aurobindo
Румъния: Mirtazapin Aurobindo 15 mg/ 30 mg/ 45 mg comprimate orodispersabile
Словашка република: Mirtazapine Aurobindo 15 mg/ 30 mg/ 45 mg orodispergovateľné tablety
Словения: Mirtazapin Aurobindo 15 mg/ 30 mg/ 45 mg orodisperzibilne tablete
Испания: Mirtazapina Aurobindo 15 mg/ 30 mg/ 45 mg comprimidos bucodispersables
Швеция: Mirtazapin Aurobindo 15 mg/ 30 mg/ 45 mg munsönderfallande tabletter
Обединеното кралство: Mirtazapine 15 mg/ 30 mg/ 45 mg orodispersible tablets

Дата на последно одобрение на листовката {мм /гггг}.