

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

Climicin инжекционен разтвор 300 mg/2 ml

CLINDAMYCIN

СЪСТАВ

2 ml инжекционен разтвор (1 ампула) съдържа 300 mg clindamycin под формата на clindamycin phosphate.

Помощни вещества: бензилов алкохол, натриев хидроксид, вода за инжекции

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Инжекционен разтвор

ФАРМАКОЛОГИЧНО ДЕЙСТВИЕ

Клиндамицин е линкозамиден антибиотик, който проявява активност спрямо много Грам-положителни микроорганизми и редица анаеробни бактерии.

Антибактериалната активност на клиндамицин е резултат от потискане синтезата на бактериалните протеини (белтъци) и намаляване скоростта на синтезата на нуклеинова киселина в бактериалната клетка. Действа бактериостатично (спира растежа и развитието на бактериите) или бактерицидно (убива бактериите) в зависимост от концентрацията на антибиотика, мястото на инфекцията и чувствителността на причиняващите инфекция микроорганизми.

ПОКАЗАНИЯ

Клиндамицин е предназначен за лечение на тежки инфекции, причинени от чувствителни към антибиотика микроорганизми :

- инфекции на дихателните пътища
- инфекции на кожата и меките тъкани (инфектирани рани, абсцеси)
- остър и хроничен остеомиелит (възпаление на костта)
- бактериемия (предимно анаеробна) – наличие на бактерии в кръвта
- интраабдоминални (вътрекоремни) инфекции (перитонит, абсцес) в комбинация с антибиотик, които действат срещу Грам-отрицателни бактерии
- гинекологични инфекции
- стоматологични инфекции
- мозъчна токсоплазмоза при пациенти със СПИН
- пневмония, причинена от *Pneumocystis carinii* при пациенти със СПИН (в комбинация с примакин)

Клиндамицин може да се прилага и за профилактика преди хирургически намеси в устната или коремната кухина.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Климидин инжекционен разтвор е противопоказан при пациенти със свръхчувствителност към клиндамицин или линкомицин и към някои от помощните вещества на лекарствения продукт.