

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 22.11.2002

Какво трябва да знаете за Kefzol (Кефзол (cefazoline sodium))

Моля, прочетете тази листовка внимателно. Тя не съдържа цялата информация, която може би трябва да знаете, затова се обърнете към Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт ако имате някакви въпроси. Тази листовка се отнася само за инжекционния Кефзол.

Какво съдържа Вашето лекарство

Вашето лекарство се нарича Кефзол. Неговата активна съставка е cefazoline sodium (цефазолин натрий). Вашето лекарство се намира в стъклени шишенца, съдържащи 500 милиграма (mg), 1 грам (g) или 2 грама (g) цефазолин на прах. В болниците Кефзол се снабдява в опаковки с един флакон.

Вашият лекар или медицинска сестра ще разтворят прахчето цефазолин с "вода за инжектиране" или с друг подходящ разтворител, за да могат след това да го инжектират в мускул или в някоя от Вашите вени.

Кефзол е антибиотик. Антибиотиците помагат на организма да се справи с инфекциите. Инжекционният Кефзол действа чрез разрушаване на определени микроорганизми, причинители на инфекция.

Инжекционният Кефзол се произвежда от Eli Lilly Italia S.p.A.; Via Gramsci, Sesto, Fiorentino, Florence, Italy.

Притежател на разрешението за употреба е: Eli Lilly Export S.A., 16 Chemin des coquelicots, P.O.Box 580, CH-1214 Vernier, Geneva, Switzerland.

Защо Кефзол?

Кефзол се използва за лечение на различни видове инфекции, като:

- Пневмонии и други инфекции в областта на гръденния кош
- Инфекции на уши, нос и гърло
- Цистити и други инфекции на пикочно-половата система
- Инфекции на кожа, меки тъкани, кости и стави
- Септицемия
- Ендокардит и
- Инфекции на жлъчните пътища в черния дроб

Лекарят може да Ви даде това лекарство преди, по време или след операция, за да Ви предпази от инфекция.

Преди да използвате Вашето лекарство

Вашият лекар ще се увери първо, че Кефзол е безопасен за Вас.

Ако отговорите с ДА на някой от следващите въпроси, кажете на Вашия лекар или медицинска сестра. Ако не сте сигурни за нещо, моля, обърнете се към тях.

- Имали ли сте някога алергична реакция към антибиотици, като пеницилин или цефалоспорини или към други медикаменти? (Алергичната реакция може да включва обрив, сърбеж, оток или затруднения в дишането)
- Вземате ли други лекарства, особено диуретици (таблетки за "отводняване"), пробеницид или други антибиотици?
- Бременна ли сте или бихте ли могли да сте?
- Кърмите ли?
- Имате ли някакви проблеми с бъбреците или сте на диализа?
- Имали ли сте някога колит (вид тежка диария)

Как се използва Кефзол за лечение

Вашият лекар ще реши каква трябва да бъде Вашата доза.

Обичайни дози

⇒ Възрастни: При повечето пациенти нужната доза е от 250 милиграмма до 1 грам Кефзол два или три пъти дневно, но за по-тежки инфекции тя може да се увеличи до 1,5 грама четири пъти дневно. Ако имате проблеми с бъбреците, може да Ви се дава по-малка доза един или два пъти дневно.

• Вашият лекар може да Ви даде 1 грама Кефзол преди операция, за да Ви предпази от инфекция. По време или след операцията могат да Ви се дадат още 500 милиграмма или 1 грам Кефзол. При по-тежки операции прилагането му може да продължи до пет дни.

⇒ Бебета и деца: Обикновено 25 до 50 милиграмма Кефзол на всеки килограм от тяхното телесно тегло всеки ден. Тази доза трябва да бъде разделена на три или четири отделни дози. При някои инфекции може да се наложи прилагането на по-високи дози, например, всеки ден до 100 милиграмма Кефзол на килограм от телесното тегло на детето. Ако бебето или детето има проблеми с бъбреците, може да му се даде по-ниска доза.

⇒ Недоносени и бебета под 1 месец: Обикновено Кефзол не се прилага при тях.

- Вашият лекар или медицинска сестра ще инжектира Кефзол във мускул или във вена.

Докато се лекувате

Кефзол може да причини някои нежелани реакции като:

- Алергични реакции, които могат да включват обрив, сърбеж или температура. Рядко, може да има по-сериозни реакции, като спадане на кръвното налягане или затруднено дишане.

- Чувство на отпадналост, загуба на апетит или кандидоза (кооп) или сърбеж в устната кухина и в аногениталната област.
- Кефзол може да причини диария, която може да бъде с кръв или слуз. Веднага кажете на Вашия лекар, ако настъпи такова нещо.
- Лабораторните изследвания показват, че Кефзол може да предизвика промени в показателите на кръвта и в показателите за работа на черния дроб и бъбреците (но това е рядко).
- Ако Ви боли, когато Ви инжектират Кефзол в мускула или във вената, кажете веднага на лекаря или медицинската сестра.
- Ако се появят някои от тези нежелани реакции или някакви други, обърнете се към Вашия лекар. Той/тя има повече информация за Кефзол и ще реши какво трябва да се направи.

Как се съхранява Вашето лекарство

- В болничната аптека, шишенцата с Кефзол на прах трябва да се съхраняват на тъмно място и не трябва да се използват след срока на годност, отбелязан върху опаковката, който е 2 години.
- Когато прахчето Кефзол се разтвори с разтворител, то трябва да се съхранява в хладилник (2-8°C) до 24 часа.

Пазете далече от достъпа на деца.

Запомнете: Това лекарство е само за Вас. То може да се изписва само от лекар. Никога не го давайте на други. Това може да им навреди, дори ако техните симптоми са същите като Вашите.

Дата на изготвяне на листовката: Август 2001г.