


КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

GLUCOSE ACTAVIS 10%
ГЛЮКОЗА АКТАВИС 10%

1 ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Glucose Actavis 10% solution for infusion
Глюкоза Актавис 10% инфузионен разтвор



2 КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

1000 ml от разтвора съдържат:

Глюкоза, безводна 100,0 g (като Глюкоза моногидрат 110,0 g)

Калорийна стойност: 1675 kJ/l = 400 kcal/l

Теоретичен осмоларитет: 555 mOsm/l

Титрационна киселинност (до pH 7,4) < 0,5 mmol/l

pH 3,5-5,5

3 ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Инфузионен разтвор

Бистър безцветен или почти безцветен воден разтвор.

4 КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Терапевтични показания

- Внос на Глюкоза за енергийни нужди.
- Лечение на хипогликемия.
- Разтвор носител за физико-химично съвместими електролитни концентрати и лекарства.

4.2 Дозировка и начин на приложение

Препоръчителна схема на дозиране

Дозата трябва да се адаптира според индивидуалните нужди от Глюкоза и течности.

Възрастни

Максималната дневна доза е 40 ml на kg телесно тегло, отговарящи на 4 g Глюкоза. Максималната инфузионна скорост е 2,5 ml на kg телесно тегло за час, отговарящи на 0,25 g Глюкоза на kg телесно тегло за час. Максималната скорост на капката е 0,8 капки на kg телесно тегло за минута.

Така, за пациент с тегло 70 kg, максималната инфузионна скорост е приблизително 175 ml/час (съответстваща максимална скорост на капката 56 капки/min), което води до прием на Глюкоза 17,5 g/час.



Забележка

При наличие на метаболитни нарушения (напр. постоперативно или след травми, хипоксия, органна недостатъчност), окислителният метаболизъм на глюкозата може да бъде нарушен. В подобни ситуации, приемът на Глюкоза трябва да бъде ограничен до 2 – 4 g/kg телесно тегло/ден. Нивото на кръвната захар не трябва да надвишава 6.1 mmol/l (110 mg/100 ml).

Ако разтворът се използва като разтвор носител, трябва да се подбере обем чрез който се постига желаната концентрация на разтваряния или разреждан лекарствен продукт.

Деца

При определяне на дозата, трябва строго да се спазват следните ограничения за общото дневно количество на приложените парентерални разтвори:

Възраст на детето	ml/kg тегло
1-ви ден от живота	50-70
2-ри ден от живота	70-90
3-ти ден от живота	80-100
4-ти ден от живота	100-120
От 5-ти ден от живота	100-130
1-ва година от живота	100-140
2-ра година от живота	80-120
3-та-5та година от живота	80-100
6-та-10-та година от живота	60-80
10-та-14-та година от живота	50-70

Начин на приложение

Инtravenозна инфузия. Разтворът може да се прилага през периферна вена.

Ако Glucose 10% се използва като разтвор носител, възможността за периферно инфузиране зависи от характеристиките на приготвената смес.

4.3 Противопоказания

- Хипергликемия неповлияваща се от дози на инсулина до 6 единици инсулин/час;
- Декомпенсиран захарен диабет, диабетна кома;
- Нелекуван инсипиден (безвкусен) диабет;
- Анурия при отсъствие на заместителна бъбречна терапия;
- Интракраниален или интраспинален кръвоизлив;
- Делириум тременс, ако пациентът е вече дехидратиран;
- Хипокалиемия при отсъствие на заместителна терапия;
- Ацидоза;
- Хиперхидратация,
- Хипотонична дехидратация.

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Прилагането на глюкозни разтвори не се препоръчва след остра исхемични инсулти, тъй като се съобщава, че хипергликемията уврежда мозъчното искемично увреждане и нарушива възстановителния процес.



Разтворите съдържащи Глюкоза трябва да се прилагат предпазливо при пациенти с изявен или субклиничен захарен диабет или нарушен въглехидратен толеранс независимо от причината.

Този разтвор трябва да се прилага предпазливо при пациенти с хиперволемия, бъбречна недостатъчност и заплашваща или изявена сърдечна декомпенсация.

По време на приложение, трябва да се следят кръвната захар, серумните електролити, алкално-киселинното равновесие и водния баланс.

Разтворът трябва да се прилага предпазливо и при пациенти с повишен серумен осмоларитет.

Нестабилният метаболизъм (напр. постоперативно, или след травми, хипоксия, органна недостатъчност) нарушива окислителния метаболизъм на глюкозата и може да доведе до метаболитна ацидоза.

Състоянието на хипергликемия трябва да се мониторират адекватно и да се лекуват с инсулин. Приложението на инсулин предизвика допълнително изместване на калия към клетките, поради което може да предизвика или да увеличи хипокалиемията.

Рязкото прекъсване на инфузии с Глюкоза в големи количества може да предизвика дълбока хипогликемия поради съпътстващите високи серумни концентрации на инсулин. Това се отнася в особена степен до деца под 2 годишна възраст, пациенти със захарен диабет и други болестни състояния свързани с нарушена глюкозна хомеостаза. При очевидните случаи, инфузирането на Глюкоза трябва да се забави в рамките на последните 30 - 60 минути на инфузирането. Препоръчително е като предпазна мярка, всеки пациент да бъде мониториран за хипогликемия в продължение на 30 минути през първия ден на рязко прекратяване на парентералното хранене.

Клиничното мониториране в общия случай трябва да включва кръвна захар, серумни електролити и алкално-киселинно равновесие. Честотата и вида на лабораторните изследвания зависят от общото състояние на пациента, преобладаващата метаболитна ситуация и от приложената доза. Следете също общия обем и количество на приложената Глюкоза.

Усиленото хранене или пресищането на недохранени или изконсумирани пациенти специално може да предизвика хипокалиемия, хипофосфатемия и хипомагнезиемия. Необходимо е адекватно заместване на електролитите съобразно отклоненията от нормалните стойности.

Специално внимание трябва да се обърне на хипокалиемията. Абсолютно задължително е да се извърши заместване на калия.

При необходимост, трябва да се приложат електролити и витамини. За метаболизиране на глюкозата е необходим витамин В, особено тиамин.

Инфузиите на Глюкоза не трябва да се извършват през същата инфузционна система едновременно с, преди, или след кръвопреливане, поради вероятност от псевдоаглутинация.

4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Няма за отбелязване.

4.6 Бременност и кърмене

За разтворите на Глюкоза 10% няма налична контролирана клинична информация относно експозиция по време на бременност. Проучванията върху животни с парентерално приложена Глюкоза не сочат преки или непосредствени ефекти по



отношение бременност, ембрионално/фетално развитие, раждане или постнатално развитие.

Все пак, трябва да се подхожда с внимание при предписване на бременни или кърмещи жени, като е необходимо внимателно проследяване на кръвната захар.

4.7 Влияние върху способността за шофиране и работа с машини Няма отношение

4.8 Нежелани лекарствени реакции

При положение, че продуктът се използва съобразно дадените указания, не се очакват нежелани лекарствени реакции.

Възможно е да възникнат следните странични ефекти, които не са пряко свързани с продукта, а с условията на прилагане, подлежащите нарушения или придружаващото лечение:

- Хипокалиемията може да е свързана с инсулиновата терапия. В допълнение, хипокалиемия, хипомагнезиемия и хипофосфатемия могат да бъдат предизвиквани от захранване с Глюкоза, особено при недохранени пациенти.
- Рязкото прекратяване и/или прилагането на инсулин може да предизвика рикошетна хипогликемия, особено при пациенти с нарушение на глюкозния толеранс.

Ако по време на инфузиране през периферна вена възникнат признания на венозно дразнене, флебит или тромбофлебит, трябва да се обмисли въпроса за смяна на мястото на инфузиране.

4.9 Предозиране

Симптоми

Предозирането може да предизвика хипергликемия, глюкузуря, серумен хиперосмоларитет, които евентуално да доведат до хиперосмотична и хипергликемична кома, допълнителна хиперхидратация и електролитни нарушения.

Специално лечение, антидоти

Гореспоменатите нарушения могат да бъдат коригирани чрез намаляване вноса на Глюкоза, прилагане на инсулин и/или подходящо заместване с електролити.

5 ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1 Фармакодинамични свойства

Глюкозата се метаболизира напълно като естествен субстрат на клетките в организма. При физиологични условия, глюкозата е най-важният доставящ енергия въглехидрат с калорийна стойност приблизително 17 kJ или 4 kcal/g. Нервната тъкан, еритроцитите и медулата на бъбреците са сред тъканите със задължителна нужда от Глюкоза. При възрастни, концентрацията на Глюкоза в кръвта се определя на 60 - 100 mg/100 ml, или 3,3 - 5,6 mmol/l (на гладно).

Глюкозата служи да поддържа нивото на кръвната захар и за синтеза на важни телесни компоненти. Тя служи и за синтез на гликоген, формата под която се съхранява глюкозата. В регулирането на концентрацията на кръвната захар участват предимно инсулин, глюкагон, глюкокортикоиди и катехоламици.



Нормалното електролитно и алкално-киселинно състояние е предпоставка за оптимално усвояване на приложената Глюкоза. Ето защо, ацидозата в частност може да сочи нарушение в окислителния глюкозен метаболизъм.

Метаболизъмът на глюкозата и електролитите са тясно свързани. Калиевите, магнезиевите и фосфатните нужди могат да нараснат, поради което може да се наложи да бъдат мониторирани и заместени съобразно индивидуалните нужди. Без заместване, е възможно да бъдат нарушени специално сърдечната и нервната функции.

Нарушен глюкозен толеранс може да възникне при патологични условия, напр. захарен диабет и метаболитен стрес (напр. интра- и постоперативно, тежко заболяване, травма, сепсис). Тежестта на хипергликемията и глюкозурията са свързани с тежестта на патологичното състояние.

5.2 Фармакокинетични свойства

След вливане, глюкозата първо се разпределя във вътресъдовото пространство, след което се усвоява във вътреклетъчното пространство.

При гликолиза глюкозата се метаболизира до пируват или до лактат. Лактатът може отново да влезе частично в метаболизма на глюкозата (цикъл на Cori). При аеробни условия пируватът се окислява напълно до въглероден двуокис и вода. Крайните продукти от пълното окисление на глюкозата се отделят чрез белите дробове (въглероден двуокис) и бъбреците (вода).

На практика, при здрави лица Глюкоза не се ескретира чрез бъбреците. В условия на патологичен метаболизъм (напр. diabetes mellitus, постагресионен метаболизъм) свързан с хипергликемия (концентрации на кръвна захар над 120 mg/100 ml или 6,7 mmol/1), глюкозата също се ескретира през бъбреците (глюкозурия) когато се надвиши капацитета на максимална тубулна резорбция (180 mg/100 ml или 10 mmol/1).

5.3 Предклинични данни за безопасност

Няма значими за предписващия предклинични данни, които могат да се добавят към тези изредени в другите раздели на кратката характеристика на продукта.

6 ФАРМАЦЕВТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

6.1 Списък на помощните вещества

Water for injections

6.2 Несъвместимости

Поради киселинното си pH, разтворът може да е несъвместим с други лекарства.

Еритроцитни концентрати не трябва да се смесват с Глюкоза 10% за интравенозна инфузия, тъй като това може да доведе до псевдоаглутинация.

6.3 Срок на годност

3 години

Срок на годност след първо отваряне на опаковката

Няма отношение.

Срок на годност след разреждане или разтваряне съгласно указаннята

Няма отношение.

6.4 Специални предупреждения на съхранение

Без специални условия на съхранение.



6.5 Естество и съдържание на опаковката
Полиетиленова бутилка, съдържание: 500 ml

6.6 Указания за употреба и работа
Еднодозова опаковка. Неизразходваното количество да се изхвърли.
Да се използва само, ако разтворът е бистър и ако опаковката и запушалката
нямат видими белези за повреда.

7 ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

“Актавис” ЕАД
ул.”Атанас Дуков” № 29
1407 София, България

8 РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА РЕГИСТРАЦИЯТА
20060544

**9 ДАТА НА ПЪРВАТА РЕГИСТРАЦИЯ/ПОДНОВЯВАНЕ НА
РЕГИСТРАЦИЯТА**
12.10.2006

10 ДАТА НА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА
Септември 2008 г.

